No.997 霉菌酵母

匍枝根霉

Black bread mold · *Rhizopus stolonifer*

NE


未评估

微生物 · 未评估

室内 腐生

分解枯木、落叶等获取养分

示意图



真菌数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

孢囊梗长		最长 2.5 mm
孢囊梗粗		约 20 µm
最适温度		25–30 °C
致死温度		60 °C

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 0–100；温度 0–50 °C；温度 −50–50 °C。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 匍匐蔓延

用匍匐菌丝和假根在面包上蔓延成黑色毛霉斑。

技能 · +/− 交配

有“+”“−”两种交配型，相遇时可以有性生殖（中文维基）。

认识匍枝根霉

黑根霉是接合菌门的真菌。

它是世界上最常见的真菌之一。

会在馒头、面包上长黑色毛霉，也能引起人和土豆生病。

安全 **食物发霉了就整个扔掉，不要切掉霉斑继续吃。**

冷知识 60 °C 下 10 分钟能杀死它全部细胞。

分布： 全球。

资料来源：Wikipedia「Rhizopus stolonifer」；维基百科「黑根霉」。致死温度条用 −50–50 °C 刻度，60 °C 超出刻度。 AI 辅助制作，需人工审核。