No.993 霉菌酵母

娄地青霉

Blue cheese mold · *Penicillium roqueforti*

NE


未评估

微生物 · 未评估

室内 土壤 发酵

分解奶酪中的脂肪和蛋白质

示意图



真菌数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

菌落径 YES		约 40 mm
菌落径 MEA		约 50 mm
首次描述		1906 年
1996 分为		3 个种

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；寿命 0–200 年；数量 0–100。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 蓝纹奶酪

用来发酵生产蓝纹奶酪，名字来自罗克福奶酪。

技能 · 基因借用

一些基因能水平转移给其他被人类驯化的青霉。

认识娄地青霉

罗克福青霉是常见的腐生真菌。

可以从土壤、腐烂有机物和植物上分离出来。

做奶酪的和不做奶酪的种群来自不同的驯化事件。

冷知识 它产生的 PR 毒素在奶酪里不稳定，会分解成毒性较低的物质。

分布： 全球。

资料来源：Wikipedia「Penicillium roqueforti」；维基百科「罗克福青霉菌」。“首次描述”条为距今年数。 AI 辅助制作，需人工审核。