No.999 霉菌酵母

# 灰葡萄孢

Grey mould · *Botrytis cinerea*


NE

未评估

微生物 · 未评估

农田 寄生

寄生在植物上，取食死去的组织




## 真菌数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

| | | |
|---|---|---|
| 宿主植物 | 200 | 多种 |
| 喜欢温度 | 18 | 24 °C |
| 烂串率 | 0 | 约 5% |
| 推迟采收 | 0 | 约 1 周 |

刻度：数量 0–400；温度 0–50 °C；比例 0–100%；天数 0–400 天。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

### 技能 · 贵腐

干湿交替时它吸走葡萄的水分，留下更多糖，能酿贵腐甜酒。

### 技能 · 灰霉病

让 200 多种双子叶植物得灰霉病。

## 认识灰葡萄孢

灰葡萄孢是取食死组织的真菌。

种名意为“像灰烬的葡萄”。

苏玳、托卡伊的甜酒都和它有关。

**安全** **食物发霉了就整个扔掉，不要切掉霉斑继续吃。**

**冷知识** 一些酿酒师喜欢让 5% 的葡萄串染上它，再晚一周采收。

**分布：** 全球温带。

资料来源：Wikipedia「Botrytis cinerea」；维基百科「灰葡萄孢菌」。 AI 辅助制作，需人工审核。