No.995 霉菌酵母

黑曲霉

Black mold · *Aspergillus niger*

NE


未评估

微生物 · 未评估

土壤 室内 腐生

分解枯木、落叶等获取养分

示意图



真菌数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

生长温度	6–47 °C	6–47 °C
最适温度	35–37 °C	35–37 °C
近缘黑孢种	15 个	15 个
耐受上限	53 °C	53 °C

刻度：温度 0–50 °C；数量 0–100；温度 −50–50 °C。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 柠檬酸工厂

很耐酸，是工业上生产柠檬酸的主力。

技能 · 黑色孢子

菌落是黑色的，种名 niger 意为“黑色的”。

认识黑曲霉

黑曲霉是曲霉属黑色组的霉菌。

在土壤、水、植物和腐烂物上都很常见。

会让葡萄、杏、洋葱、花生长“黑霉”。

安全 **食物发霉了就整个扔掉，不要切掉霉斑继续吃。**

冷知识 它可能产生赭曲霉毒素 A，会伤害肾脏。

分布： 全球。

资料来源：Wikipedia「Aspergillus niger」；维基百科「黑曲霉」。耐受上限条用 −50–50 °C 刻度，53 °C 超出刻度。 AI 辅助制作，需人工审核。