No.978 蘑菇

毒蝇鹅膏

Fly agaric · *Amanita muscaria*


NE

未评估

IUCN 提议评估中

林地 土壤 共生

和树根结成菌根，用养分换树的糖



示意图

真菌数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

菌盖径		5–30 cm
菌柄高		5–20 cm
菌柄粗		1–2 cm
近百年死亡		无可靠记录

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 0–100。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 红帽白点

红色菌盖带白点，含蝇蕈醇、鹅膏蕈氨酸。

技能 · 菌根

和多种树木共生。

认识毒蝇鹅膏

毒蝇伞是鹅膏菌属的担子菌。

原产北半球温带和寒带森林，现已归化到南半球。

英格兰和瑞典曾用它来驱虫。

安全 **有毒！会引起中毒和幻觉，儿童误食尤其危险。千万不要采食野生蘑菇。**

冷知识 北美真菌学会称近 100 年没有可靠的致死记录，但它仍然有毒。

分布： 北半球温带、寒带。

资料来源：Wikipedia「Amanita muscaria」；维基百科「毒蝇伞」；redlist.info「Amanita muscaria」。 AI 辅助制作，需人工审核。