No.979 蘑菇

毒鹅膏

Death cap · *Amanita phalloides*


NE

未评估

IUCN 未评估

林地 土壤 共生

和树根结成菌根，用养分换树的糖



真菌数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

菌盖径		5–15 cm
菌柄长		8–15 cm
菌柄粗		1–2 cm
孢子		7–12 µm

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 0–100。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 耐热毒素

鹅膏毒素耐热耐冷，煮熟、冷冻都去不掉毒性。

技能 · 袋状菌托

白色菌柄基部有破布似的囊状菌托。

认识毒鹅膏

毒鹅膏是已知最毒的蘑菇。

它造成了大多数蘑菇中毒死亡。

主要毒素 α-鹅膏蕈碱会让肝、肾衰竭。

安全 **剧毒！千万不要采食任何野生蘑菇；误食要立刻就医。**

冷知识 它很像可吃的草菇和凯撒蘑菇，所以容易误食。

分布： 原产欧洲；随树木引种扩散到各地。

资料来源：Wikipedia「Amanita phalloides」；维基百科「毒鹅膏」。未查到 IUCN 全球评估。 AI 辅助制作，需人工审核。