No.971 蘑菇

羊肚菌

Common morel · *Morchella esculenta*


NE

未评估

IUCN 未评估

林地 土壤 腐生

分解枯木、落叶等获取养分



真菌数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

菌盖宽		2–7 cm
菌盖高		2–10 cm
菌柄长		2–9 cm
每囊孢子		8 个

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 0–100。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 满身凹坑

黄褐色菌盖布满深坑和脊，像海绵。

技能 · 中空

菌盖和菌柄连成一个空腔。

认识羊肚菌

羊肚菌是子囊菌门羊肚菌科的真菌。

早春在森林、果园甚至火烧地里出现。

可能因为能在低温生长、避开竞争而在春天出菇。

安全 **野生蘑菇和有毒种很难分辨：千万不要自己采野生蘑菇吃，只吃市场上买的正规产品。**

冷知识 有毒的鹿花菌外形很像它；老而腐烂的羊肚菌也可能有毒。

分布： 北半球温带。

资料来源：Wikipedia「Morchella esculenta」；维基百科「美味羊肚菌」。未查到 IUCN 全球评估。 AI 辅助制作，需人工审核。