期末報告實測紀錄表（浴室安全監測系統）

用途　期末報告第 5、6 項（感測器訊號的收集、資料整理分析）的實際資料。量完把這個檔案交回，用來做期末報告的分析頁。

怎麼填　只填淺黃色格子（藍色字）。灰色斜體的「範例」列不會被計算，可以留著。計算欄、判斷欄與「摘要」工作表會自動更新。

1. 血壓 722　連續 7 天，早上起床後、晚上睡覺前各量一次，每次量兩遍（國健署 722 原則）。為了每天的數字可以互相比較，本紀錄固定坐著、量同一隻手臂，量完一遍隔一下再量第二遍。

2. 臥站血壓　每週 1 次（共 4 次）。平躺休息 5 分鐘後量一次，站起來後第 1 分鐘、第 3 分鐘各再量一次。站起來時旁邊要有人扶；如果頭暈，立刻坐下並停止測量。

3. 夜間如廁　連續 7 晚。記錄上床、起床時間，以及半夜起來上廁所的次數，起身時有沒有頭暈。可以請長輩早上回想，或由家人記錄。

4. 洗澡濕度　7 次洗澡。浴室放一個電子溫濕度計（大多數手機沒有濕度感測器）。記錄洗澡前的濕度、洗澡中看到的最高濕度、洗完 10 分鐘後的濕度，以及開始、結束時間。

安全　量測只是報告用的紀錄，不是診斷。血壓很高、站起來頭暈或身體不舒服，請停止並尋求醫療協助。開始前先徵得被量測者同意。

個資　交回檔案時，被量測者可以用「阿嬤」「同學」代稱，不需要寫真實姓名。

格子顏色　淺黃底、藍字＝要填的格子；灰底斜體＝範例；黑字＝公式；綠字＝從其他工作表帶入的結果；紅底＝超過文獻門檻。

文獻

依據：衛生福利部國民健康署（2023-05-15）量血壓「722」原則，https://www.mohw.gov.tw/cp-16-74604-1.html

步驟依據：CDC STEADI（2017）Measuring Orthostatic Blood Pressure，https://www.cdc.gov/steadi/media/pdfs/steadi-assessment-measuringbp-508.pdf；
門檻依據：臺大醫院健康電子報（2023-10，第 215 期）姿勢性低血壓；Freeman R, et al. Clin Auton Res 2011;21(2):69–72

依據：Vaughan CP, et al. Int J Clin Pract 2010;64(5):577–583（每晚 ≥ 3 次夜尿與跌倒風險）；提醒條件為本設計的規則

血壓 7 天紀錄（722 原則）

連續 7 天、早晚各一次、每次量 2 遍。單位：收縮壓、舒張壓 mmHg；脈搏 次/分。依據：衛生福利部國民健康署（2023-05-15）量血壓「722」原則，https://www.mohw.gov.tw/cp-16-74604-1.html

量測				第 1 遍			第 2 遍			本次平均（自動）			
天	日期	時段	時間	收縮壓	舒張壓	脈搏	收縮壓	舒張壓	脈搏	收縮壓	舒張壓	脈搏	備註
範例	*2026-12-01*	*早*	*07:10*	*128*	*82*	*72*	*124*	*80*	*70*	*126.0*	*81.0*	*71.0*	*範例列不計入*
第 1 天		早											
第 1 天		晚											
第 2 天		早											
第 2 天		晚											
第 3 天		早											
第 3 天		晚											
第 4 天		早											
第 4 天		晚											
第 5 天		早											
第 5 天		晚											
第 6 天		早											
第 6 天		晚											
第 7 天		早											
第 7 天		晚											

完成次數 0 共 14 次（7 天 × 早晚）
平均收縮壓 mmHg
平均舒張壓 mmHg
平均脈搏 次/分
判斷

臥站血壓（每週 1 次，共 4 次）

平躺休息 5 分鐘後量，再站起 1 分鐘、3 分鐘各量一次。站起時要有人扶，頭暈就坐下停止。步驟依據：CDC STEADI（2017）Measuring Orthostatic Blood Pressure，https://www.cdc.gov/steadi/media/pdfs/steadi-assessment-measuringbp-508.pdf；門檻依據：臺大醫院健康電子報（2023-10，第 215 期）姿勢性低血壓；Freeman R, et al. Clin Auton Res 2011;21(2):69–72

量測			平躺 5 分鐘			站起 1 分鐘			站起 3 分鐘			最大下降（自動）			自動	
次數	日期	時間	收縮壓	舒張壓	脈搏	收縮壓	舒張壓	脈搏	收縮壓	舒張壓	脈搏	收縮壓下降	舒張壓下降	站起時頭暈	判斷	備註
範例	*2026-12-02*	*08:00*	*132*	*80*	*68*	*118*	*76*	*80*	*120*	*78*	*78*	*14*	*4*	*否*	*未達定義*	*範例列不計入*
第 1 週																
第 2 週																
第 3 週																
第 4 週																

完成次數	0	共 4 次
收縮壓最大下降		mmHg（門檻 ≥ 20）
舒張壓最大下降		mmHg（門檻 ≥ 10）
符合定義的次數	0	
站起時頭暈的次數	0	

夜間如廁（連續 7 晚）

記錄上床、起床時間與半夜起來上廁所的次數。依據：Vaughan CP, et al. Int J Clin Pract 2010;64(5):577–583（每晚 ≥ 3 次夜尿與跌倒風險）；提醒條件為本設計的規則

天	日期	上床時間	起床時間	夜間如廁次數	起身時頭暈	備註
範例	*2026-12-01*	*22:30*	*06:10*	*2*	*否*	*範例列不計入*
第 1 晚						
第 2 晚						
第 3 晚						
第 4 晚						
第 5 晚						
第 6 晚						
第 7 晚						

記錄晚數	0	共 7 晚
平均每晚次數		次/晚
≥ 3 次的晚數	0	
起身頭暈的晚數	0	
判斷		

洗澡時的浴室濕度（7 次）

用電子溫濕度計記錄。結果用來訂「濕度上升多少就判斷正在洗澡」的門檻。濕度單位 %RH。

次數	日期	開始時間	結束時間	洗澡分鐘	洗澡前濕度	洗澡中最高濕度	濕度上升	洗完 10 分鐘後濕度	開窗或開排風扇	室溫 °C	備註
範例	*2026-12-01*	*22:40*	*22:58*	*18*	*68*	*92*	*24*	*80*	*否*	*18*	*範例列不計入*
第 1 次											
第 2 次											
第 3 次											
第 4 次											
第 5 次											
第 6 次											
第 7 次											

記錄次數	0	共 7 次
平均洗澡分鐘		分鐘
平均濕度上升		%RH
最小濕度上升		%RH
建議門檻		假設：取 7 次中最小上升量的 8 成，留一點誤差空間（本設計自訂，期末依資料調整）