



한국어 공개 SNS에 기록된 상담 경험의 기술적 특징

LLM 보조 정제 절차로 분석한 사례 보고

Yunjeong Lee

서울대학교 (Seoul National University)

KCA 한국상담학회
KOREAN COUNSELING ASSOCIATION



저자 소개

초록

상담 경험 연구에서 면접·설문은 부정적 경험을 충분히 포착하지 못한다. 부정 경험을 가진 내담자는 추적 면접에 잘 응하지 않으며, 대면 맥락에서는 사회적 바람직성 편향이 작용하기 때문이다(Mohr, 1995; Krumpal, 2013). 익명을 전제로 자기 경험을 자발적으로 적는 SNS 게시물은 이 한계를 부분적으로 보완할 수 있는 자료원이지만, 한국에서 이를 직접 분석한 연구는 아직 드물다. 본 연구는 한국어 공개 X(구 트위터) 게시물 **3,652건**을 수집하고, **사전 오염 제거·규칙 분류·LLM 판정·보수적 확정**의 4단계 정제 절차를 적용하여 본문 코퍼스 **361건**을 구성하였다. 분석 결과 **1)** 부정과 긍정 경험이 비슷한 비중으로 함께 들어왔고(부정 117·긍정 126건), **2)** 부정 경험에서는 강제성·무시당함·상처가, 긍정 경험에서는 이해받음·안도·성장이 자주 함께 나타났다. 이 양상은 면접 자료를 분석한 문보경·장성숙(2001)의 표지와 유사한 형태로 나타났으며, 부트스트랩 재표집과 LLM 비의존 점검에서도 같은 방향이 확인되었다.

서론

상담 경험 연구는 부정 경험을 충분히 담아내지 못해 왔다. 그 누락은 부정 경험을 가진 사람이 면접 표본에 들어오지 않는 **모집단 차원**보다, 같은 사람이라도 면접 환경에서는 보고하지 않는 **보고 환경 차원**에서 강하게 일어난다(Mohr, 1995; Krumpal, 2013; 문보경·장성숙, 2001). 면접의 한계가 보고 환경의 한계라면, 환경을 바꾸면 같은 경험이 다른 형태로 기록될 수 있다. 익명을 전제로 자기 경험을 적는 SNS 글이 그 사례다. Steinbrenner 외(2025)는 독일어권 온라인 포럼에서 부정적 심리치료 경험의 주제 구조를 추출해, 공개 텍스트가 분포 수준의 자료원이 될 수 있음을 보였다. 그러나 한국어 회고 표현과 상담 문화의 특수성 때문에 영어·독일어권 결과를 그대로 옮길 수 없어, 한국어 자료에 대한 별도의 사례 보고가 필요하다.

연구 목적

- **목적 1:** 한국어 공개 SNS 상담 경험 자료에 적용 가능한 **LLM 보조 정제 절차**를 정리하고 본문 코퍼스를 구성한다.
- **목적 2:** 본문 코퍼스의 **경험 극성과 사건 언어 양상**을 분포 수준에서 기술하고, 면접 기반 선행 연구와 비교한다.

연구 방법

자료는 X 공개 한국어 글에서 모았으며, 사용자명과 외부 식별자는 수집 단계에서 자동으로 가렸다. 질의는 **정밀·확장·맥락 점검·누적 확장**의 네 층으로 설계했고, 회수된 게시물은 2010년 9월부터 2026년 4월까지 약 15년 7개월에 걸쳐 있다.

LLM 보조 4층 정제 절차




그림 1. LLM 보조 4층 정제 절차. 규칙 기반 1차 분류로 분량을 줄이고, 경계 사례에만 LLM 판정(③)을 적용한 뒤 사람이 본문을 보수적으로 확정한다.

원자료에서 본문 코퍼스로




그림 2. 원자료 3,652건이 본문 코퍼스 361건으로 좁혀지는 정제 단계. 관련성 유지본 479건, 엄격 확정본 451건을 거쳐 본문 코퍼스 361건(원자료의 9.9%)이 분석에 사용되었다.

분석 틀

분석 틀은 두 층이다. **1) 경험 극성**은 작업동맹의 세 층(유대·과제·목표)이고, **2) 사건 언어**는 무시당함·강제성·상처·이해받음·안도·성장의 여섯 코드다. 부트스트랩 재표집을 통해 분포의 안정성을 확인했다. 이 분석은 한국상담학회 학술대회 포스터 (2026)

연구 결과

기초 분포

본문 코퍼스 361건의 경험 극성은 부정 117·혼합 91·긍정 126·중립 27건으로, 부정과 긍정이 거의 같은 비중으로 함께 들어왔다. 장면은 일반 정신건강 상담 268건과 청소년 학교상담 93건(약 26%)으로 나뉘었다.




그림 3. 본문 코퍼스 361건의 분포. (a) 경험 극성: 긍정 126·부정 117·혼합 91·중립 27건으로 부정과 긍정이 비슷한 비중을 차지한다. (b) 장면: 일반 정신건강 상담 268건, 청소년 학교상담 93건(약 26%). (c) 상위 질의군에는 파열 경험(트라우마·억지로·안 도움)과 회복 경험(편해졌·받길 잘했)이 함께 나타난다.

면접 기반 선행 연구와의 비교

표 1. 면접 기반 선행 연구와 본 SNS 자료의 분포 비교. 본 연구의 과정 코드는 문보경·장성숙(2001)의 범주를 출발점으로 만든 것이며, 두 자료원의 결과가 같은 모집단의 일치를 의미하지는 않는다.

측면	면접 자료 (문보경·장성숙, 2001)	본 SNS 자료
자료원	내담자 면접·개방형 질문지	한국어 공개 X 경험 글
분석 단위	사례 단위 사건 회고	게시물 단위 경험 글
부정 표지	원치 않는 반응, 해결책 부재, 상담자의 요구, 상처 경험	강제성 0.350, 무시당함 0.470, 상처 0.231 (부정 117건 기준)
분석 깊이	사례별 깊이 있는 합의 부호화	분포 수준의 탐색적 부호화

과정 코드의 극성별 대비

부정 경험 117건에서는 작업동맹 유대 63.2%·과제 69.2%·목표 59.0%가 부정 정렬, 긍정 경험 126건에서는 유대 80.2%·과제 81.7%·목표 84.9%가 긍정 정렬이었다. 여섯 과정 코드의 대비는 부트스트랩에서 모두 0을 가로지르지 않았다(예: 무시당함 $-0.431 [-0.506, -0.350]$, 안도 $+0.434 [0.344, 0.517]$).




그림 4. 부정 경험(n=117)과 긍정 경험(n=126)의 과정 코드 대비. 부정 경험에서는 무시당함(0.47)·강제성(0.35)·상처(0.23)가, 긍정 경험에서는 안도(0.48)·성장(0.41)·이해받음(0.33)이 두드러진다. 여섯 코드의 부트스트랩 신뢰구간은 모두 0을 가로지르지 않았다.

결론

- **정제 절차의 제안:** 규칙 기반 선별과 LLM 판정을 결합한 4층 정제 절차로 한국어 공개 SNS 상담 경험 자료를 처음으로 본문 코퍼스(361건)로 정리했다.
- **부정·긍정 공존:** 정식 표본에서 과소표집되던 부정 경험이 익명 환경에서는 긍정 경험과 거의 같은 비중으로 함께 기록되었다.
- **사건 언어의 구분:** 부정 경험은 “끌려감·무시당함·상처받음”, 긍정 경험은 “이해받음·안도·변화”의 구조로 분포 수준에서 구분되며, 면접 기반 선행 연구(문보경·장성숙, 2001)와 유사한 형태로 나타났다.
- **한계와 전망:** 본 결과는 사람 합의 코딩 부재와 표집 편향의 한계 위에서 관찰된 기술적 사례 보고이며, 후속 합의적 질적 연구와 면접·SNS 직접 비교 연구의 출발 자료로 쓸 수 있다.