

4. 표본 데이터의 요약 (2)

수치적 기술통계

• 중심 위치 척도

표본 자료 x_1, \dots, x_n 이 주어졌을 때,

▪ 표본 평균(Sample Mean) – 산술평균 (Arithmetic Mean)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- ♦ 가장 대표적인 중심위치 척도
- ♦ 이상치(outlier)에 민감함.

▪ 표본 중위수, 중앙값 (Sample Median)

- ♦ 표본 자료를 오름차순 정렬한 자료 $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ 에 대하여,

$$x_{med} = x_{((n+1)/2)}$$

- ♦ 이상치(outlier)에 민감하지 않음.

▪ 표본 최빈값 (Sample Mode)

- ♦ 가장 빈도가 높은 값 또는 구간

수치적 기술통계

- ◆ 예제

- 8 개의 금융기관 별로 어느 달에 기업고객 중 부도업체 수를 다음과 같이 정리하였다. 표본평균과 표본 중위수를 구하여라.

2, 8, 3, 5, 6, 9, 4, 1

수치적 기술통계

- 중심 위치 척도

표본 자료 x_1, \dots, x_n 이 주어졌을 때,

- 기하평균(Geometric Mean)

$$G = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n} = (x_1 \cdot x_2 \cdots x_n)^{1/n}$$

- ♦ 증가율, 성장률, 변화율 등의 배수 자료에 대한 중심값으로 활용됨.
 - ♦ 모든 자료의 값이 양수여야 계산할 수 있음.

수치적 기술통계

- ◆ 예제

- 다음은 어느 기업의 최근 5년간 주당순이익(EPS) 자료이다.

| 사업연도 | 제 45 기 | 제 46 기 | 제 47 기 | 제 48 기 | 제 49 기 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EPS | 1078 | 7369 | 4815 | 2179 | 1981 |

이 기업의 5년간 연평균 EPS 성장률은 얼마인지 구하여라.

수치적 기술통계

- 상대적 위치 척도

- 백분위수, 퍼센타일(Percentile)

$$x_{(L_p)}, \text{ 단, } L_p = \frac{p}{100}(n+1) \text{ 임.}$$

- ♦ 전체 자료의 $p\%$ 는 p 백분위수보다 작은 것으로 해석

- 사분위수 (Quartile) : Q1, Q2, Q3

- ♦ Q1($= x_{((n+1)/4)}$) : 25퍼센타일, 1사분위수
 - ♦ Q2($= x_{((n+1)/2)}$) : 중위수, 50 퍼센타일, 2사분위수
 - ♦ Q3($= x_{(3(n+1)/4)}$) : 75 퍼센타일, 3사분위수

수치적 기술통계

- ◆ 예제

- 8 개의 금융기관 별로 어느 달에 기업고객 중 부도업체 수를 다음과 같이 정리하였다. '사분위수 Q1과 Q3를 구하여라.

2, 8, 3, 5, 6, 9, 4, 1

수치적 기술통계

- 변동성 척도

표본 자료 x_1, \dots, x_n 이 주어졌을 때,

- 범위 (Range)

$$\max(x_i) - \min(x_i)$$

- ♦ 이상치에 민감함.

- 사분위간 범위 (IQR, Inter Quartile Range)

$$Q3 - Q1$$

- ♦ 가운데 50%에 해당하는 자료의 범위로 이상치에 민감하지 않음.

수치적 기술통계

- 표본 분산 (Sample Variance)

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- ◆ 가장 대표적인 변동성 척도
- ◆ 모든 자료값을 반영하여 변동성을 측정함.
- ◆ 음의 값을 가질 수 없음.
- ◆ 값이 클수록 자료값의 변동성이 크다는 것을 의미함.
- ◆ 자료 값의 단위가 제곱됨.

수치적 기술통계

- 표본 표준편차 (Sample Standard Deviation)

$$s = \sqrt{s^2}$$

- ♦ 자료 값의 단위와 표본 표준편차의 단위는 동일하기 때문에 해석이 용이함.

- 변동계수 (Coefficient of Variation)

$$cv = s/\bar{x}$$

- ♦ 단위가 다르거나, 평균 차이가 큰 여러 변수의 변동성 비교에 활용됨.

수치적 기술통계

- ◆ 예제

- 어느 금융기관 여신담당자로부터 9개 기업의 신뢰도를 설문조사한 결과 다음과 같은 점수를 얻었다. 이 자료에 대한 표본 표준편차를 구하고 이를 해석하여라.

4, 9, 2, 5, 6, 9, 8, 6, 5

수치적 기술통계

- ◆ 예제

- A사와 B사에 대하여 주당수익률 자료를 조사한 결과 A사의 주당수익률은 평균이 2000원, 표준편차는 300원이었고, B사는 평균이 5000원, 표준편차는 600원이었다고 한다. 어느 회사의 주당수익률이 더 안정적이라고 말할 수 있는가?

수치적 기술통계

▪ 통신요금 예제

- ♦ 통신요금 데이터(telephone_bills.csv)을 이용하여 월 청구액에 대한 다음의 기술통계량 값을 구하여라.
 - 표본 평균, 표본 중위수, 범위, 표본 분산, 표본 표준편차, 변동계수.
 - Q1, Q3, IQR
 - 30th 퍼센타일, 80th 퍼센타일

```
> longdist <- read.csv('telephone_bills.csv')
> head( longdist )
      Bills
1  42.19
2  38.45
3  29.23
4  89.35
5 118.04
6 110.46
```

수치적 기술통계

```
> bills <- longdist$Bills
> mean( bills )
[1] 43.5876
> median( bills )
[1] 26.905
> range( bills )
[1] 0.00 119.63
> diff( range( bills ) )
[1] 119.63
> var( bills )
[1] 1518.638
> sd( bills )
[1] 38.96971
> sd( bills )/mean( bills )
[1] 0.8940549
```

수치적 기술통계

```
> quantile( bills )  
      0%      25%      50%      75%     100%  
 0.0000  9.3850 26.9050 84.8275 119.6300  
> quantile( bills , prob=c(0.3, 0.8))  
    30%    80%  
11.529 90.428
```

수치적 기술통계

• 선형적 연관성 척도

표본 자료 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ 이 주어졌을 때,

▪ 표본 공분산 (Sample Covariance)

$$s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}$$

♦ 선형관계의 방향

- $s_{xy} > 0$: 양의 선형 관계, 비례관계
- $s_{xy} < 0$: 음의 선형 관계, 반비례관계

♦ 선형관계의 강도

- $-s_x s_y \leq s_{xy} \leq s_x s_y$ by Cauchy-Schwarz 부등식

♦ 표본 공분산은 x 와 y 의 측정 단위에 의존하는 지표임.

- $x' = ax + b$ 이고 $y' = cy + d$ 인 경우에, $s_{x'y'} = ac \cdot s_{xy}$

수치적 기술통계

▪ 표본 상관계수 (Sample Correlation)

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$$

- $-1 \leq r_{xy} \leq 1$, by Cauchy-Schwarz 부등식
- ♦ 선형관계의 방향
 - $r_{xy} > 0$: 양의 선형관계
 - $r_{xy} < 0$: 음의 선형관계
- ♦ 선형관계의 강도
 - $|r_{xy}| \approx 0$: 강도가 약함.
 - $|r_{xy}| \approx 1$: 강도가 강함.
- ♦ 표본 상관계수는 x 와 y 의 측정 단위에 의존하지 않음.
 - $x' = ax + b$, $y' = cy + d$ 이고, $ac > 0$ 인 경우에, $r_{x'y'} = r_{xy}$

수치적 기술통계


♦ MBA 학생들의 GMAT과 GPA 예제

- 어느 학교는 MBA 프로그램을 3년 짜 운영 중이다. 이 학교에서는 입학생들의 GMAT 점수가 MBA 성과를 얼마나 잘 예측하는지 판단하기 위해 12명의 졸업생을 대상으로 각 졸업생들의 학기 평균 GPA 점수(0에서 12 사이의 값)와 입학 시 제출한 GMAT 점수(200에서 800 사이의 값)를 조사해 보았다. 이 자료(GMAT_and_GPA_scores_for_MBA_students.csv)를 이용하여 GMAT 점수와 GPA 점수 간의 표본 공분산과 표본 상관관계를 도출하고 그 결과를 해석하여라.

```
> scores <- read.csv('GMAT_and_GPA_scores_for_MBA_students.csv')
> head( scores )
  GMAT  GPA
1  599  9.6
2  689  8.8
3  584  7.4
4  631 10.0
5  594  7.8
6  643  9.2
> gmat <- scores$GMAT
> gpa <- scores$GPA
```

수치적 기술통계

```
> plot( gmat, gpa )
```



```
> cov( gmat, gpa )
```

```
[1] 26.16364
```

```
> cor( gmat, gpa )
```


```
[1] 0.5364827
```

수치적 기술통계

• 분포의 형태에 관한 척도

- 왜도 계수(Coefficient of Skewness): 분포의 **비대칭** 정도를 나타내는 척도.
 - ♦ 양의 왜도 : 오른쪽 꼬리가 길게 늘어진 형태
 - ♦ 음의 왜도 : 왼쪽 꼬리가 길게 늘어진 형태


$$skewness = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{s^3} \right]$$



수치적 기술통계

- 첨도계수 (Coefficient of Kurtosis) : 분포의 **뾰족함** 정도를 나타내는 척도.
 - ◆ 양의 첨도 : 정규분포에 비해 꼬리가 얇고 봉우리가 뾰족한 형태
 - ◆ 음의 첨도 : 정규분포에 비해 꼬리가 두껍고 봉우리가 뭉툭한 형태

$$kurtosis = \frac{n(n-1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{s^4} \right] - 3$$



수치적 기술통계

▪ 통신요금 예제

- ♦ 통신요금 데이터(telephone_bills.csv)을 이용하여 월 청구액에 대한 다음의 기술통계량 값을 구하여라.
 - 왜도 계수, 첨도 계수

```
> billdata <- read.csv('telephone_bills.csv')
> bills <- billdata$Bills
> install.packages('moments')
...
```

package 'moments' successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in ...

```
> library( moments )
> skewness( bills )
[1] 0.5373048
> kurtosis( bills )
[1] 1.710315
```