EzEMR • 復健紀錄

復健病歷：示範個案03｜複視（DEMO-DIPLOPIA）
日期：2026-10-26　次數：3　類型：療程後評估　治療師：示範治療師（虛構）　時間：45 分鐘
服務型態：面對面
診斷：虛構情境：近距離間歇性雙眼複視，持續閱讀時較明顯。
轉介原因：完全虛構的操作示範資料，不含真實病人資訊，非診療建議。

S：主觀描述
閱讀帳單時文字偶爾變成兩個影像，需要停止閱讀；希望能連續看完一頁資料。
個案回饋：示範回饋：希望繼續練習相同日常目標。

O：評估
閱讀期間回報複視 4 次，仍有近距離不適。
症狀自評（0 至 10）：Eye fatigue / Blurred vision / Dizziness / Headache / Nausea
 復健前：2 / 1 / 0 / 0 / 0，總分 3
 復健後：3 / 1 / 0 / 0 / 0，總分 4（與首次差異 +1）
 恢復後：2 / 1 / 0 / 0 / 0，總分 3（與首次差異 0），恢復時間 10 分鐘

視覺功能：
 [x] 臨床輻輳評估（NPC）：基本視覺功能：輻輳
  NPC 分離點（cm）：12
  NPC 恢復點（cm）：17
  備註：完全虛構的操作示範結果。
 [x] 集合近點（短期 NPC）：短期功能成效
  訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:00
  訓練前 1：重複測量各次結果／流程：12 / 13 / 11 cm
  訓練前 1：NPC 破裂點平均（cm）：12
  訓練前 1：NPC 恢復點平均（cm）：17
  訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:45
  訓練後立即：重複測量各次結果／流程：12 / 12 / 12 cm
  訓練後立即：NPC 破裂點平均（cm）：12
  訓練後立即：NPC 恢復點平均（cm）：17
  測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：相同近距離視標與眼鏡，三次測量取平均，距離以 cm 記錄；僅為虛構結果。 • 主要結果指標（擇一）：NPC 破裂點平均（cm） • 訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。
  備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。

功能表現：

[x] COPM：職能表現與滿意度

在固定距離閱讀帳單 10 分鐘：表現 6，滿意度 5

平均：表現 6（+2，相較 2026-10-05），滿意度 5（+2，相較 2026-10-05）

備註：虛構個案自評，沿用相同優先作業。

[x] 日常作業表現：功能表現

作業／量測指標：在固定距離閱讀帳單 10 分鐘

表現／觀察：閱讀期間回報複視 4 次，仍有近距離不適。

備註：完全虛構的日常任務觀察。

[x] 10 分鐘閱讀複視次數：功能性視覺

出現複視次數（次）：4

備註：完全虛構的操作示範結果。

本次反應

個案自評整體耐受度：7/10

A：PEO 臨床推理

個人：閱讀帳單時文字偶爾變成兩個影像，需要停止閱讀；希望能連續看完一頁資料。

環境：閱讀距離 40 cm、相同字級及照明，沿用原有眼鏡；短期測量前後條件相同。

作業：在固定距離閱讀帳單 10 分鐘

臨床判斷與介入規劃

分開記錄集合近點、閱讀複視次數及眼睛疲勞，不將自訂次數當成診斷量表。

症狀連結 1 / 視覺功能

主要症狀／功能困難：閱讀帳單時文字偶爾變成兩個影像，需要停止閱讀；希望能連續看完一頁資料。

推理面向：個人、環境、作業

臨床推理與依據：分開記錄集合近點、閱讀複視次數及眼睛疲勞，不將自訂次數當成診斷量表。

集合功能（NPC）：訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26

09:00；訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26

09:45；工具／流程／計分規則／測試條件：相同近距離視標與眼鏡，三次測量取平均，距離以 cm 記錄；僅為虛構結果。；主要結果指標（擇一）：NPC

破裂點平均（cm）；訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見

P；前後使用等難度材料。；訓練前 1：NPC 破裂點平均（cm）：12；訓練後立即：NPC

破裂點平均（cm）：12；訓練前 1：NPC 恢復點平均（cm）：17；訓練後立即：NPC

恢復點平均（cm）：17；訓練前 1：重複測量各次結果／流程：12 / 13 / 11

cm；訓練後立即：重複測量各次結果／流程：12 / 12 / 12

cm；備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。
輻輳評估：NPC 分離點（cm）：12；NPC 恢復點（cm）：17；備註：完全虛構的操作示範結果。
10 分鐘閱讀複視次數：出現複視次數（次）：4；備註：完全虛構的操作示範結果。
日常作業表現：作業／量測指標：在固定距離閱讀帳單 10 分鐘；表現／觀察：閱讀期間回報複視 4 次，仍有近距離不適。；備註：完全虛構的日常任務觀察。
其他依據與觀察：完全虛構的示範數據，未施測項目不填數值。
介入處置：面對面 / 代償 / 活動節律與休息安排；面對面 / 調適 / 作業任務型態調整
凝視訓練、聚散運動（輻輳／開散）

P：介入與計畫

復能

- 眼動訓練：20 分鐘
  活動：凝視訓練：25 秒，3 回合、聚散運動（輻輳／開散）：3 分鐘，休息 1 次
  程式／設備：虛構操作示範
  個案自評難度：4/10
  觀察：閱讀距離 40 cm、相同字級及照明，沿用原有眼鏡；短期測量前後條件相同。

其他治療／居家計畫：虛構居家練習紀錄：依本次活動目標記錄執行情形與休息需求。

調適

[x] 作業任務型態調整
[x] 環境調整
備註：閱讀距離 40 cm、相同字級及照明，沿用原有眼鏡；短期測量前後條件相同。

代償

[x] 活動節律與休息安排
備註：示範方案：記錄提示方式與分段休息，不以單次分數差推定療效。

後續計畫

示範紀錄：以相同條件追蹤「在固定距離閱讀帳單 10 分鐘」，分別記錄功能表現及活動後不適。
下次復健：2026-11-09