ZUKUNFT LAND

Havelland

Gesamtdatenbericht

Erstellt am 2026-11-04

Brandenburg

NUTS-3-Regionen: DE408



Abbildung 1: Das Living Lab Havelland: Untersuchungsgebiet (links) und seine Lage in Deutschland (rechts). Hintergrundkarte: Tiles © Esri - Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community

Landwirtschaft

Kennzahlen

ACKERLAND	ANZAHL BETRIEBE	DURCHSCHNITTLICHE BETRIEBSGROESSE	ANTEIL OEKOLOGISCHER LANDBAU
58.936 ha	**355** Anzahl	**252** ha	**14,1** %




Abbildung 2: Karte zu Landwirtschaft im Living Lab Havelland (Daten: Anbaukulturen (DLR, 2024))

Übersicht

Landwirtschaft und Viehzucht prägen weite Teile des Havellands. Über 80 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden von Betrieben bewirtschaftet, die jeweils mehr als 100 ha Ackerland besitzen. Kleinbetriebe machen lediglich 3,6 % der Fläche aus. Aufgrund des hohen Grünlandanteils in der Region sind Rinder-, Pferde- und Schafzucht von besonderer Bedeutung. Es wird eine große Vielfalt an Kulturpflanzen angebaut, von Roggen und Gerste bis hin zu Mais, Kartoffeln, hochwertigem Weizen und Rüben. Teile der Havelländischen Luch sind aufgrund ihrer Nähe zum Grundwasser zudem für den Ackerbau attraktiv.

Herausforderungen

Die Landwirtschaft im Landkreis Havelland ist durch die Lage und die Bodenverhältnisse (Feuchtgebiete, überwiegender Grünlandanteil, unterschiedliche Bodenqualität) geprägt und unterliegt gleichzeitig wachsenden externen Anforderungen (Tierschutz, Biodiversität, Umweltschutz, Wirtschaftlichkeit, Klimawandel sowie im Osten der Region: Flächennutzungsdruck durch konkurrierende Landnutzer). Die Kombination verschiedener Nutzungsformen (Ackerland, Grünland, Tierhaltung) und die Abstimmung mit Wasser-, Boden- und Naturschutzverbänden machen die Situation komplex. Anforderungen an die Wasserwirtschaft stehen im Widerspruch zu veralteter Wasserregulierungstechnik.

Klima

Kennzahlen

WAERMESUMME, JAHRESSUMME (BASIS 5 °C)	MITTLERE JAHRESTEMPERATUR	JAHRESNIEDERSCHLAG	NIEDERSCHLAG DES WAERMSTEN VIERTELJAHRES
2.033 °C·d +1.139 °C·d bis 2071-2100	**9,5** °C +4 °C bis 2071-2100	**584** mm +2,6 % bis 2071-2100	**181** mm -6,4 % bis 2071-2100




Abbildung 3: Karte zu Klima im Living Lab Havelland (Daten: Klima (CHELSA V2.1 / CMIP6): Wachstumsgradtage, Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag, Niederschlag im waermsten Quartal)

Ueber das Jahr summierte Waerme oberhalb von 5 °C - ein Mass dafuer, wie viel Vegetationszeit eine Kultur erhaelt.
Mittlere jaehrliche Lufttemperatur, gemittelt ueber den Referenzzeitraum.
Ueber das Jahr summierter Gesamtniederschlag.
Niederschlag im waermsten Vierteljahr - relevant fuer sommerlichen Trockenstress.

Havelland




Abbildung 4: Diagramm zu Klima im Living Lab Havelland (Daten: Klima (CHELSA V2.1 / CMIP6): Wachstumsgradtage, Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag, Niederschlag im waermsten Quartal)

Übersicht

Der Landkreis Havelland wird nach wie vor als Teil der nordostdeutschen Tiefebene angesehen, die von maritimen Einflüssen geprägt ist. Die Sommer sind relativ warm, und die Niederschlagsmengen im Sommer liegen mit 250—350 mm etwas höher als im Rest des Jahres. Im Winter, der im Durchschnitt als mild bis mäßig kalt einzustufen ist, gibt es mehr Tage mit Niederschlag als im Sommer, allerdings bei geringeren Gesamtniederschlagsmengen.

Herausforderungen

Aufgrund der zunehmenden Verdunstung verschlechtert sich der klimatische Wasserhaushalt im betrachteten Gebiet insgesamt. Dies macht sich insbesondere im Sommer bemerkbar und ist eine Entwicklung, die in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Die Jahresniederschläge verteilen sich auch im Havelland immer stärker auf Starkregenereignisse, die von immer längeren Dürreperioden unterbrochen werden.

Boden

Kennzahlen

STICKSTOFFUEBERSCHUSS	PHOSPHORUEBERSCHUSS	GRUNDWASSERENTNAHME (NICHTOEFFENTLICHE VERSORGUNG)
Keine Daten verfügbar kg N/ha LF	**Keine Daten verfügbar** kg P/ha LF	**956** 1000 cbm




Abbildung 5: Karte zu Boden im Living Lab Havelland (Daten: Bodenuebersichtskarte (BUEK250))
Die Legende zeigt die dominanten Bodengruppen dieses Living Labs; Farben folgen der semantischen Hauptgruppe, waehrend Detailangaben erst im Tooltip erscheinen.

Übersicht

Havelland gehört zur norddeutschen Tiefebene und verfügt über sandige Schwemmlandböden. Die Qualität der Ackerböden nimmt von Westen nach Osten zu. Das Havelland verfügt noch über ca. 28.000ha an Moorböden. Die Nitratbelastung der Böden ist im deutschlandweiten Vergleich eher gering.

Herausforderungen

Die Böden der Ackerbaustandorte im Havelland sind wie in anderen deutschen Region auch von Degradation betroffen. Die Moorböden wurden durch die jahrzehntelange Entwässerung der Landschaften vielerorts irreversibel abgebaut.

Soziooekonomie

Kennzahlen

BEVOELKERUNG INSGESAMT	BRUTTOINLANDSPRODUKT JE EINWOHNER	ARBEITSLOSENQUOTE	VERFUEGBARES EINKOMMEN JE EINWOHNER
169.721 Personen	26.345 EUR	6,7 %	26.615 EUR




Abbildung 6: Karte zu Soziooekonomie im Living Lab Havelland (Daten: Bodenrichtwerte (BORIS))




Abbildung 7: Diagramm zu Soziooekonomie im Living Lab Havelland (Daten: Bodenrichtwerte (BORIS))

Übersicht

Die sozioökonomische Lage der Region Havelland wird stark durch ihre Nähe zu Berlin geprägt, wobei sich der östliche Teil der Region, der in der Nähe der Hauptstadt liegt, deutlich vom ländlichen westlichen Teil unterscheidet. Die Bevölkerungs- und Bebauungsdichte ist im Osten wesentlich höher. Die Städte Falkensee und Nauen, die in der Nähe von Berlin liegen, sind in den letzten Jahren rasant gewachsen, und der Landkreis gehört hinsichtlich der positiven Wanderungsbilanz zu den 15 führenden in Deutschland. Auch die meisten Industrieunternehmen (insbesondere im Logistiksektor) sind im Osten des Kreises angesiedelt. Die Bedeutung des Tourismus (insbesondere des Wassertourismus) hat in letzter Zeit zugenommen. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Rest des Landes relativ niedrig. Die Haushaltseinkommen gehören jedoch zu den niedrigsten in Deutschland.

Herausforderungen

Die Landwirtschaft im Havelland steckt in einem Strukturwandel. Die traditionelle extensive Grünlandbewirtschaftung der Region mit ihren Viehbeständen, befindet sich in einer Degressionsphase. Neue, lukrative Geschäftsmodelle für die Bewirtschaftung von Feuchtwiesen werden gesucht. Für die zum Teil sehr großen Betriebseinheiten aus DDR-Zeit werden zeitnah Nachfolger gebraucht. Die Marktvorteile der nahen Metropolregion Berlin für mehr regionale Produktion und Absatz werden noch nicht voll ausgeschöpft.

Landschaft

Kennzahlen

WALDFLAECHE	NATURA-2000-FLAECHE	NATURSCHUTZGEBIETSFLAECHE	ANTEIL VERSIEGELTER FLAECHE
44.150 ha	66.311,2 ha	21.153 ha	11 %




Abbildung 8: Karte zu Landschaft im Living Lab Havelland (Daten: Landbedeckung (Esri/Impact Observatory, 2024))




Abbildung 9: Karte zu Schutzgebiete im Living Lab Havelland (Daten: Schutzgebiete (BfN, 2019/2023))

Schutzgebiete, die diese Reallabor-Region schneiden. Es werden vollstaendige Polygongrenzen gezeigt, daher reichen Gebiete ueber den Regionsumriss hinaus und Ueberlagerungen sind moeglich. Quelle: BfN (FFH und Vogelschutz 2019, Naturschutzgebiete 2023) - nicht fuer Planungszwecke geeignet.

Übersicht

Ausgedehnte Urstromtalungen bestimmen das Landschaftsbild im Havelland. Inselartig ragen daraus Platten hervor (z.B. die Nauener Platte), die meistens Grundmoränen tragen. Ausgedehnten Wiesen in den Niederungen stehen Acker und Waldbestand auf den Hochgebieten (sog. „Ländchen„) gegenüber. Das mosaikartige Nebeneinander von Hochflächen mit Inselcharakter und ausgedehnten Niederungszügen bestimmen den

Charakter dieses Naturraumes. Die meist flachwelligen Inseln heben sich deutlich von den sie umgebenden Niederungen ab.

Herausforderungen

Die zum Teil aus der DDR-Zeit herrührenden Betriebsformen im Havelland haben zu der Entwicklung zum Teil sehr großer landwirtschaftlicher Schläge geführt, die tendenziell die Ausprägung von Monokulturen begleiten und die Resilienz von Landschaften schwächen. Aus Resilienzperspektive wäre eine stärkere Strukturierung der Landschaft anzustreben. Die Infrastrukturen zur Regulierung der Landschaftswasserstände sind vielerorts nicht intakt.