ZUKUNFT LAND

Hessisches Mittelgebirge

Gesamtdatenbericht

Erstellt am 2026-11-04

Hessen

NUTS-3-Regionen: DE722, DE723, DE725




Abbildung 1: Das Living Lab Hessisches Mittelgebirge: Untersuchungsgebiet (links) und seine Lage in Deutschland (rechts). Hintergrundkarte: Tiles © Esri - Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community

Landwirtschaft

Kennzahlen

ACKERLAND	ANZAHL BETRIEBE	DURCHSCHNITTLICHE BETRIEBSGROESSE	ANTEIL OEKOLOGISCHER LANDBAU
113.215 ha	3.832 Anzahl	54,32 ha	23,1 %




Abbildung 2: Karte zu Landwirtschaft im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Anbaukulturen (DLR, 2024))

Übersicht

Vergleichsweise hohe Viehbesatzdichte. Hoher Anteil an Grünland. Hoher Waldanteil. Relativ kleine Betriebs- und Feldgrößen.

Herausforderungen

Futtermittelproduktion problematisch (Boden für den Anbau ungeeignet), daher vorwiegend Grünlandwirtschaft. Rückgang in der Milchviehhaltung (-6 % Milchkühe, −14 % Betriebe). Konkurrenz um Flächen durch die Energieerzeugung (Windkraft, Photovoltaik).

Klima

Kennzahlen

WAERMESUMME, JAHRESSUMME (BASIS 5 °C)	MITTLERE JAHRESTEMPERATUR	JAHRESNIEDERSCHLAG	NIEDERSCHLAG DES WAERMSTEN VIERTELJAHRES
1.772 °C·d +1.085 °C·d bis 2071-2100	**8,6** °C +3,9 °C bis 2071-2100	**890** mm +2,8 % bis 2071-2100	**226** mm -8,6 % bis 2071-2100




Abbildung 3: Karte zu Klima im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Klima (CHELSA V2.1 / CMIP6): Wachstumsgradtage, Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag, Niederschlag im waermsten Quartal)

Ueber das Jahr summierte Waerme oberhalb von 5 °C - ein Mass dafuer, wie viel Vegetationszeit eine Kultur erhaelt.
Mittlere jaehrliche Lufttemperatur, gemittelt ueber den Referenzzeitraum.
Ueber das Jahr summierter Gesamtniederschlag.
Niederschlag im waermsten Vierteljahr - relevant fuer sommerlichen Trockenstress.

Hessisches Mittelgebirge




Abbildung 4: Diagramm zu Klima im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Klima (CHELSA V2.1 / CMIP6): Wachstumsgradtage, Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag, Niederschlag im waermsten Quartal)

Übersicht

Bei Ausrichtung der Mittelgebirge zur Hauptwindrichtung sind stark ausgeprägte Steigungsregen - im Windschatten der Gebirge geringere Niederschläge zu erwarten. Es herschen niedrigere Temperaturen im Vergleich zur Ebene vor. Die Schneebedeckung im Winter ist höher und dauert länger an als in den Niederungen.

Herausforderungen

Auch in den Mittelgebirgen werden häufiger Starkregenereignissen und eine höhere Anzahl von Hitzetagen verzeichnet. Dies kann sich schädlich auf die Futterproduktion auswirken.

Boden

Kennzahlen

STICKSTOFFUEBERSCHUSS	PHOSPHORUEBERSCHUSS	GRUNDWASSERENTNAHME (NICHTOEFFENTLICHE VERSORGUNG)
Keine Daten verfügbar kg N/ha LF	**Keine Daten verfügbar** kg P/ha LF	**2.244** 1000 cbm




Abbildung 5: Karte zu Boden im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Bodenuebersichtskarte (BUEK250))
Die Legende zeigt die dominanten Bodengruppen dieses Living Labs; Farben folgen der semantischen Hauptgruppe, waehrend Detailangaben erst im Tooltip erscheinen.

Übersicht

Die Bodenarten sind sehr unterschiedlich: podzolische Braunböden mit geringer Basensättigung, roter Sandstein, Braunböden mit hoher bis mittlerer Basensättigung, Pseudogley, Parabraunböden aus Löss mit hoher Basensättigung, Rendzina auf kalkhaltigen Standorten (lokal begrenzt).

Herausforderungen

Bodenerosion bei Starkregenereignissen. Lokal flachgründige, nicht ackerfähige Böden.

Soziooekonomie

Kennzahlen

BEVOELKERUNG INSGESAMT	BRUTTOINLANDSPRODUKT JE EINWOHNER	ARBEITSLOSENQUOTE	VERFUEGBARES EINKOMMEN JE EINWOHNER
1.041.453 Personen	**43.153,6** EUR	**5,34** %	**26.575,6** EUR



Abbildung 6: Karte zu Soziooekonomie im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Bodenrichtwerte (BORIS))

Hessisches Mittelgebirge




Abbildung 7: Diagramm zu Soziooekonomie im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Bodenrichtwerte (BORIS))

Übersicht

Randgebiete — große Entfernungen zu regionalen Zentren. Bevölkerungsstruktur: Rückgang, Überalterung. Vergleichsweise geringes verfügbares Haushaltseinkommen.

Herausforderungen

Die Absatzmärkte für Produkte (Milch, Fleisch usw.) liegen weit entfernt, es gibt weniger Möglichkeiten für den Direktvertrieb, und die Entfernungen zu Schlachthöfen und Verarbeitungsbetrieben sind groß. Es herrscht Arbeitskräftemangel aufgrund von Abwanderung und einer alternden Bevölkerung.

Landschaft

Kennzahlen

WALDFLAECHE	NATURA-2000-FLAECHE	NATURSCHUTZGEBIETSFLAECHE	ANTEIL VERSIEGELTER FLAECHE
214.513 ha	93.449,7 ha	4.475,8 ha	15 %




Abbildung 8: Karte zu Landschaft im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Landbedeckung (Esri/Impact Observatory, 2024))




Abbildung 9: Karte zu Schutzgebiete im Living Lab Hessisches Mittelgebirge (Daten: Schutzgebiete (BfN, 2019/2023))

Schutzgebiete, die diese Reallabor-Region schneiden. Es werden vollstaendige Polygongrenzen gezeigt, daher reichen Gebiete ueber den Regionsumriss hinaus und Ueberlagerungen sind moeglich. Quelle: BfN (FFH und Vogelschutz 2019, Naturschutzgebiete 2023) - nicht fuer Planungszwecke geeignet.

Übersicht

Mittelgebirgsregionen in 400—1000 m Höhe mit hoher Reliefenergie. Strukturreiche Landschaft durch Hecken und Säume. Kleinteiliger Wechsel von Grünland und Äckern. Die Beibehaltung der Grünlandwirtschaft ist abhängig von der Anzahl der viehhaltenden Betrieben.

Herausforderungen

Periphere Räume sind einem hohen Druck durch die Errichtung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen ausgesetzt. Große Flächenanteile sind durch Naturschutzrechtliche Auflagen (z.B. Natura 2000) in der Nutzung eingeschränkt. Der Rückgang von Haupt- und v.a. Nebenerwerbslandwirten wird eine Änderung des Landschaftsbildes hin zu einheitlicheren Strukturen zur Folge haben.