

Guía rápida para la identificación de

Aves, Árboles y Arbustos comunes en la Comuna 22

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

80 años Construyendo Futuro
Universidad del Valle

COMITÉ AMBIENTAL COMUNA 22

OAC22
OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA COMUNA 22

Grupo de Investigación en Ecología Animal

Guía rápida para la identificación de

Aves, Árboles y Arbustos comunes en la Comuna 22

Giraldo López, Alan
Guía rápida para la identificación de aves, árboles y arbustos comunes en la comuna 22 / Alan Giraldo López, Mario Fernando Garces Restrepo, Pamela Carvajal– Primera edición.
Cali: Universidad del Valle - Programa Editorial, 2025.
80 páginas; 15 cm, (Colección: Institucional)
1. Ecología – 2. Biodiversidad -- 3. Conservación -- 4. Diversidad – 5. Gestión Ambiental -- 6. Cali – 7. Colombia.

XXX XXX. XX ed.
XXXX
Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal

Universidad del Valle
Título: Guía rápida para la identificación de aves, árboles y arbustos comunes en la comuna 22
Autores: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Universidad del Valle
ISBN Impreso: ISBN Digital:
Primera edición, 2025

© Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
© Universidad del Valle

Director Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente: Mauricio José Mira Pontón
Rector Universidad del Valle: Guillermo Murillo Vargas

Textos: Alan Giraldo López, Mario Fernando Garcés, Pamela Carvajal
Edición: Alan Giraldo, Mario Fernando Garcés
Coordinador Editorial: Ricardo Cruz
Diseño y Diagramación: Ana María Estrada Angola
Fotografía: Mario Garcés, Ricardo Cruz, Pamela Carvajal, Luis Carlos Mora, María Alejandra Álvarez
Impresión: Stop Gráfico.

Esta cartilla o parte de ella, no puede ser reproducido por ningún medio sin autorización escrita del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente o la Universidad del Valle.

Contenido

Presentación.....7

Ecosistemas estratégicos en la comuna 22.....10

AVES 12

Guacharaca colombiana o Pava.....14
Pellar o Alcaraván 15
Garza real 16
Garcilla bueyera 17
Ibis negro o Coquito 18
Coquí.....19
Gavilán caminero 20
Gavilán aliancho 21
Gallinazo común 22
Halcón peregrino.....23
Caracara - garrapatero.....24
Cernícalo americano 25
Garrapatero común 26
Tórtola común 27
Guacamaya cariseca 28
Lora cabeciazul 29
Carpintero lineado 30
Carpinterito colombiano 31
Martín pescador amazónico 32

Martín pescador chico 33
Colibrí colirrufa 34
Zorzalito de Swainson.....35
Mirla común 36
Mosquero verde 37
Benteveo común 38
Pechírojo o Titiribí 39
Tirano gris 40
Suirirí 41
Tirano sabanero o tijereta.....42
Golondrina común.....43
Golondrina azul y blanca 44
Eufonia gorgiamarilla.....45
Piranga roja 46
Bolsero negrogular 47
Reinita amarilla 48
Reinita gorginaranja 49
Canario común 50
Tangara azul y negra 51
Tangara rastrojera 52
Azulejo común 53

ÁRBOLES Y ARBUSTOS.....54

Árbol Bala 56
Palma real 57

Palma de Navidad 58
Palma areca 59
Samán 60
Guácimo 61
Pizamo 62
Tambor 63
Acacia amarilla 64
Orejero 65
Algarrobo 66
Chiminango.....67
Acacia amarilla 68
Mamoncillo 69
Caracolí.....70
Tachuelo.....71
Amargo 72
Ceiba.....73
Gualanday 74
Guayacán rosado 75

Localidades importantes para el monitoreo de la biodiversidad en la comuna 22.....76

Presentación

La biodiversidad urbana no solo representa la variedad de especies presentes en un territorio, sino también la interacción dinámica entre los sistemas naturales y las actividades humanas. En este sentido, la Comuna 22 de Cali constituye un escenario privilegiado para comprender cómo los procesos de urbanización pueden coexistir con la conservación de ecosistemas estratégicos. Por lo tanto, identificar patrones de cambio en la biodiversidad permite anticipar riesgos, reconocer oportunidades de restauración y fortalecer la resiliencia ecológica de la ciudad.

Una actividad de utilidad para este propósito es el monitoreo participativo de la biodiversidad, esta actividad se convierte en una herramienta pedagógica y de gestión, donde la comunidad, la academia y las instituciones confluyen en la construcción de conocimiento compartido. Este enfoque reconoce que la sostenibilidad urbana depende tanto de la calidad de los ecosistemas como de la capacidad de los habitantes para observar, registrar y actuar frente a las transformaciones ambientales. De esta manera, los indicadores ecológicos se consolidan como instrumentos que integran ciencia y ciudadanía, aportando evidencia

para la toma de decisiones y promoviendo una cultura de corresponsabilidad ambiental.

Un indicador ecológico puede definirse como una medida cuantitativa o cualitativa que sintetiza información sobre el estado, la tendencia o la presión que enfrenta la biodiversidad en un territorio urbano. Para que sea efectivo, debe cumplir con ciertas características: ser sensible a cambios ambientales, fácil de medir y comprender por la comunidad, comparable en el tiempo y el espacio, relevante para la gestión ecológica y capaz de vincularse con procesos de participación ciudadana. En este sentido, los indicadores no solo reflejan la condición de los ecosistemas, sino que también funcionan como señales tempranas que orientan acciones de conservación, restauración y educación ambiental.

Para el Observatorio Ambiental de la Comuna 22 se definieron tres indicadores clave, seleccionados mediante talleres participativos y criterios técnicos de relevancia ecológica:

1. **Ecosistemas estratégicos:** este indicador reconoce y monitorea los corredores ambientales, ríos y humedales y parques o zonas verdes mayores a 2 ha de la comuna, expresando el porcentaje de superficie conservada respecto al área total.

2. **Especies de aves observadas:** las aves son un grupo versátil, de fácil observación y bioindicadores sensibles a cambios en el hábitat y la calidad ambiental. La riqueza de aves permite evaluar la salud de los ecosistemas y la efectividad de las acciones de conservación.

3. **Especies arbóreas y arbustivas:** este indicador caracteriza la riqueza de la vegetación en la comuna. Su seguimiento permite valorar la capacidad de regeneración natural, la provisión de servicios ecosistémicos como buena calidad de aire y de clima y el estado de las iniciativas de restauración.

La implementación de estos indicadores fortalece el Observatorio Ambiental como un espacio de diálogo entre instituciones, academia y ciudadanía. Al medir y comunicar de manera clara el estado de la biodiversidad, se generan insumos para la planificación territorial, la educación ambiental y la toma de decisiones responsables.

Ecosistemas estratégicos en la comuna 22

Un ecosistema estratégico es un área natural que, por su ubicación y funciones ecológicas, resulta esencial para garantizar la conectividad, la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la resiliencia ambiental de un territorio. Para el caso de Cali, los ecosistemas estratégicos se constituyen en un indicador que mide la proporción de corredores ambientales y parques o zonas verdes mayores a 2 ha definidos en el POT 2014, junto con ríos y humedales que garantizan conectividad ecológica y provisión de servicios ambientales.

Para su cálculo se emplea cartografía oficial y análisis de imágenes satelitales, delimitando las áreas de interés y excluyendo superficies duras como construcciones, vías y piscinas, que no aportan recursos ni conectividad funcional. El resultado se expresa como el porcentaje de superficie de ecosistemas estratégicos respecto al área total de la comuna, constituyendo una medida de resiliencia y conectividad ecológica.

El indicador de ecosistemas estratégicos permite evaluar la efectividad de acciones de conservación y restauración, orientar la planificación territorial y monitorear la presión urbana sobre espacios naturales. Para el 2025 se

considera que el área de la comuna 22 que ocupan los ecosistemas estratégicos presentes es de xx hectáreas, lo que corresponde al xx% del área total de la comuna 22.

Visualización de corredores ecológicos y humedales de la comuna 22



Fuente: GDB POT 2014.

AVES

Este indicador busca reconocer y monitorear las especies de aves presentes en la Comuna 22 de Cali, donde se han registrado más de 300 especies. Las aves son bioindicadores sensibles a cambios en el hábitat y la calidad ambiental, por lo que su seguimiento permite evaluar la salud de los ecosistemas y la efectividad de acciones de conservación. Este indicador se calcula mediante registros comunitarios en plataformas de ciencia ciudadana como eBird, comprobando su representatividad.

Si usted quiere aportar información para este indicador, se recomienda realizar jornadas de observación de aves temprano en la mañana (6–9 a.m.) y al final de la tarde (4–6 p.m.), cuando las aves están más activas. Es importante ubicar un lugar tranquilo con árboles, en zonas de humedales o a lo largo de corredores verdes. Como elemento esencial para esta actividad es necesario el uso de unos prismáticos o binoculares. Recuerde ajustar la distancia entre los oculares hasta que observe a través del instrumento una sola imagen. Una vez ajustada la distancia entre los oculares, busque el anillo central de enfoque y afine con el ocular derecho para mayor nitidez.

Para registrar sus datos, y que puedan ser utilizados para ciencia ciudadana, se recomienda utilizar la plataforma

digital eBird. Esta es una plataforma global de observación de aves creada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, USA. En esta plataforma se permite registrar especies vistas, lugar y hora, generando datos útiles para ciencia y conservación. Para acceder a la plataforma siga el enlace: https://ebird.org. Si es su primera visita realice el proceso de inscripción activando el enlace “Sign in” y luego “Create account”. Complete la información solicitada (nombre, correo electrónico y contraseña) para finalizar la inscripción. Una vez registrado, puede subir listas de observación a la plataforma, ya sea desde una página web o utilizando la aplicación móvil gratuita. Estos registros se integran en una base global que ayuda a científicos y comunidades a comprender mejor la distribución y abundancia de las aves.

A continuación, se desarrollan 40 fichas de aves que son comúnmente observadas en la comuna 22. Estas especies, además de ser abundantes y comunes en el paisaje urbano de la comuna 22, son importantes por su papel como bioindicadores y los servicios ecológicos que proporcionan a los ecosistemas urbanos y periurbanos. En esta recopilación se incluyen tanto aves residentes como migratorias, que utilizan los humedales, corredores verdes y áreas arboladas de la comuna 22 como hábitats críticos. Estas fichas permitirán a la comunidad reconocer las especies más representativas, comprender su función ecológica y participar activamente en su monitoreo mediante ciencia ciudadana.

Cracidae

Ortalis columbiana
Guacharaca colombiana o Pava



Descripción y ecología:

Ave galliforme de tamaño mediano, plumaje marrón y canto fuerte, gregaria y muy ruidosa. Endémica de Colombia, habita bosques secos, cafetales y áreas rurales arboladas. Se alimenta de frutos, hojas y semillas, siendo importante dispersora en ecosistemas intervenidos. Forma grupos familiares que se desplazan en matorrales y bordes de bosque. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: cacería para consumo, pérdida de hábitat por expansión agrícola y urbanización.

Vanellus chilensis
Pellar o Alcaraván

Charadriidae

Descripción y ecología:

Ave grande de plumaje gris con pecho blanco, alas negras y cresta oscura. Habita humedales, pastizales y campos agrícolas, alimentándose de insectos y pequeños invertebrados. Es muy territorial y emite fuertes vocalizaciones para defender su espacio. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: pérdida de humedales, perturbación humana en sitios de reproducción, atropellamientos en carreteras.

Falta

Ardea alba
Garza real

Descripción y ecología:

Garza grande y elegante de plumaje blanco, pico amarillo y patas negras. Mide cerca de 1 m y habita humedales, lagunas y estuarios. Se alimenta de peces, anfibios e invertebrados, caminando lentamente con el cuello extendido. Es común en Colombia y ampliamente distribuida en América. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: contaminación de cuerpos de agua, reducción de humedales, perturbación humana en sitios de alimentación.

Ardea ibis
Garcilla bueyera

Ardeidae

Descripción y ecología:

Ave blanca esbelta, con plumas doradas en cabeza y cuello durante la reproducción. Se asocia a ganado y cultivos, alimentándose de insectos y pequeños vertebrados. Muy adaptable a ambientes rurales y urbanos, cumple un rol de control biológico. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: pérdida de hábitat agrícola tradicional, uso intensivo de agroquímicos, atropellamientos en carreteras.

falta

Phimosus infuscatus

Ibis negro o Coquito

Descripción y ecología:

Ave zancuda de plumaje negro con pico largo y curvado hacia abajo. Habita humedales, pastizales y campos inundados, alimentándose de invertebrados acuáticos y pequeños anfibios. Se desplaza en bandadas y es común en llanuras y sabanas. En Colombia se observa en humedales urbanos y rurales. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: drenaje de humedales, contaminación de aguas, perturbación humana en sitios de alimentación.

Theristicus caudatus
Coquí

falta

Descripción y ecología:

Ave grande de plumaje gris con cara negra desnuda y pico largo curvado. Habita sabanas, humedales y campos abiertos, alimentándose de invertebrados y pequeños vertebrados. Se desplaza en grupos y es común en llanuras colombianas. Estado de conservación: Preocupación Menor (LC). Amenazas: drenaje de humedales, cacería y perturbación humana en sitios de alimentación.

Accipitridae

Rupornis magnirostris
Gavilán caminero

Descripción y ecología:

Rapaz mediana de plumaje marrón con pecho barrado y ojos amarillos. Habita áreas abiertas, bordes de bosque y zonas rurales, cazando pequeños mamíferos, reptiles e insectos. Se adapta bien a ambientes intervenidos, siendo común en Colombia. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: persecución humana por creencias, pérdida de hábitat y reducción de presas por agroquímicos.

Buteo platypterus

Gavilán aliancho

Accipitridae

Descripción y ecología:

Rapaz mediana de 34–44 cm, marrón grisáceo con partes inferiores barradas. Migratoria: se reproduce en Norteamérica y llega a Colombia entre octubre y abril. Se alimenta de pequeños mamíferos, reptiles e insectos. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: deforestación en áreas de invernada, colisiones con estructuras urbanas, alteración de rutas migratorias por cambio climático.

Cathartidae

Coragyps atratus
Gallinazo común





Descripción y ecología:

Ave carroñera grande, negra con cabeza desnuda grisácea. Habita zonas abiertas, carreteras y ciudades, cumpliendo un rol ecológico esencial como limpiador de carroña. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: persecución directa por percepción negativa, intoxicación por residuos contaminados, reducción de carroña disponible en áreas urbanas.

Falco peregrinus
Halcón peregrino

Falconidae

Descripción y ecología:

Rapaz poderoso, reconocida por su velocidad en picada (más de 300 km/h). Plumaje gris azulado con pecho barrado. Migratoria, presente en Colombia en invierno. Se alimenta de aves capturadas en vuelo. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: contaminación química (pesticidas, metales pesados), perturbación en sitios de nidificación, caza ilegal.

Falconidae

Daptrius chimachima
Caracara - garrapatero

Descripción y ecología:

Rapaz mediana de plumaje blanco y negro con rostro amarillento. Oportunista, se alimenta de carroña, insectos y pequeños vertebrados. Habita sabanas, áreas abiertas y zonas urbanas. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: tala de árboles grandes, fragmentación de bosques, reducción de hábitat para nidificación

Falco sparverius
Cernícalo americano

Falconidae

Descripción y ecología:

Pequeño rapaz de plumaje rojizo y azul grisáceo, con manchas negras en la cara. Se alimenta de insectos, pequeños mamíferos y reptiles. Habita áreas abiertas, campos y ciudades. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: pérdida de hábitat abierto, uso de pesticidas que reducen presas, colisiones con vehículos y estructuras.

Cuculidae

Crotophaga ani
Garrapatero común

Descripción y ecología:

Ave negra de pico curvado, gregaria y ruidosa. Se alimenta de insectos, pequeños vertebrados y parásitos del ganado. Habita áreas abiertas, pastizales y bordes de bosque. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: pérdida de hábitat abierto, uso de agroquímicos que disminuyen insectos, conflictos con ganadería intensiva

Columbina talpacoti

Tórtola común

Columbidae

Descripción y ecología:

Palomita pequeña de tonos rojizos y marrones, frecuente en áreas urbanas y rurales. Se alimenta de semillas en suelos abiertos y suele desplazarse en parejas o grupos pequeños. Muy común en Colombia. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: depredación por gatos domésticos, contaminación urbana, competencia con especies introducidas.

Psittacidae

Ara severus
Guacamaya cariseca





Descripción y ecología:

Guacamaya mediana de plumaje verde con frente castaña, pico gris oscuro y cola larga rojiza. Habita selvas húmedas, bordes de bosque y áreas intervenidas con árboles, desplazándose en parejas o grupos pequeños. Se alimenta de frutas, semillas y brotes, actuando como dispersor de semillas clave en ecosistemas tropicales. En Colombia se registra en la Amazonía y zonas urbanas con vegetación densa. Clasificada como de Preocupación Menor, enfrenta amenazas por pérdida de hábitat y tráfico ilegal, aunque mantiene poblaciones estables.

Pionus menstruus

Lora cabeciazul

Psittacidae



Descripción y ecología:

Loro mediano de plumaje verde con cabeza azul y pecho rojizo. Habita selvas húmedas, bordes de bosque y áreas urbanas con árboles frutales. Se alimenta de semillas, frutos y brotes, actuando como dispersor de semillas. En Colombia es frecuente en la Amazonía y zonas intervenidas. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: tráfico ilegal de fauna, deforestación y fragmentación de hábitat.

Picidae

Dryocopus lineatus
Carpintero lineado





Descripción y ecología:

Carpintero grande de plumaje negro con cresta roja y franjas blancas en las alas. Se alimenta de insectos xilófagos y larvas, excavando troncos. Habita bosques, áreas rurales y urbanas arboladas. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: tala de árboles grandes, fragmentación de bosques, reducción de hábitat para nidificación

Picumnus granadensis
Carpinterito colombiano

Picidae

Descripción y ecología:

Pequeño carpintero endémico de Colombia, con plumaje moteado y hábitos discretos. Habita bosques húmedos y áreas arboladas, alimentándose de insectos xilófagos y larvas. Su rol ecológico es clave en el control de plagas y en la regeneración de árboles. Estado de conservación: Casi Amenazado (NT). Amenazas: deforestación, pérdida de árboles viejos para anidación, fragmentación de hábitat.

Alcedinidae

Megaceryle torquata
Martín pescador amazónico

Descripción y ecología:

Gran martín pescador de plumaje azul con pecho rojizo y pico largo y fuerte. Habita ríos, lagunas y humedales, lanzándose en picada para capturar peces e insectos acuáticos. Se observa solitario o en parejas, defendiendo territorios de pesca. En Colombia se distribuye ampliamente en cuerpos de agua de tierras bajas y piedemonte. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: contaminación hídrica, reducción de peces por sobrepesca, alteración de riberas y canalización de ríos.

Chloroceryle americana
Martín pescador chico

Cerylidae



Descripción y ecología:

Pequeño martín pescador de 20 cm, verde brillante con manchas blancas en alas y cola. Macho con pecho castaño, hembra con pecho verdoso. Habita ríos, lagos, manglares y canales hasta 1500 m. Se alimenta de peces e insectos acuáticos, lanzándose en picada desde perchas. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: contaminación hídrica, reducción de peces por sobrepesca, alteración de riberas y canalización de ríos.

Trochilidae

Amazilia tzacatl
Colibrí colirrufa

Descripción y ecología:

Colibrí mediano, verde metálico con pico rojo y punta negra, cola rojiza distintiva. Habita jardines, bordes de bosque y áreas abiertas con arbustos. Territorial y activo, visita flores de Heliconia y Hibiscus, cumpliendo un rol clave como polinizador. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: pérdida de hábitat por urbanización y deforestación, reducción de plantas nectaríferas, uso de pesticidas que afectan polinizadores.

Catharus ustulatus
Zorzalito de Swainson

Turdidae



Descripción y ecología:

Ave de 16–18 cm, dorso castaño oliváceo y pecho claro con manchas. Migratoria: cría en Norteamérica e inverna en Centro y Suramérica, incluyendo Colombia. Habita bosques húmedos y bordes de selva. Su canto melódico es distintivo. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: pérdida de hábitat en zonas de invernada, contaminación lumínica que afecta migración, depredación por gatos domésticos.

Turdidae

Turdus ignobilis
Mirla común



Descripción y ecología:

Ave mediana de plumaje marrón y canto melodioso, muy adaptable a ambientes urbanos y rurales. Se alimenta de frutos, semillas e insectos, cumpliendo un rol importante como dispersora de semillas. En Colombia es una de las aves más frecuentes en ciudades. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: depredación por gatos domésticos, urbanización y reducción de áreas verdes.

Empidonax virescens
Mosquero verde

Tyrannidae

Descripción y ecología:

Pequeña ave migratorio, verde oliva con vientre claro. Cría en Norteamérica e inverna en Centro y Suramérica, incluyendo Colombia. Se alimenta de insectos capturados al vuelo. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: pérdida de hábitat en zonas de invernada, colisiones con estructuras urbanas, cambio climático que altera rutas migratorias.

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus
Benteveo común



Descripción y ecología:

Ave mediana de plumaje amarillo brillante en el vientre y marrón en el dorso, con corona blanca y antifaz negro. Muy adaptable, habita ciudades, campos y bordes de bosque. Se alimenta de insectos, pequeños vertebrados y frutos. Es territorial y de canto fuerte. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: contaminación urbana, depredación por gatos domésticos, reducción de insectos por agroquímicos.

Pyrocephalus rubinus
Pechírojo o Titiribí

Tyrannidae

Descripción y ecología:

Pequeño tiránido, con machos de plumaje rojo intenso y hembras más pardas. Habita áreas abiertas, bordes de bosque y zonas rurales. Se alimenta de insectos capturados al vuelo, siendo importante en el control de plagas. En Colombia se distribuye ampliamente en tierras bajas. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: pérdida de hábitat abierto, contaminación y reducción de insectos por agroquímicos.

Tyrannidae

Tyrannus dominicensis
Tirano gris

Descripción y ecología:

Ave migratoria de plumaje gris con vientre claro, insectívora y de vuelo ágil. Cría en Norteamérica y llega a Colombia en invierno, habitando áreas abiertas y bordes de bosque. Se alimenta de insectos capturados al vuelo. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: pérdida de hábitat en zonas de invernada, colisiones con estructuras y cambio climático.

Tyrannus melancholicus
Suiriri

Tyrannidae

Descripción y ecología:

Ave mediana de plumaje gris en el dorso y amarillo brillante en el vientre. Muy común en áreas abiertas, bordes de bosque y ciudades, donde se posa en cables y ramas altas. Se alimenta de insectos capturados al vuelo y pequeños frutos. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: contaminación urbana, reducción de insectos por agroquímicos, pérdida de hábitat abierto.

Tyrannidae

Tyrannus savanna
Tirano sabanero o tijereta

Descripción y ecología:

Tiránido de tamaño mediano con cola larga y plumaje grisáceo con vientre claro. Habita sabanas, pastizales y áreas abiertas, cazando insectos en vuelo. Es territorial y suele posarse en lugares elevados para vigilar. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: pérdida de sabanas naturales, uso intensivo de agroquímicos, fragmentación de hábitat.

Hirundo rustica
Golondrina común

Hirundinidae

Descripción y ecología:

Ave migratoria de plumaje azul metálico con garganta rojiza y cola larga ahorquillada. Cría en Norteamérica y Eurasia, inverna en Suramérica, incluyendo Colombia. Se alimenta de insectos voladores, cumpliendo un rol importante en el control biológico. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: pérdida de hábitat de cría en Norteamérica, reducción de insectos por agroquímicos, colisiones con edificaciones y vehículos.

Hirundinidae

Pygochelidon cyanoleuca
Golondrina azul y blanca

Descripción y ecología:

Pequeña ave migratoria de plumaje azul metálico con vientre blanco. Se alimenta de insectos voladores, cumpliendo un rol clave en el control biológico. Habita ciudades, campos y bordes de bosque, formando grupos numerosos en vuelo. En Colombia es común en zonas urbanas y rurales. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: reducción de insectos por pesticidas, colisiones con edificaciones y vehículos.

Euphonia laniirostris
Eufonia gorgiamarilla

Fringillidae

Descripción y ecología:

Ave pequeña de plumaje azul oscuro con garganta amarilla brillante. Habita bosques secundarios, jardines y bordes de selva. Se alimenta de frutos pequeños, cumpliendo un rol como dispersor de semillas. Estado de conservación: Preocupación menor. Amenazas: deforestación de bosques secundarios, captura ilegal para comercio de aves ornamentales, pérdida de recursos frutales.

Cardinalidae

Piranga rubra
Piranga roja



Descripción y ecología:

Ave migratoria de plumaje rojo intenso en machos y más apagado en hembras. Cría en Norteamérica y llega a Colombia en invierno. Se alimenta de insectos y frutos, cumpliendo un rol como dispersora y controladora de plagas. Habita bosques, bordes y áreas abiertas. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: pérdida de hábitat en rutas migratorias, colisiones con estructuras y cambio climático.

Icterus nigrogularis
Bolsero negrogular

Icteridae

Descripción y ecología:

Ave mediana de plumaje amarillo brillante con garganta negra y pico puntiagudo. Habita áreas abiertas, bordes de bosque y zonas rurales, desplazándose en parejas o pequeños grupos. Se alimenta de insectos, frutos y néctar, cumpliendo un rol como dispersor de semillas y controlador de plagas. En Colombia es común en regiones cálidas y urbanas con vegetación. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: pérdida de hábitat, captura ilegal como ave de jaula, reducción de recursos alimenticios por agroquímicos.

Parulidae

Setophaga aestiva
Reinita amarilla



Descripción y ecología:

Ave migratoria de plumaje amarillo brillante con manchas castañas en el pecho. Cría en Norteamérica y llega a Colombia en invierno. Habita bosques húmedos, matorrales y bordes de selva, alimentándose de insectos. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: pérdida de hábitat en zonas de invernada, cambio climático que altera rutas migratorias, colisiones con estructuras.

Setophaga fusca
Reinita gorginaranja

Parulidae

Descripción y ecología:

Pequeña ave migratoria con garganta naranja y dorso oscuro. Cría en Norteamérica y llega a Colombia en invierno. Se alimenta de insectos en bosques húmedos y bordes de selva. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: deforestación en áreas de invernada, fragmentación de hábitat y cambio climático.

Thraupidae

Sicalis flaveola
Canario común

Descripción y ecología:

Ave pequeña de plumaje amarillo intenso, muy común en ciudades y campos abiertos. Se alimenta de semillas y pequeños insectos, formando grupos numerosos. Es una de las aves más visibles en ambientes urbanos de Colombia. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: captura ilegal como ave de jaula, contaminación urbana y reducción de recursos por agroquímicos.

Stilpnia cyanicollis
Tangara azul y negra

Thraupidae





Descripción y ecología:

Ave colorida de plumaje azul brillante con dorso negro. Habita bosques secundarios y bordes de selva, alimentándose de frutos e insectos. Es importante dispersora de semillas en ecosistemas andinos. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: deforestación, pérdida de bosques secundarios y fragmentación de hábitat.

Thraupidae

Stilpnia vitriolina
Tangara rastrojera

Descripción y ecología:

Tangara mediana de plumaje verde con pecho naranja brillante y dorso oliváceo. Habita bosques andinos, jardines y bordes de selva, alimentándose de frutos e insectos. Es una dispersora clave de semillas en ecosistemas montanos de Colombia. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: fragmentación de hábitat, deforestación y pérdida de conectividad ecológica.

Thraupis episcopus
Azulejo común

Thraupidae

Descripción y ecología:

Ave mediana de plumaje azul celeste, muy común en ciudades, jardines y áreas rurales. Se alimenta de frutos y semillas, formando grupos familiares. Es una de las aves más visibles en ambientes urbanos de Colombia. Estado de conservación: Preocupación Menor. Amenazas: contaminación urbana, pérdida de hábitat y reducción de recursos frutales.

ÁRBOLES Y ARBUSTOS

Este indicador busca caracterizar la riqueza vegetal presente en la Comuna 22 de Cali. Esta riqueza refleja la complejidad ecológica del territorio y su papel como zona de transición entre el piedemonte de los Farallones y el área urbana de la ciudad. El seguimiento de este indicador permite evaluar la estructura de la vegetación, la provisión de servicios ecosistémicos como sombra, calidad del aire, calidad del clima, captura de carbono y hábitat para fauna, así como la capacidad de regeneración natural en espacios verdes urbanos y periurbanos.

Para registrar la riqueza asociada a este indicador se instalan parcelas de 50 × 20 metros, donde se registran todos los individuos arbóreos (arboles con más de 32 cm de cintura, denominados fustales). Estas parcelas se subdividen en subparcelas de 5 × 5 metros para individuos en crecimiento intermedio (denominados latizales) y subparcelas de 2 × 2 para plántulas y regeneración natural (denominado brinzales). Este diseño permite hacer seguimiento a la composición y estructura de la vegetación en diferentes estadios de desarrollo, generando información periódica y confiable para orientar acciones de restauración, arborización y planificación ambiental en la comuna.

Para cada árbol presente en las parcelas de seguimiento se registran variables como especie, diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total y estado fitosanitario. El DAP se mide a 1,30 metros sobre el suelo con cinta diamétrica; la altura se estima con clinómetros o mediante métodos visuales; y el estado fitosanitario se describe observando plagas, enfermedades o daños mecánicos. Estos datos permiten además de establecer la riqueza, evaluar la estructura poblacional y la dinámica de crecimiento de la vegetación, diferenciando entre individuos jóvenes, adultos y senescentes.

Para facilitar la identificación de árboles y generar registros asociados a este indicador se desarrolló una serie de fichas. Las fichas de árboles y arbustos fueron elaboradas a partir de especies frecuentes en la Comuna 22, seleccionando aquellas que son abundantes, comunes y de gran relevancia ecológica. Se destacan especies que aportan sombra, alimento, captura de carbono y soporte para la fauna asociada, además de ornamentales y productivas que enriquecen el paisaje urbano. La inclusión de estas especies resaltar su papel en la estructura ecológica principal, promoviendo acciones de conservación, restauración y arborización participativa.

Lecythidaceae

Couroupita guianensis
Árbol Bala



Descripción y ecología:

Árbol ornamental de gran valor cultural, con flores vistosas y frutos esféricos que cuelgan en racimos. Sus flores atraen polinizadores como abejas y mariposas, mientras sus frutos son consumidos por fauna silvestre, aportando a la conectividad trófica. Cumple funciones de ornamental, captación de carbono y restauración paisajística, siendo frecuente en jardines botánicos y parques. Su presencia en espacios urbanos integra belleza, biodiversidad y educación ambiental, convirtiéndolo en una especie emblemática para la sensibilización ecológica. Además, contribuye a la resiliencia de ecosistemas urbanos al ofrecer hábitat y alimento en entornos intervenidos.

Roystonea regia
Palma real

Arecaceae

Descripción y ecología:

Palma monumental de tronco liso y copa majestuosa, símbolo de avenidas y parques tropicales. Cumple funciones de captación de carbono, ornamental y provisión de hábitat para aves y murciélagos. Su porte vertical aporta estructura al paisaje urbano y rural, mientras sus frutos son consumidos por fauna silvestre. Es considerada una de las especies de plantas ornamentales más abundante en la comuna 22 de Cali, reflejando su importancia en arborización. Además de su valor estético, contribuye a la regulación microclimática y a la resiliencia de corredores verdes, integrando belleza cultural con servicios ecosistémicos.

Arecaceae

Adonidia merrillii
Palma de Navidad

Descripción y ecología:

Palma ornamental de porte mediano, con estípite delgado y copa compacta, muy usada en alineaciones urbanas y parques por su estética y fácil manejo. Cumple funciones de captación de carbono y ornamental, aportando estructura vertical y sombra ligera en corredores verdes. Su abundancia en la región la convierte en una especie clave para la resiliencia urbana, generando microhábitats para aves e insectos. Aunque no tiene un uso maderable significativo, su valor paisajístico y cultural es alto, siendo reconocida como una de las especies más comunes en la comuna 22 de Cali.

Dypsis lutescens
Palma areca

Arecaceae

Descripción y ecología:

Palma de múltiples tallos, de hojas arqueadas, muy usada en setos y jardinería urbana. Cumple función ornamental, captación de carbono y provisión de microhábitats para aves e insectos. Es considerada la tercera especie más abundante en la comuna 22 de Cali, reflejando su relevancia en corredores verdes y espacios residenciales. Su porte elegante y resistencia la convierten en una especie clave para la resiliencia urbana, aportando sombra ligera y estructura vertical. Aunque no tiene un uso maderable, su valor paisajístico y ecológico es significativo.

Fabaceae

Albizia saman
Samán



Descripción y ecología:

Árbol de gran porte y copa amplia, en la comuna 22 se considera una de las especies más importantes en la captación de carbono y producción de oxígeno por su abundancia. Su follaje denso genera sombra y regula microclimas, siendo clave en sistemas silvopastoriles y paisajes urbanos. Además, mejora la fertilidad del suelo gracias a la fijación de nitrógeno y ofrece hábitat para aves y polinizadores. Se emplea como árbol ornamental en parques y avenidas, y su madera es utilizada en carpintería ligera. Su importancia ecológica radica en la provisión de servicios ambientales y en su capacidad de sostener biodiversidad en áreas intervenidas.

Guazuma ulmifolia
Guácimo

Fabaceae

Descripción y ecología:

Árbol mediano de copa amplia y follaje denso, muy valorado en sistemas silvopastoriles y procesos de restauración ecológica. Sus frutos son consumidos por aves, mamíferos y ganado, convirtiéndolo en un recurso alimenticio clave. Cumple funciones como captación de carbono, sombra, cerca viva, rompevientos y rompefuegos, además de mejorar la fertilidad del suelo. Se emplea en la recuperación de áreas degradadas y en la protección de microclimas rurales. Su presencia favorece la conectividad ecológica. Es considerada la segunda especie con mayor captación de carbono en la comuna 22 de Cali.

Fabaceae

Erythrina poeppigiana
Pizamo



Descripción y ecología:

Árbol de rápido crecimiento y floración roja llamativa, utilizado ampliamente en cercas vivas y sistemas agroforestales. Su capacidad de fijar nitrógeno lo convierte en una especie esencial para la restauración de suelos y la protección de fuentes hídricas. Provee alimento a aves, insectos polinizadores y ganado, integrando funciones productivas y ecológicas. Se emplea como tutor en cultivos de café y cacao, aportando sombra y estructura. Además de su valor ornamental, contribuye a la captación de carbono y a la resiliencia de paisajes rurales y urbanos. Es una especie clave en la integración de biodiversidad y producción sostenible.

Schizolobium parahyba
Tambor

Fabaceae

Descripción y ecología:

Árbol pionero de crecimiento muy rápido, con tronco recto y copa ligera, ideal para la restauración ecológica de suelos degradados. Su porte ornamental lo hace atractivo en parques y avenidas. Cumple funciones de captación de carbono, generación de hábitat para aves y regulación de microclimas. Es una especie que favorece la sucesión ecológica, permitiendo el establecimiento de otras plantas bajo su sombra. Su importancia radica en su capacidad de transformar paisajes degradados en sistemas resilientes, integrando usos productivos y ecológicos en comunidades rurales y urbanas.

Fabaceae

Cenostigma pluviosum
Acacia amarilla

Descripción y ecología:

Árbol de floración amarilla abundante, muy apreciado en arborización urbana por su resistencia y aporte paisajístico. Cumple funciones de captación de carbono, ornamental y restauración ecológica, favoreciendo la conectividad de polinizadores y aves. Su copa amplia regula microclimas y aporta sombra en espacios públicos. Es considerada la especie más abundante en la comuna 22, reflejando su importancia en la estructura verde urbana. Su valor ecológico y cultural lo convierten en un referente de biodiversidad en ciudades tropicales.

Enterolobium cyclocarpum
Orejero

Fabaceae

Descripción y ecología:

Árbol de gran porte y copa amplia, característico de bosques secos tropicales. Cumple funciones de captación de carbono, restauración de suelos degradados, protección hídrica y provisión de sombra en sistemas silvopastoriles. Es una especie melífera, favoreciendo la polinización y la conectividad trófica. Sus frutos en forma de “oreja” son consumidos por fauna silvestre, aportando valor alimenticio. Además de su uso ornamental en parques y avenidas, su madera ligera se emplea en construcciones menores. Es considerada una especie clave para la resiliencia de ecosistemas tropicales.

Fabaceae

Hymenaea courbaril
Algarrobo



Descripción y ecología:

Árbol robusto de madera dura y duradera, con frutos resiníferos y pulpa comestible. Cumple funciones de captación de carbono, ornamental y restauración ecológica, siendo muy valorado en arborización urbana y rural. Sus frutos son consumidos por fauna silvestre, fortaleciendo la conectividad trófica. Además, su copa amplia regula microclimas y aporta sombra en sistemas productivos. Su madera es apreciada en construcción y carpintería, integrando usos productivos con conservación ambiental. Es una especie clave en la resiliencia de paisajes tropicales.

Pithecellobium dulce
Chiminango

Fabaceae

Descripción y ecología:

Árbol resistente de copa amplia y follaje denso, muy usado en sistemas silvopastoriles y arborización rural. Cumple funciones de captación de carbono, sombra, restauración ecológica y provisión de alimento para fauna silvestre. Sus arilos dulces son consumidos por aves, sobre todo especies como las loras de cabeza azul, fortaleciendo la conectividad trófica. Es considerada la tercera especie con mayor captación de carbono en la comuna 22, reflejando su importancia en la resiliencia de paisajes productivos.

Fabaceae

Senna siamea
Acacia amarilla

Descripción y ecología:

Árbol de floración amarilla, usado comúnmente en procesos de restauración ecológica como especie pionera intermedia. Cumple funciones de captación de carbono, provisión de hábitat y alimento para fauna silvestre, y regulación de microclimas en espacios rurales y urbanos. Sus flores atraen polinizadores y su copa amplia aporta sombra en sistemas productivos. Se emplea como especie ornamental en parques y avenidas, integrando belleza paisajística con servicios ecosistémicos. Su importancia radica en su capacidad de transformar áreas degradadas en paisajes resilientes, conectando biodiversidad y comunidades humanas.

Melicoccus bijugatus
Mamoncillo

Sapindaceae

Descripción y ecología:

Árbol frutal de copa densa, con frutos drupáceos muy consumidos por humanos y fauna silvestre. Cumple funciones de captación de carbono, alimenticia y restauración ecológica, favoreciendo la dispersión de semillas y la conectividad trófica. Sus frutos son un recurso cultural y económico en comunidades rurales y urbanas. Aunque no se emplea como especie maderable, su valor alimenticio y ornamental lo convierten en un referente de biodiversidad tropical. Es clave en la integración de producción sostenible y conservación.

Anacardiaceae

Anacardium excelsum
Caracolí



Descripción y ecología:

Árbol majestuoso de bosques ribereños, con raíces profundas que estabilizan suelos y protegen fuentes de agua. Cumple funciones como barrera rompevientos, retención de contaminantes y recuperación de áreas degradadas, siendo esencial en sistemas silvopastoriles. Su copa amplia brinda sombra y regula la humedad, mientras sus frutos alimentan a fauna silvestre. Debido a su porte es común que aves grandes como la Guacamaya cariseca aniden en él. Se utiliza como especie ornamental en avenidas y plazas, y su madera es apreciada en construcción. Su rol ecológico es clave en la resiliencia de paisajes tropicales, pues combina protección hídrica, captura de carbono y soporte trófico, integrando usos productivos y culturales en comunidades rurales y urbanas.

Zanthoxylum rhoifolium
Tachuelo

Rutaceae

Descripción y ecología:

Árbol aromático con espinas, de copa amplia y follaje verde intenso. Sus frutos son consumidos por aves y pequeños mamíferos, aportando a la conectividad trófica. Cumple funciones de restauración ecológica, captación de carbono y ornamental, siendo usado en parques y avenidas por su resistencia y valor paisajístico. Su follaje y corteza poseen usos tradicionales, mientras su presencia favorece la regeneración de suelos y la provisión de hábitat para polinizadores. Es una especie clave en la resiliencia de ecosistemas intervenidos, integrando valor cultural y ecológico en comunidades rurales y urbanas.

Simaroubaceae

Simarouba amara
Amargo

Descripción y ecología:

Árbol mediano de madera clara y ligera, muy apreciada en carpintería, molduras y fósforos. Cumple funciones de captación de carbono, restauración ecológica y provisión de hábitat para aves y mamíferos. Sus frutos son consumidos por fauna silvestre, fortaleciendo la conectividad trófica en bosques secundarios. Se adapta a suelos pobres, lo que lo convierte en una especie útil en procesos de recuperación de áreas degradadas. Aporta sombra y estructura en paisajes rurales y urbanos.

Ceiba pentandra
Ceiba

Malvaceae

Descripción y ecología:

Árbol emergente de gran tamaño, símbolo de los bosques tropicales, con tronco voluminoso y raíces tabulares que protegen caños y arroyos. Contribuye a la captación de carbono y a la protección hídrica, regulando flujos de agua en ecosistemas ribereños. Sus semillas con fibras de kapok son aprovechadas por fauna silvestre, mientras su copa provee hábitat para aves y polinizadores. Se emplea en sistemas silvopastoriles y como especie ornamental por su imponencia. Su importancia ecológica radica en la restauración de suelos y en la provisión de servicios ecosistémicos, siendo un referente cultural y ambiental en comunidades tropicales.

Bignoniaceae

Jacaranda caucana
Gualanday

Descripción y ecología:

Árbol de floración violeta abundante, muy apreciado en parques y avenidas por su valor ornamental. Sus flores atraen polinizadores y sirven de alimento para aves como la Guacamaya cariseca, fortaleciendo la conectividad ecológica en entornos urbanos. Cumple funciones de captación de carbono y restauración paisajística, aportando belleza y resiliencia a espacios verdes. Es una especie emblemática en Colombia, donde se integra en programas de arborización y educación ambiental, conectando la biodiversidad con la vida cotidiana de las comunidades.

Tabebuia rosea
Guayacán rosado

Bignoniaceae

Descripción y ecología:

Árbol de floración rosada espectacular, muy usado en urbanismo y restauración ecológica. Su copa amplia provee sombra y regula microclimas, mientras sus flores atraen polinizadores y aves. Cumple funciones de captación de carbono, cerca viva y rompevientos. Sus frutos y semillas son consumidos por fauna silvestre, fortaleciendo la conectividad trófica. Se emplea como especie ornamental en calles y plazas, y en la recuperación de suelos degradados. Su importancia radica en combinar belleza paisajística con servicios ecosistémicos, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y sostenibilidad en comunidades urbanas y rurales.

Localidades importantes para el monitoreo de la biodiversidad en la comuna 22

La Comuna 22 de Cali cuenta con una diversidad de espacios naturales y urbanos que funcionan como puntos estratégicos para el monitoreo de la biodiversidad. Estos lugares, que incluyen humedales, corredores verdes, parques, campus universitarios y conjuntos residenciales con amplia cobertura vegetal, representan escenarios clave para observar aves, registrar especies arbóreas y evaluar la conectividad ecológica del territorio. La identificación de estas localidades permite orientar la participación comunitaria y fortalecer la ciencia ciudadana, asegurando que la conservación y el seguimiento ambiental se integren en la vida cotidiana de la comuna.

Localidades importantes para el monitoreo de la biodiversidad de la comuna 22





Club Campestre de Cali – Ubicado en el sector de Pance, combina áreas verdes y cuerpos de agua que funcionan como hábitat para aves y especies arbóreas.

Río Lili – Ciudad Jardín – Corredor hídrico que atraviesa la zona urbana, clave para la conectividad ecológica y la presencia de aves acuáticas.

Parque de La Babilla y Zanjón del Burro: Espacio recreativo con humedal urbano, refugio de aves migratorias y especies acuáticas.

Humedal Cañasgordas: Ubicado en el suroccidente, ecosistema estratégico para aves acuáticas y regulación hídrica.

Hacienda Cañasgordas: Área histórica con relictos de bosque y corredores verdes que sostienen biodiversidad local.

Campus Universidad Javeriana Cali: Espacio académico con zonas verdes y humedales que sirven como laboratorio natural.

Humedal El Retiro: Humedal periurbano que alberga aves residentes y migratorias, clave para monitoreo comunitario.

Campus Universidad de San Buenaventura: Ubicado en Pance, con corredores verdes y arbolado urbano de interés ecológico.

Colegio Bolívar: Institución educativa con amplias zonas verdes y arbolado que favorecen la presencia de aves urbanas.

Universidad Icesi: Campus con humedales y jardines que funcionan como refugio para aves y plantas ornamentales.

Colegio Colombo Británico: Espacio escolar con corredores verdes y arbolado urbano, útil para monitoreo participativo.

Ecoparque Lago de las Garzas: Área protegida con humedal y bosque urbano, reconocido por su avifauna diversa.





Verdanza Condominio Campestre: Conjunto residencial con áreas verdes y corredores ecológicos que sostienen flora y fauna.

Colegio Alemán de Cali: Institución con zonas arboladas y espacios verdes que favorecen la biodiversidad urbana.

Conjunto Residencial Batallegue: Urbanización con relictos de vegetación y corredores verdes que conectan con humedales.

Bosque Urbano Umbría: Área verde con relictos de bosque y arbolado nativo, importante para la conservación comunitaria.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
80 años
Construyendo Futuro
Universidad del Valle
AC22
OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA COMUNA 22
COMITÉ AMBIENTAL COMUNA 22
Grupo de Investigación en Ecología Animal
Universidad del Valle