

Übungsblatt 7 zur Kommutativen Algebra

Aufgabe 1. (4) *Ein konkretes Beispiel zur Noether-Normalisierung*

Sei K ein Körper. Gib eine Zahl $r \geq 0$ und einen endlichen, injektiven K -Algebren-Homomorphismus $K[Y_1, \dots, Y_r] \rightarrow K[A, B]/(AB - 1)$ an.

Aufgabe 2. (2) *Oberringe von Bewertungsringen*

Sei A ein Bewertungsring mit Quotientenkörper K . Sei $A \subseteq B \subseteq K$ eine Zwischenerweiterung. Finde ein Primideal \mathfrak{p} von A mit $B \cong A_{\mathfrak{p}}$.

Aufgabe 3. (m) *Noether-Normalisierung für Integritätsbereiche*

Sei $A \subseteq B$ eine Erweiterung von Integritätsbereichen. Sei B als A -Algebra endlich erzeugt. Zeige, dass ein Element $s \in A \setminus \{0\}$ und eine A -Algebra $B' \subseteq B$ mit $B' \cong A[Y_1, \dots, Y_n]$ existieren, sodass $B[s^{-1}]$ ganz über $B'[s^{-1}]$ ist.

Aufgabe 4. (2+m) *Geschenkte Bijektivität*

Sei $\varphi : M \rightarrow M$ ein Endomorphismus eines Moduls M . Zeige:

- a) Ist φ surjektiv und M noethersch, so ist φ bijektiv.
- b) Ist φ injektiv und M artinsch, so ist φ bijektiv.

Aufgabe 5. (m+2+2) *Endlichkeit minimaler Primideale*

- a) Sei A ein Ring, in dem das Nilradikal Schnitt endlich vieler Primideale ist. Zeige, dass A nur endlich viele minimale Primideale besitzt.
- b) Zeige, dass das Nilradikal eines artischen Rings Schnitt endlich vieler Primideale ist.
- c) Zeige die Behauptung aus b) auch für noethersche Ringe.

Tipp. Führe die Betrachtung eines Wurzelideals, das maximal mit der Eigenschaft ist, nicht endlicher Schnitt von Primidealen zu sein (wieso existiert ein solches?) zu einem Widerspruch.