

Übungsblatt 2 zur Algebra I

Abgabe bis 29. April 2013, 17:00 Uhr

Aufgabe 1. *Lösungen polynomieller Gleichungen sind algebraisch*

Sei z eine Lösung der Polynomgleichung

$$X^3 - \sqrt{2 - \sqrt[3]{4}} X^2 + 3 = 0.$$

Finde eine normierte Polynomgleichung mit *rationalen* Koeffizienten, die z als Lösung hat.

Lösung. Wir formen um:

$$\begin{aligned} z^3 - \sqrt{2 - \sqrt[3]{4}} z^2 + 3 &= 0 \\ \iff z^3 + 3 &= \sqrt{2 - \sqrt[3]{4}} z^2 \\ \implies (z^3 + 3)^2 &= 2 z^4 - \sqrt[3]{4} z^4 \\ \iff (z^3 + 3)^2 - 2 z^4 &= \sqrt[3]{4} z^4 \\ \implies ((z^3 + 3)^2 - 2 z^4)^3 &= 4 z^{12} \\ \iff ((z^3 + 3)^2 - 2 z^4)^3 - 4 z^{12} &= 0 \end{aligned}$$

Die gesuchte Gleichung lautet also

$$((X^3 + 3)^2 - 2 X^4)^3 - 4 X^{12} = 0,$$

denn diese hat z als Lösung (Probe unnötig, wieso?), ihre Koeffizienten sind alle rational und sie ist normiert (das ist nicht ganz offensichtlich, wieso stimmt das?).

Aufgabe 2. *Auf den Spuren Bombellis*

Zeige formal die zuerst von Rafael Bombelli (1526–1572, italienischer Mathematiker) gefundene Gleichheit

$$(2 \pm \sqrt{-1})^3 = 2 \pm \sqrt{-121}$$

und diskutiere, welche Vorzeichen der Quadratwurzeln jeweils zu wählen sind.

Lösung. Mit der binomischen Formel multiplizieren wir die linke Seite aus:

$$(2 \pm i)^3 = 8 \pm 3 \cdot 4i - 3 \cdot 2 \pm i^3 = 2 \pm 11i.$$

Bombellis Formel stimmt also, wenn man $\sqrt{-1}$ konsistent als i (statt als $-i$) und $\sqrt{-121}$ konsistent als $11i$ (statt als $-11i$) liest und dann entweder auf beiden Seiten „+“ oder auf beiden Seiten „−“ für das „ \pm “-Zeichen nimmt.

Aufgabe 3. Rechnen mit komplexen Zahlen

- a) Sei $z \neq 0$ eine komplexe Zahl, deren Real- und Imaginärteil rationale Zahlen sind. Zeige, dass z^{-1} ebenfalls rationalen Real- und Imaginärteil hat.
- b) Zeige, dass der Realteil einer komplexen Zahl z durch $\frac{1}{2}(z + \bar{z})$ und dass der Imaginärteil durch $\frac{1}{2i}(z - \bar{z})$ gegeben ist.
- c) Sei z eine invertierbare komplexe Zahl. Folgere die Gleichheit $\bar{z}^{-1} = \overline{z^{-1}}$ aus der Multiplikativität der komplexen Konjugation.
- d) Interpretiere die Multiplikation mit der imaginären Einheit i geometrisch.

Lösung.

- a) Wir schreiben $z = a + bi$ mit $a, b \in \mathbb{Q}$. Dann gilt

$$z^{-1} = \frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} + \frac{-b}{a^2 + b^2}i$$

und wir sehen, dass in der Tat Real- und Imaginärteil wieder in \mathbb{Q} liegen.

- b) Wir schreiben $z = a + bi$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ und rechnen:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(z + \bar{z}) &= \frac{1}{2}(a + bi + a - bi) = a \\ \frac{1}{2i}(z - \bar{z}) &= \frac{1}{2i}(a + bi - a + bi) = b\end{aligned}$$

- c) Aus $z \cdot z^{-1} = 1$ folgt wegen der Multiplikativität der komplexen Konjugation $\bar{z} \cdot \overline{z^{-1}} = 1$. Also ist $\overline{z^{-1}}$ das Inverse von \bar{z} , das war zu zeigen.
- d) Drehung um 90° um den Ursprung im Gegenuhrzeigersinn (wieso?). Skizze!

Aufgabe 4. Zahlen nahe bei Null

Zeige, dass für zwei reelle Zahlen a und b genau dann die Wurzel $\sqrt{a^2 + b^2}$ nahe bei Null ist, wenn sowohl $|a|$ als auch $|b|$ nahe bei Null sind. Zeige also:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0: \sqrt{a^2 + b^2} < \delta \implies |a|, |b| < \epsilon$$

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0: |a|, |b| < \delta \implies \sqrt{a^2 + b^2} < \epsilon$$

Lösung.

- a) Sei $\epsilon > 0$ beliebig. Setze $\delta := \epsilon$. Gelte $\sqrt{a^2 + b^2} < \delta$. Dann folgt

$$|a| = \sqrt{|a|^2} \leq \sqrt{|a|^2 + |b|^2} < \delta = \epsilon$$

und analog mit $|b|$.

- b) Sei $\epsilon > 0$ beliebig. Setze $\delta := \epsilon/\sqrt{2}$. Gelte $|a|, |b| < \delta$. Dann folgt

$$\sqrt{a^2 + b^2} < \sqrt{\delta^2 + \delta^2} = \sqrt{2}\delta = \epsilon.$$

Bemerkung: Auf die passenden Wahlen von δ kommt man natürlich nicht im Vornhinein, sondern erst nach erfolgter Abschätzung.

Aufgabe 5. Ein neuer Zahlbereich

- a) Zeige, dass die Gleichung $X^2 + X + 1 = 0$ in den reellen Zahlen keine Lösung besitzt.
- b) Konstruiere einen minimalen Zahlbereich $\mathbb{R}(\omega)$, welcher die reellen Zahlen und eine Lösung ω der Gleichung $X^2 + X + 1 = 0$ enthält und in welchem Addition und Multiplikation so definiert sind, dass sie die Addition und Multiplikation reeller Zahlen fortsetzen und die einschlägigen Gesetze der Arithmetik erfüllen.
- c) Zeige, dass $\omega^3 = 1$ in $\mathbb{R}(\omega)$ gilt.
- d) Finde eine Lösung der Gleichung $X^2 + 1 = 0$ in $\mathbb{R}(\omega)$.

Lösung.

- a) *Variante 1:* Man verwendet die Mitternachtsformel und sieht, dass die beiden Lösungen der Gleichung jeweils echt komplex sind:

$$\frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2}$$

Variante 2: Man zeigt durch quadratische Ergänzung, dass für jedes reelle x die linke Seite der Gleichung positiv (und daher nicht null) ist:

$$x^2 + x + 1 = (x + 1/2)^2 - 1/4 + 1 \geq 3/4 > 0.$$

- b) ...
- c) Per Definition gilt $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, also $\omega^2 = -\omega - 1$. Damit kann man ω^3 explizit ausrechnen:

$$\omega^3 = \omega \cdot \omega^2 = -\omega^2 - \omega = -(-\omega - 1) - \omega = 1.$$

Bemerkung: Alternativ kann man auch den Faktor $(\omega - 1)$ vom Himmel fallen lassen:

$$0 = (\omega^2 + \omega + 1)(\omega - 1) = \omega^3 - 1.$$

- d) *Variante 1:* Wir untersuchen für alle $a, b \in \mathbb{R}$, ob $x := a + b\omega$ eine Lösung der Gleichung ist:

$$\begin{aligned} (a + b\omega)^2 + 1 &= 0 \\ \iff (a^2 - b^2 + 1) + (-b^2 + 2ab)\omega &= 0 \\ \iff a^2 - b^2 + 1 = 0 \text{ und } b(2a - b) &= 0 \\ \stackrel{?}{\iff} a^2 - b^2 + 1 = 0 \text{ und } 2a = b & \\ \iff 1 = 3a^2 \text{ und } 2a = b & \\ \iff a = \pm 1/\sqrt{3} \text{ und } b = \pm 2/\sqrt{3} & \end{aligned}$$

Da wir insbesondere die Richtung „ \Leftarrow “ haben, folgt also: Die Gleichung $X^2 + 1 = 0$ hat in $\mathbb{R}(\omega)$ zwei Lösungen, nämlich

$$\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}}\omega \quad \text{und} \quad -\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{3}}\omega.$$

Variante 2: Wir verwenden die quadratische Ergänzung von oben:

$$0 = \omega^2 + \omega + 1 = (\omega + 1/2)^2 + 3/4,$$

also folgt

$$\frac{4}{3} \left(\omega + \frac{1}{2} \right)^2 = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\omega + \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 = -1$$

und man kann ebenfalls die beiden Lösungen ablesen.