

Übungsblatt 8 zur Algebra I

Abgabe bis 10. Juni 2013, 17:00 Uhr

Aufgabe 1. Irreduzibilitätstest

Bestimme numerisch die Nullstellen von $f(X) = X^4 - 12X^2 + 1$ bis auf wenige Stellen nach dem Komma, und nutze diese Information um zu zeigen, dass $f(X)$ über den rationalen Zahlen irreduzibel ist.

Lösung. Die Nullstellen von $f(X)$ sind näherungsweise

$$x_1 \approx -3,452, \quad x_2 \approx -0,290, \quad x_3 \approx 0,290, \quad x_4 \approx 3,452.$$

Da $f(X)$ normiert und ganzzahlige Koeffizienten hat, können wir nun alle Auswahlen der Nullstellen durchgehen und jeweils prüfen, ob die elementarsymmetrischen Funktionen in diesen Nullstellen ganze Zahlen ergeben.

Linearfaktoren: Keine der Nullstellen ist ganzzahlig, also kann kein Linearfaktor abspalten.

Quadratische Faktoren: Für jede zweielementige Auswahl der Nullstellen sind stets nicht beide elementarsymmetrischen Funktionen in den Nullstellen ganzzahlig:

$e_1(x_1, x_2) \approx -3,7$	$e_2(x_1, x_2) \approx 1,0$
$e_1(x_1, x_3) \approx -3,2$	$e_2(x_1, x_3) \approx -1,0$
$e_1(x_1, x_4) \approx 0,0$	$e_2(x_1, x_4) \approx -11,9$
$e_1(x_2, x_3) \approx 0,0$	$e_2(x_2, x_3) \approx -0,1$
$e_1(x_2, x_4) \approx 3,2$	$e_2(x_2, x_4) \approx -1,0$
$e_1(x_3, x_4) \approx 3,7$	$e_2(x_3, x_4) \approx 1,0$

Kubische Faktoren: Kann es nicht geben, da die komplementären Faktoren Linearfaktoren wären.

Aufgabe 2. Inhalt von Polynomen

Sei $f(X)$ ein normiertes Polynom mit rationalen Koeffizienten.

- Zeige, dass der Inhalt von f genau dann ganzzahlig ist, wenn alle Koeffizienten von f ganzzahlig sind.
- Zeige, dass der Inhalt von f das Inverse des Leitkoeffizienten von \tilde{f} ist.
- Zeige, dass der Inhalt von f das Inverse einer ganzen Zahl ist. ...nicht getreu...

Aufgabe 3. Kongruenzrechnungen

- Sei n eine ganze Zahl und seien a, a', b, b' ganze Zahlen mit $a \equiv a'$ und $b \equiv b'$ modulo n . Rechne explizit nach, dass dann auch $a + b \equiv a' + b'$ modulo n .
- Sei a eine ganze Zahl mit $a \equiv 1$ modulo 5. Für welche Exponenten k ist $a^k \equiv 2$ modulo 5?

- c) Finde zwei Inverse von 8 modulo 35.

Lösung.

- a) Gelte $a \equiv a'$ und $b \equiv b'$ modulo n , d. h. $a - a'$ und $b - b'$ sind jeweils durch n teilbar. Dann ist auch

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$$

durch n teilbar, d. h. es gilt $a + b \equiv a' + b'$.

- b) Für keinen einzigen Exponenten ist das erfüllt. Denn wenn $a \equiv 1$ modulo 5, so sind auch a^2, a^3 usw. jeweils kongruent zu 1 modulo 5. Aber 2 ist nicht kongruent zu 1 modulo 5.
- c) Ein Inverses ist 22, denn $8 \cdot 22 = 176 = 5 \cdot 35 + 1 \equiv 1$ modulo 35. Ein anderes ist -13 .

Aufgabe 4. *Reduktion modulo einer Primzahl*

Sei $f(X)$ ein normiertes Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten. Beweise oder widerlege: Ist $f(X)$ modulo einer Primzahl reduzibel, so ist $f(X)$ auch über den rationalen Zahlen reduzibel.

Lösung. Das stimmt nicht. Etwa ist das Polynom $f(X) = X^2 + 1$ über der Primzahl 2 reduzibel, denn es gilt $f(X) = X^2 + 1 \equiv (X + 1)^2 \pmod{2}$ – aber bekanntermaßen ist $f(X)$ nicht über den rationalen Zahlen reduzibel.

Bemerkung: Die Umkehrung stimmt aber schon, siehe Proposition 3.23 im Skript.

Aufgabe 5. *Irreduzibilitätstest nach Leopold Kronecker*

- a) Seien b_0, \dots, b_m von Null verschiedene ganze Zahlen. Zeige, dass es nur endlich viele Polynome $g(X)$ vom Grad $\leq m$ mit ganzzahligen Koeffizienten gibt, sodass für alle $i = 0, \dots, m$ die ganze Zahl $g(i)$ ein Teiler von b_i ist.
- b) Sei $f(X)$ ein primitives Polynom vom Grad n mit ganzzahligen Koeffizienten und $f(i) \neq 0$ für alle $0 \leq i \leq \frac{n}{2}$. Zeige, dass es nur endlich viele Polynome $g(X), h(X)$ mit ganzzahligen Koeffizienten und $f = g \cdot h$ gibt.
- c) Verwende Teilaufgabe b), um ein Verfahren anzugeben, das von einem primitiven Polynom $f(X)$ mit ganzzahligen Koeffizienten feststellt, ob es über den rationalen Zahlen reduzibel oder irreduzibel ist.

Lösung.

- a) Jede der Zahlen b_i besitzt nur endlich viele Teiler, da sie nicht null sind. Daher gibt es nur endlich viele Tupel (g_0, \dots, g_m) mit $g_i \mid b_i$ für alle $i = 0, \dots, m$. Wegen des Satzes über die Eindeutigkeit der Polynominterpolation gibt es für jedes dieser Tupel nur genau ein Polynom $g(X)$ mit $g(i) = g_i$ für alle $i = 0, \dots, m$.
- b) Gelte $f(X) = g(X) \cdot h(X)$. Nach Aufgabe 4e) von Blatt 4 sind dann für jedes i mit $0 \leq i \leq \frac{n}{2}$ die Zahlen $g(i)$ und $h(i)$ jeweils Teiler von $b_i := f(i)$. Mindestens einer der beiden Faktoren hat Grad $\leq \frac{n}{2}$; daher folgt mit Teilaufgabe a), dass es nur endlich viele Möglichkeiten für ihn gibt. Der andere Faktor ist aus dem ersten sowieso eindeutig bestimmt. Das zeigt zusammengenommen die Behauptung.

- c) Von einem gegebenen primitiven Polynom $f(X)$ vom Grad n mit ganzzahligen Koeffizienten können wir zunächst prüfen, ob eine der Zahlen $f(i)$ für $0 \leq i \leq \frac{n}{2}$ null ist. Wenn ja, ist $f(X)$ sicherlich reduzibel. Wenn nein, können wir die endlich vielen Teiler der Zahlen $f(i)$ bestimmen, durch Polynominterpolation jeweils ein Polynom $g(X)$ konstruieren und prüfen, ob die Polynomdivision von $f(X)$ durch $g(X)$ glatt in einem ganzzahligen Polynom aufgeht. Wenn ja, ist $f(X)$ reduzibel, da wir einen abspaltenden Faktor gefunden haben. Wenn die Division so nie aufgeht, ist $f(X)$ über den ganzen Zahlen und wegen seiner Primitivität auch über den rationalen Zahlen irreduzibel.