

Geometrische Vorstellung von Ringen

Sei A ein Ring (wie immer: kommutativ und mit Eins). Dann gibt es einen topologischen Raum, $\text{Spec } A$, mittels dem man sich den Ring anschaulich vorstellen kann. Auf diese Weise haben viele Konzepte und Resultate aus der Algebra eine geometrische Entsprechung; und umgekehrt.

Die folgende Definition stellt das zentrale Bindeglied dar.



Die Topologie auf $\text{Spec } A$ definiert man wie folgt: Eine Teilmenge von $\text{Spec } A$ heißt genau dann *abgeschlossen*, wenn sie von der Form $V(\mathfrak{a}) := \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}\}$ ist, wobei \mathfrak{a} ein beliebiges Ideal in A ist. Eine Teilmenge heißt genau dann *offen*, wenn ihr Komplement abgeschlossen ist.

Spiel & Spaß 1. Weise nach, dass diese Festlegungen wirklich eine Topologie auf $\text{Spec } A$ definieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Korrespondenz ist folgender.




Ist f nämlich ein Element von A und $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ ein Punkt, so können wir definieren: Der *Funktionswert* von f an der Stelle \mathfrak{p} ist das Bild von f in $k(\mathfrak{p})$. Dabei ist $k(\mathfrak{p})$ der *Restklassenkörper* an der Stelle \mathfrak{p} , das ist der Körper $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$.

Sei zum Beispiel $A = \mathbb{R}[X]$ und $f = X^2 - 2X + 3$. Sei $\mathfrak{p} = (X - 4)$. Dann ist $k(\mathfrak{p})$ kanonisch zu \mathbb{R} isomorph, vermöge $[f/g] \mapsto f(4)/g(4)$. Unter diesem Isomorphismus ist dann der Funktionswert von f bei \mathfrak{p} gleich dem traditionell definierten Funktionswert $f(4)$.

Spiel & Spaß 2. Was sind die Funktionswerte von $90 \in \mathbb{Z}$ an allen Punkten aus $\text{Spec } \mathbb{Z}$? Wo hat die Funktion Nullstellen? Hat die Funktion auch doppelte Nullstellen?

Im Vergleich zu den in der Differentialgeometrie, komplexen Geometrie oder riemannschen Geometrie untersuchten Räumen hat $\text{Spec } A$ noch eine Besonderheit: Nur in den seltensten Fällen ist $\text{Spec } A$ ein Hausdorffraum. Insbesondere sind einpunktige Mengen $\{\mathfrak{p}\}$ nicht immer abgeschlossen. Punkte \mathfrak{p} , für die $\{\mathfrak{p}\}$ doch abgeschlossen ist, heißen *abgeschlossene Punkte*.



Die abgeschlossenen Punkte von $\text{Spec } \mathbb{C}[X, Y]$ sind alle von der Form $(X - z, Y - w)$ mit $z, w \in \mathbb{C}$; die abgeschlossenen Punkte von $\text{Spec } \mathbb{C}[X, Y]$ stehen also in kanonischer Eins-zu-Eins-Beziehung zu den Punkten des Vektorraums \mathbb{C}^2 .

In $\text{Spec } \mathbb{C}[X, Y]$ gibt es aber auch noch nicht-abgeschlossene Punkte. Zum Beispiel ist der Punkt $(Y - X^2)$ nicht abgeschlossen. In seinem Abschluss liegen (er selbst und) alle Punkte der Form $(X - z, Y - w)$ mit $w = z^2$, also alle Punkte der Normalparabel. Wenn man ein Bild von $\text{Spec } \mathbb{C}[X, Y]$ zeichnet, malt man $(Y - X^2)$ als eine Art delokalisierte Punktwolke, als Geisterpunkt, der überall und nirgendwo auf $V((Y - X^2))$ sitzt.

Spiel & Spaß 3. Beweise die letzten beiden Korrespondenzen. Sei also \mathfrak{p} ein Primideal. Zeige: Der topologische Abschluss von $\{\mathfrak{p}\}$ in $\text{Spec } A$ ist gerade die Menge derjenigen Primideale \mathfrak{q} , die über \mathfrak{p} sitzen, also $\{\mathfrak{q} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}\}$.

Mehrere Aussagen der Algebra haben schon mit diesem kleinen Wörterbuch eine geometrische Bedeutung:

- *Über jedem Primideal \mathfrak{p} gibt es ein maximales Ideal \mathfrak{m} .*
Jeder Punkt enthält einen abgeschlossenen Punkt in seinem Abschluss. Jeder generische Punkt spezialisiert sich zu mindestens einem abgeschlossenen Punkt.
- *Das Primideal \mathfrak{p} ist ein minimales Primideal.*
Der Abschluss von \mathfrak{p} ist eine irreduzible Komponente von $\text{Spec } A$.
- *Der Ring enthält genau ein minimales Primideal.*
Der Raum $\text{Spec } A$ ist irreduzibel.
- *Unter jedem Primideal gibt es ein minimales Primideal.*
Jeder Punkt liegt in irgendeiner irreduziblen Komponente.
- *Der Ring ist lokal.*
Der Raum $\text{Spec } A$ enthält nur einen einzigen abgeschlossenen Punkt.

Spiel & Spaß 4. Sei $A = \text{Spec } \mathbb{C}[X, Y]/(XY)$. Überzeuge dich davon, dass $\text{Spec } A$ wie ein Achsenkreuz aussieht. Es besteht aus zwei irreduziblen Komponenten, den beiden Achsen. Zeige, dass A genau zwei minimale Primideale enthält (nämlich $([X])$ und $([Y])$) und erkläre, wie diese mit den Komponenten zusammenhängen.

Mit dem geometrischen Raum $\text{Spec } A$ kann man sich auch (beliebige, nicht unbedingt prime) Ideale von A veranschaulichen. Und zwar kann man ein Ideal \mathfrak{a} dadurch visualisieren, indem man die abgeschlossene Menge $V(\mathfrak{a})$ betrachtet. *Anschaulich ist das die Menge derjenigen Punkte, bei denen alle Funktionen aus \mathfrak{a} verschwinden.*

Dabei gelten folgende Rechenregeln:

- $V(0) = \text{Spec } A$. Die Nullfunktion verschwindet an jedem Punkt.
- $V((1)) = \emptyset$. Die Einsfunktion verschwindet nirgendwo.
- $V(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cap V(\mathfrak{b})$. Punkte, bei denen alle Funktionen aus $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ verschwinden, sind genau die, bei denen alle Funktionen aus \mathfrak{a} und alle Funktionen aus \mathfrak{b} verschwinden.
- $V(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$.

Die Geometrie ist aber *blind bezüglich Nilpotenz*: Für jedes Ideal \mathfrak{a} gilt $V(\mathfrak{a}) = V(\sqrt{\mathfrak{a}})$. Und wenn eine Funktion $f \in A$ an allen Punkten verschwindet, heißt das nicht, dass $f = 0$; es heißt nur, dass f nilpotent ist.