

# Hinweise zu den Übungsaufgaben in Algebra II

## Übungsblatt 3

**Aufgabe 1.** Teilaufgabe a) hat etwas mit Standgruppen zu tun. Für Teilaufgabe b) ist interessant, was Fixpunkte mit Bahnen zu tun haben. (Was sind Fixpunkte denn überhaupt, und was sind Bahnen?) Welche Gleichung der Vorlesung ist also vermutlich anwendbar?

**Aufgabe 4.** Ein beliebiges Element der disjunkt-gemachten Vereinigung  $Y_1 \amalg \dots \amalg Y_n$  ist ein Paar  $(i, y)$ , wobei  $i \in \{1, \dots, n\}$  ein Index und  $y$  ein Element der entsprechenden Menge  $Y_i$  ist. Ein *Isomorphismus von  $G$ -Wirkungen* ist per Definition eine bijektive  $G$ -äquivalente Abbildung. Für Teilaufgabe b) ist es hilfreich,  $X$  in Bahnen zu zerlegen.

**Aufgabe 5.** Diese Aufgabe benötigt aber nur die Definition von Normalteilern und das Verständnis der mengentheoretischen Schreibweise: Die Menge  $N$  besteht aus all den Elementen von  $G$ , welche in allen  $N_i$  liegen. Über die Größe von  $I$  kann nichts vorausgesetzt werden. Wer mag, kann aber zuerst den Fall des Schnitts zweier Normalteiler behandeln; der allgemeine Fall verläuft ähnlich.

## Übungsblatt 4

**Aufgabe 2.** In beiden Teilaufgaben geht es nicht um Umkehrfunktionen, sondern um Urbildmengen.

**Aufgabe 3.** Die Gruppe  $GL_n(\mathbb{R})$  ist die Menge der invertierbaren  $(n \times n)$ -Matrizen, mit der Matrixmultiplikation als Gruppenverknüpfung. Die Untergruppe  $O_n(\mathbb{R})$  ist die Teilmenge der orthogonalen Matrizen. Eine Matrix  $A$  heißt genau dann *orthogonal*, wenn das Produkt  $A^t A$  die Einheitsmatrix ist. Orthogonale Matrizen haben als Determinante stets  $\pm 1$ . Die Untergruppe  $SO_n(\mathbb{R})$  ist die Teilmenge solcher orthogonalen Matrizen, deren Determinante  $+1$  ist. Für die Determinante gilt die Rechenregel  $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ .

Bei Teilaufgabe b) muss man sich zunächst überlegen, ob man  $SO_n(\mathbb{R})$  auf  $C_2$  oder umgekehrt wirken lassen möchte (nur eine Variante funktioniert), und wie diese Wirkung explizit aussehen soll. Wie bei Teilaufgabe c) die Gruppe  $SO_3(\mathbb{R})$  auf  $\mathbb{R}^3$  wirkt, ist im Skript angegeben (Beispiel 6.76).

Im Staatsexamen ist das halbdirekte Produkt immer wieder wichtig, um die öfter vorkommenden Aufgaben der Art *Geben Sie eine nicht-abelsche Gruppe der Ordnung 2012 an.* zu lösen.

Die Diagonalmatrix, die oben links eine  $-1$  stehen und deren restliche Diagonaleinträge mit  $+1$  besetzt sind, spielt bei Teilaufgabe b) eine Rolle. Wer mich anschreibt, bekommt weitere Tipps.

**Aufgabe 4.** Eine endliche Gruppe heißt genau dann  *$p$ -Gruppe*, wenn die Anzahl ihrer Elemente eine  $p$ -Potenz ist.

Eine nichttriviale  $p$ -Gruppe besitzt stets ein Element der Ordnung  $p$  in ihrem Zentrum. Das Kriterium aus a) ist für b) nützlich.

**Aufgabe 5.** Ein *größter endlicher auflösbarer Normalteiler* ist per Definition ein Normalteiler  $N$  in  $G$ , welcher selbst endlich und auflösbar ist und folgende Eigenschaft hat: Für jeden beliebigen endlichen auflösbaren Normalteiler  $N'$  in  $G$  gilt  $N' \subseteq N$ .

Für b) ist a) nützlich.