Universität Augsburg Lehrstuhl für Algebra und Zahlentheorie Prof. Marc Nieper-Wißkirchen Ingo Blechschmidt

# Übungsblatt 6 zur Algebra II

Abgabe bis 26. November 2013, 17:00 Uhr

## **Aufgabe 1.** (2+2) Elementarteiler von Matrizen

- a) Sei M eine ganzzahlige  $(n \times m)$ -Matrix. Seien  $d_1, \ldots, d_r$  die Elementarteiler von M. Sei  $\lambda_i$  der größte gemeinsamer Teiler aller i-Minoren. Zeige:  $\lambda_i = d_1 \cdots d_i$ .
- b) Bestimme die Elementarteiler folgender Matrix:

$$\begin{pmatrix}
2 & 6 & 8 \\
3 & 1 & 2 \\
9 & 5 & 4
\end{pmatrix}$$

## Aufgabe 2. (2+2) Klassifikation endlicher abelscher Gruppen

- S a) Bestimme bis auf Isomorphie alle abelschen Gruppen der Ordnung 24.
- S b) Bestimme bis auf Isomorphie alle abelschen Gruppen der Ordnung 180.

#### **Aufgabe 3.** (1+3) Zerlegung in p-primäre Komponenten

Sei A eine endliche abelsche Gruppe. Eine Primzahl p heißt genau dann assoziierte Primzahl zu A, wenn die Untergruppe  $A[p^{\infty}]$  derjenigen Elemente von A, deren Ordnung eine p-Potenz ist, nichttrivial ist. In diesem Fall heißt  $A[p^{\infty}]$  p-primäre Komponente von A.

- a) Zeige, dass A nur endlich viele assoziierte Primzahlen besitzt.
- b) Zeige, dass A isomorph zum direkten Produkt der p-primären Komponenten von A ist.

# Aufgabe 4. (2+2) Lokalisierung nach einer Primzahl

Sei p eine Primzahl und  $\mathbb{Z}_{(p)}$  die Menge all derjenigen rationalen Zahlen, in deren vollständig gekürzter Bruchdarstellung der Nenner nicht durch p teilbar ist.

- a) Zeige, dass  $\mathbb{Z}_{(p)}$  ein Unterring von  $\mathbb{Q}$  ist.
- b) Welche Elemente von  $\mathbb{Z}_{(p)}$  sind invertierbar?

## **Aufgabe 5.** (2+2) Beispiele für Ganzheitsringe

- S a) Zeige:  $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(i)} = \mathbb{Z}[i]$ .
- S b) Sei  $\zeta$  eine primitive *n*-te Einheitswurzel. Zeige:  $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\zeta)} = \mathbb{Z}[\zeta]$ .