

Übungsblatt 12 zu Modellkategorien

Aufgabe 1. Schwache Äquivalenzen zwischen simplizialen Mengen

Sei $f : X \rightarrow Y$ ein Morphismus simplizialer Mengen. Seien $X \rightarrow \bar{X}$ und $Y \rightarrow \bar{Y}$ anodyne Erweiterungen, wobei \bar{X} und \bar{Y} Kan-Komplexe sind. Zeige, dass f genau dann eine schwache Äquivalenz ist, wenn ein Lift $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow \bar{Y}$ von f eine Homotopieäquivalenz ist.

Aufgabe 2. Modelle für den Einheitskreis

Zeige oder widerlege: Die simpliziale Menge \mathbb{S}^1 (eine Untermenge von $\Delta[2]$) und der Quotient $\Delta[1]/\sim$ aus Blatt 9, Aufgabe 2c) sind zueinander homotopieäquivalent.

Aufgabe 3. Die lange exakte Sequenz von Homotopiegruppen

Für einen Kan-Komplex X und einen Basispunkt $x \in X_0$ ist die n -te Homotopiegruppe $\pi_n(X, x)$ die Menge der Homotopieklassen von Morphismen $\Delta[n]/\partial\Delta[n] \rightarrow X$.

- Sei $p : E \rightarrow X$ eine Kan-Faserung, $F := p^{-1}[x]$ die Faser über x und $e \in F_0$ ein Punkt. Verwende die Rechtshochhebungseigenschaft von p bezüglich der Inklusion $\Lambda^0[n] \rightarrow \Delta[n]$, um eine Abbildung $\delta : \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_{n-1}(F, e)$ zu konstruieren.
- Zeige, dass folgende Sequenz punktierter Mengen exakt ist.

$$\cdots \rightarrow \pi_n(F, e) \rightarrow \pi_n(E, e) \rightarrow \pi_n(X, x) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(F, e) \rightarrow \cdots \rightarrow \pi_0(F) \rightarrow \pi_0(E) \rightarrow \pi_0(X)$$

Aufgabe 4. Das Theorem von Whitehead für Kan-Komplexe

Sei $f : X \rightarrow Y$ ein Morphismus von Kan-Komplexen. Seien die induzierten Abbildungen $\pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$ und $\pi_n(X, x) \rightarrow \pi_n(Y, f(x))$ für alle $x \in X_0$ und $n \geq 1$ bijektiv. Zeige, dass f eine Homotopieäquivalenz ist.