

Varianten des Theorems von Kirchberger

Tim Baumann

TopMath-Frühlingsschule in Oberschönenfeld

4. März 2014

Theorem (Kirchberger)

*Seien P und Q nichtleere, kompakte Teilmengen von E^n .
Dann sind P und Q genau dann durch eine Hyperebene trennbar,
wenn für jede Menge $T \subset E^n$ mit maximal $n + 2$ Punkten die
Mengen $P \cap T$ und $Q \cap T$ durch eine Hyperebene trennbar sind.*

Theorem (Kirchberger)

Seien P und Q nichtleere, kompakte Teilmengen von E^n .
Dann sind P und Q genau dann durch eine **Hyperebene** trennbar,
wenn für jede Menge $T \subset E^n$ mit maximal $n + 2$ Punkten die
Mengen $P \cap T$ und $Q \cap T$ durch eine **Hyperebene** trennbar sind.

Übersicht

- 1 Trennung durch Sphären
- 2 Trennung durch Zylinder
- 3 Trennung durch Parallelotope

Definition

Sei $p \in \mathbb{E}^n$ und $\alpha > 0$. Dann heißt

$$S_\alpha(p) := \{x \in \mathbb{E}^n \mid \|x - p\| = \alpha\}$$

Sphäre mit Radius α um den Punkt p .

Definition

Sei $p \in \mathbb{E}^n$ und $\alpha > 0$. Dann heißt

$$S_\alpha(p) := \{x \in \mathbb{E}^n \mid \|x - p\| = \alpha\}$$

Sphäre mit Radius α um den Punkt p .

Definition

Seien A und B Teilmengen von \mathbb{E}^n .

Die Sphäre $S_\alpha(p)$ *trennt* A und B *streng*, wenn gilt:

$$\forall a \in A : \|p - a\| < \alpha$$

und

$$\forall b \in B : \|p - a\| > \alpha$$

Definition

Sei $p \in \mathbb{E}^n$ und $\alpha > 0$. Dann heißt

$$S_\alpha(p) := \{x \in \mathbb{E}^n \mid \|x - p\| = \alpha\}$$

Sphäre mit Radius α um den Punkt p .

Definition

Seien A und B Teilmengen von \mathbb{E}^n .

Die Sphäre $S_\alpha(p)$ *trennt* A und B *streng*, wenn gilt:



$$\forall a \in A : \|p - a\| < \alpha$$

und

$$\forall b \in B : \|p - a\| > \alpha$$

Theorem (Kirchberger)

*Seien P und Q nichtleere, kompakte Teilmengen von \mathbb{E}^n .
Dann sind P und Q genau dann durch eine Hyperebene streng trennbar, wenn für jede Menge $T \subset \mathbb{E}^n$ mit maximal $n+2$ Punkten die Mengen $P \cap T$ und $Q \cap T$ durch eine Hyperebene streng trennbar sind.*


Theorem (Kirchberger')

Seien P und Q nichtleere, kompakte Teilmengen von E^n .
Dann sind P und Q genau dann durch eine **Sphäre** streng trennbar, wenn für jede Menge $T \subset E^n$ mit maximal $n+2$ Punkten die Mengen $P \cap T$ und $Q \cap T$ durch eine **Sphäre** streng trennbar sind.


Theorem (Kirchberger')

*Seien P und Q nichtleere, kompakte Teilmengen von E^n .
Dann sind P und Q genau dann durch eine Sphäre streng trennbar, wenn für jede Menge $T \subset E^n$ mit maximal $n+3$ Punkten die Mengen $P \cap T$ und $Q \cap T$ durch eine Sphäre streng trennbar sind.*


Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:




Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:




Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:




Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:




Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:




Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:




Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:




Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:




Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:




Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:




Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:



Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:





Folgendes Beispiel im E^2 zeigt, dass die Trennbarkeit von $n + 2 = 4$ Punkten aus $P = \{p_1, p_2, p_3\}$ und $Q = \{q_1, q_2\}$ mit Sphären nicht ausreicht, um Trennbarkeit von P und Q zu folgern:




Theorem (Kirchberger')

Seien P und Q nichtleere, kompakte Teilmengen von E^n . Dann sind P und Q genau dann durch eine Sphäre streng trennbar, wenn für jede Menge $T \subset E^n$ mit maximal $n + 3$ Punkten die Mengen $P \cap T$ und $Q \cap T$ durch eine Sphäre streng trennbar sind.







① Bette E^n wie üblich in den E^{n+1} ein.




- ① Bette E^n wie üblich in den E^{n+1} ein.
- ② Sei $p \in E^n$ und $S \subset E^{n+1}$ eine Sphäre, die in p tangential zu E^n ist.




- 1 Bette E^n wie üblich in den E^{n+1} ein.
- 2 Sei $p \in E^n$ und $S \subset E^{n+1}$ eine Sphäre, die in p tangential zu E^n ist.
- 3 Betrachte die stereographische Projektion $\phi : E^n \rightarrow S$.




- ① Bette E^n wie üblich in den E^{n+1} ein.
- ② Sei $p \in E^n$ und $S \subset E^{n+1}$ eine Sphäre, die in p tangential zu E^n ist.
- ③ Betrachte die stereographische Projektion $\phi : E^n \rightarrow S$.




- ① Bette E^n wie üblich in den E^{n+1} ein.
- ② Sei $p \in E^n$ und $S \subset E^{n+1}$ eine Sphäre, die in p tangential zu E^n ist.
- ③ Betrachte die stereographische Projektion $\phi : E^n \rightarrow S$.
- ④ Seien $P, Q \subset E^n$ nichtleer und kompakt sodass für jede Menge $T \subset E^n$ mit maximal $n + 3$ Punkten die Mengen $P \cap T$ und $Q \cap T$ durch eine Sphäre streng trennbar sind.



- ① Bette E^n wie üblich in den E^{n+1} ein.
- ② Sei $p \in E^n$ und $S \subset E^{n+1}$ eine Sphäre, die in p tangential zu E^n ist.
- ③ Betrachte die stereographische Projektion $\phi : E^n \rightarrow S$.
- ④ Seien $P, Q \subset E^n$ nichtleer und kompakt sodass für jede Menge $T \subset E^n$ mit maximal $n+3$ Punkten die Mengen $P \cap T$ und $Q \cap T$ durch eine Sphäre streng trennbar sind.
- ⑤ Seien P' und Q' die (kompakten) Bilder von P bzw. Q unter ϕ .




Behauptung: P' und Q' können durch eine Hyperebene $H_0 \subset E^{n+1}$ streng getrennt werden.




Behauptung: P' und Q' können durch eine Hyperebene $H_0 \subset E^{n+1}$ streng getrennt werden.

- ⑥ Sei $T \subset S \subset E^{n+1}$ eine Menge mit höchstens $n + 3$ Punkten.




Behauptung: P' und Q' können durch eine Hyperebene $H_0 \subset E^{n+1}$ streng getrennt werden.

- ⑥ Sei $T \subset S \subset E^{n+1}$ eine Menge mit höchstens $n + 3$ Punkten.
- ⑦ Nach Voraussetzung werden die Urbilder $\phi^{-1}(T \cap P') = \phi^{-1}(T) \cap P$ und $\phi^{-1}(T \cap Q') = \phi^{-1}(T) \cap Q$ durch eine Sphäre streng getrennt.




Behauptung: P' und Q' können durch eine Hyperebene $H_0 \subset E^{n+1}$ streng getrennt werden.

- ⑥ Sei $T \subset S \subset E^{n+1}$ eine Menge mit höchstens $n + 3$ Punkten.
- ⑦ Nach Voraussetzung werden die Urbilder $\phi^{-1}(T \cap P') = \phi^{-1}(T) \cap P$ und $\phi^{-1}(T \cap Q') = \phi^{-1}(T) \cap Q$ durch eine Sphäre streng getrennt.
- ⑧ Die stereogr. Projektion der Sphäre ist ein Kreis auf S (Kreistreue).




Behauptung: P' und Q' können durch eine Hyperebene $H_0 \subset E^{n+1}$ streng getrennt werden.

- ⑥ Sei $T \subset S \subset E^{n+1}$ eine Menge mit höchstens $n + 3$ Punkten.
- ⑦ Nach Voraussetzung werden die Urbilder $\phi^{-1}(T \cap P') = \phi^{-1}(T) \cap P$ und $\phi^{-1}(T \cap Q') = \phi^{-1}(T) \cap Q$ durch eine Sphäre streng getrennt.
- ⑧ Die stereogr. Projektion der Sphäre ist ein Kreis auf S (Kreistreue).
- ⑨ Der Kreis auf S ist der Schnitt von S mit einer Hyperebene H .




Behauptung: P' und Q' können durch eine Hyperebene $H_0 \subset E^{n+1}$ streng getrennt werden.


- 6 Sei $T \subset S \subset E^{n+1}$ eine Menge mit höchstens $n + 3$ Punkten.
- 7 Nach Voraussetzung werden die Urbilder $\phi^{-1}(T \cap P') = \phi^{-1}(T) \cap P$ und $\phi^{-1}(T \cap Q') = \phi^{-1}(T) \cap Q$ durch eine Sphäre streng getrennt.
- 8 Die stereogr. Projektion der Sphäre ist ein Kreis auf S (Kreistreue).
- 9 Der Kreis auf S ist der Schnitt von S mit einer Hyperebene H .
- 10 Da H dann $T \cap P'$ und $T \cap Q'$ streng trennt, folgt die Behauptung nach dem Satz von Kirchberger.




- 11 Sei $\alpha \in E^{n+1}$ und $b \in \mathbb{R}$, sodass $\langle \alpha, p \rangle < b$ für alle $p \in P'$ und $\langle \alpha, q \rangle > b$ für alle $q \in Q'$.



- 11 Sei $\alpha \in E^{n+1}$ und $b \in \mathbb{R}$, sodass $\langle \alpha, p \rangle < b$ für alle $p \in P'$ und $\langle \alpha, q \rangle > b$ für alle $q \in Q'$.
- 12 Da P' und Q' kompakt sind, gibt es $\epsilon > 0$ mit $\langle \alpha, p \rangle \leq b - \epsilon$ für alle $p \in P'$ und $\langle \alpha, q \rangle \geq b + \epsilon$ für alle $q \in Q'$.



- 11 Sei $\alpha \in E^{n+1}$ und $b \in \mathbb{R}$, sodass $\langle \alpha, p \rangle < b$ für alle $p \in P'$ und $\langle \alpha, q \rangle > b$ für alle $q \in Q'$.
- 12 Da P' und Q' kompakt sind, gibt es $\epsilon > 0$ mit $\langle \alpha, p \rangle \leq b - \epsilon$ für alle $p \in P'$ und $\langle \alpha, q \rangle \geq b + \epsilon$ für alle $q \in Q'$.
- 13 Somit können wir annehmen, dass H_0 den Nordpol der Sphäre S nicht schneidet.



- 11 Sei $\alpha \in E^{n+1}$ und $b \in \mathbb{R}$, sodass $\langle \alpha, p \rangle < b$ für alle $p \in P'$ und $\langle \alpha, q \rangle > b$ für alle $q \in Q'$.
- 12 Da P' und Q' kompakt sind, gibt es $\epsilon > 0$ mit $\langle \alpha, p \rangle \leq b - \epsilon$ für alle $p \in P'$ und $\langle \alpha, q \rangle \geq b + \epsilon$ für alle $q \in Q'$.
- 13 Somit können wir annehmen, dass H_0 den Nordpol der Sphäre S nicht schneidet.
- 14 Der Schnitt $H_0 \cap S$ ist ein Kreis und $\phi^{-1}(H_0 \cap S)$ trennt P und Q .

Übersicht


- 1 Trennung durch Sphären
- 2 Trennung durch Zylinder
- 3 Trennung durch Parallelotope

Definition

Sei $A \subset \mathbb{E}^n$ und $F \subset \mathbb{E}^n$ ein k -dimensionaler Unterraum. Dann heißt

$$Z = A + F = \{a + f \mid a \in A, f \in F\}$$

von A und F erzeugter k -Zylinder.



Übersicht

- 1 Trennung durch Sphären
- 2 Trennung durch Zylinder
- 3 Trennung durch Parallelotope**

TODO