# Sesión 19
# Derivadas de orden superior. Regla de la Cadena.

*Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica*

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

# Sesión 19. Derivadas de orden superior. Regla de la Cadena.



# Tabla de contenidos


1. Introducción.
2. Derivadas de orden superior
3. Regla de la cadena

# Introducción.


En esta sesión relativamente técnica vamos a aprender más sobre las derivadas parciales. En primer lugar, hablaremos de derivadas parciales de orden superior. Al igual que en una variable, las derivadas parciales segundas, terceras, etc permiten profundizar más en el comportamiento local de una función cuando es necesario. Por el camino descubriremos el lema de Schwarz, una cierta propiedad de simetría en las derivadas parciales que es nueva para nosotros porque no tiene análogo en funciones de una variable. Y pasaremos por el polinomio de Taylor en varias variables, muy brevemente porque no tenemos tiempo para tratarlo en profundidad.

Finalmente discutiremos la otra idea clave de esta sesión, la Regla de la Cadena, para derivar composiciones de funciones. Formalmente es completamente análoga a la del caso de una variable.Pero en la práctica veremos que es muy importante familiarizarse con ella, para usarla correctamente y entender la información contenida en la estructura de algunas derivadas parciales.


# Derivadas de orden superior

## Derivadas parciales segundas, terceras, etc.

Una función regular como $f(x,y) = e^x \operatorname{sin}(y^3)$ produce dos derivadas parciales (primeras o de primer orden) como en este ejemplo:




Pero las expresiones de $f_x(x,y) = 2x\,e^{x^2}\,\mathrm{sen}(5y)$ y de $f_y(x,y) = 5\,e^{x^2}\,\cos(5y)$ son de nuevo funciones regulares de dos variables, y puedes por tanto calcular sus derivadas parciales.
La derivada $f_x(x,y)$ producirá dos derivadas parciales $f_{xx}(x,y), f_{xy}(x,y)$.
Y lo mismo ocurre con $f_y(x,y)$ que produce $f_{yx}(x,y), f_{yy}(x,y)$.
La siguiente página muestra el resultado de hacer eso en este ejemplo:




También se utiliza esta notación:

$$f_{xx}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2},\quad f_{xy}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y},\quad f_{yx}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x},\quad f_{yy}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2},$$

Estas cuatro funciones son las **derivadas parciales segundas** de $f$. De la misma forma se definen las derivadas parciales terceras, como $f_{xxy}$, derivadas parciales cuartas, etc.

**Ejercicio 19C01.** Usa la aplicación de derivadas parciales La versión actualizada ahora incluye practica de parciales segundas y terceras.

En el diagrama anterior hemos destacada el hecho de que $f_{xy} = f_{yx}$. Esto no es una casualidad:

### Lema de Schwarz, funciones $C^k$

Supongamos que las derivadas parciales segundas de $f$ existen y son continuas en un entorno de un punto $(x_0, y_0)$. Entonces se cumple (en todos los puntos del entorno):

$$f_{xy} = f_{yx}$$

Estas derivadas segundas que sólo se diferencian en el orden de derivación se denominan a menudo **derivadas cruzadas.**
Una función cuyas derivadas segundas son continuas se dice que es de clase $C^2$. De la misma forma se define $C^k$ para $k > 2$. Las funciones $C^\infty$ son $C^k$ para todo $k$. Y las $C^0$ son las funciones continuas.

**Ejercicio 19A01.** Supongamos que $f$ es $C^\infty$. ¿Cuántas derivadas parciales cuartas *distintas* tiene?

# Regla de la cadena

## Matriz jacobiana

En el caso de funciones $z = f(x, y)$ hemos visto que el gradiente $\nabla f = (fx, f_y)$ es una herramienta útil para manejar la información que contienen las derivadas parciales. En el caso de funciones $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$, que vendrán dadas por sistemas como este:

$$\begin{cases} y_1 = & y_1(x_1, \dots, x_n) \\ & \vdots \\ y_m = & y_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

el análogo del gradiente es la **matriz jacobiana**, con *todas las derivadas* de $f$;

$$\underbrace{Df(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial(y_1, \dots, y_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}}_{\text{notación}} \overset{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \frac{\partial y_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

## Regla de la cadena matricial

La primera utilidad que le vamos a encontrar a la matriz Jacobiana es que nos permite expresar de forma muy sencilla la Regla de la Cadena para funciones de varias variables. Recuerda que la Regla de la Cadena nos dice como obtener la derivada de una composición. Es decir de cuando hacemos *dos funciones seguidas* o, de otra manera, aplicamos una segunda función $g$ al resultado de una primera función $f$, lo que denotamos $g \circ f$.
En particular, si tenemos una composición $g \circ f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^p$, con estos nombres para las variables implicadas:

$$(x_1, \dots, x_n) \xrightarrow{\text{f}} (y_1, \dots, y_m) \xrightarrow{\text{g}} (z_1, \dots, z_p)$$

entonces si suponemos que $f$ y $g$ son diferenciables, la composición $g \circ f$ también lo es y su matriz jacobiana es el producto de las matrices jacobianas de $g$ y $f$ (en el único orden posible):

$$D(g \circ f) = Dg \cdot Df$$

Al analizar la estructura de ese producto matricial, el elemento $(i, j)$ es el producto escalar de la fila número $i$ de $Dg$ con la columna número $j$ de $Df$, como se ilustra aquí:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial z_1}{\partial x_j} & \cdots & \frac{\partial z_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial z_i}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial z_i}{\partial x_j} & \cdots & \frac{\partial z_i}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial z_p}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial z_p}{\partial x_j} & \cdots & \frac{\partial z_p}{\partial x_n} \end{pmatrix}}_{Dg\circ f(\vec{x}) \in \mathbb{R}^{p\times n}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial z_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial z_i}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial z_i}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial z_p}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial z_p}{\partial y_m} \end{pmatrix}}_{Dg(\vec{y}) \in \mathbb{R}^{p\times m}} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_j} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_j} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}}_{Df(\vec{x}) \in \mathbb{R}^{m\times n}}$$

**Estructura de la matriz jacobiana de la composición**

Cada derivada parcial de la composición es por lo tanto una suma de productos de derivadas parciales de $f$ y $g$ como esta:

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_j} = \frac{\partial z_i}{\partial y_1}\frac{\partial y_1}{\partial x_j} + \cdots + \frac{\partial z_i}{\partial y_m}\frac{\partial y_m}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial z_i}{\partial y_k}\frac{\partial y_k}{\partial x_j}$$

## Regla de la cadena por caminos

## Derivación implícita

## Teorema de Taylor

## Versión matricial de Taylor y matriz Hessiana

## Plantilla

**Ejercicio 18A04.**
**Ejercicios Hoja 8B GITI 25-26.**