

Sesión 08

Polinomios de Taylor.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 08. Polinomios de Taylor.



Cogujada Montesina, Arganda del Rey, Madrid.

- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

- 1 Introducción.
- 2 Polinomio de Taylor
- 3 Error al aproximar f por su polinomio de Taylor

Introducción.

Los polinomios de Taylor surgen como una continuación natural de la idea de recta tangente. Dijimos en su momento que la recta tangente no puede ayudarnos con la idea de curvatura de una función, simplemente *porque las rectas no se curvan*. Pero los polinomios de grado dos, cuyas gráficas son parábolas, sí que se curvan. Así que podemos preguntarnos ¿cuál es la parábola que mejor aproxima a $f(x)$ cerca de x_0 ? Y más en general, dado un número natural $n = 1, 2, 3, \dots$, ¿cuál es el polinomio de grado n que mejor aproxima a $f(x)$ cerca de x_0 ?

En esta sesión vamos a conocer la respuesta que da el Cálculo a esa pregunta. De momento, antes de sumergirnos en las ecuaciones, empezaremos explorando la idea mediante esta construcción GeoGebra.

También vamos a dedicar parte de la sesión a entender en detalle cuál es el error que se comete al sustituir una función por su polinomio de Taylor. En próximas sesiones pondremos a trabajar a estos polinomios y veremos algunas de sus muchas aplicaciones.

Polinomio de Taylor

Definición y parte principal de una función.

Supongamos que f es una función derivable n veces en x_0 . Entonces su **polinomio de Taylor de orden n en x_0** es:

$$Pf_{n;x_0}(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)}_{\text{recta tgte, en } x_0} + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

La **parte principal** de f en x_0 es el término no nulo de grado más bajo en este polinomio.

Observaciones:

- $k! = k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ es el *factorial* de k . Recuerda $0! = 1$.
- Fíjate en que, como hemos indicado, los dos primeros términos definen la recta tangente a f en x_0 .
- En la próxima sesión veremos que la parte principal sirve para resolver muchas indeterminaciones, generalizando la Regla de L'Hôpital que tal vez ya conoces.

Observaciones adicionales:

- Cuando no haya riesgo de confusión simplificaremos la notación escribiendo simplemente $P_n(x)$
- El polinomio de Taylor en el caso especial en que $x_0 = 0$ se denomina polinomio de Maclaurin.
- En general, no es fácil hallar una fórmula sencilla para la derivada de orden n de una función y , por consiguiente, para el polinomio de Taylor de orden n . Los primeros dos ejercicios exploran algunos casos en que sí existen esas fórmulas.
- El ejercicio 08B01 ilustra la idea de que: *“si quieres que dos funciones se parezcan mucho, haz que tengan las mismas derivadas”*.

Ejercicio 08A01. Hallar: (a) el polinomio de Maclaurin de orden 2 de $f(x) = (x+2)e^x$. (b) el polinomio de Taylor de orden n de $f(x) = e^x$ en $x = 0$ y $x = 1$.

Ejercicio 08B01. Comprueba que el polinomio de Taylor de orden 3 cumple:

$$P_3(x_0) = f(x_0), \quad P'_3(x_0) = f'(x_0), \quad P''_3(x_0) = f''(x_0), \quad P'''_3(x_0) = f'''(x_0).$$

Ejercicios Hoja 2B GITI 25-26. 17.

Ejercicio 08C01. Usa el notebook de esta sesión para rehacer el ejercicio 08A01.

Error al aproximar f por su polinomio de Taylor

Definición del error para orden n

El error del polinomio de Taylor de orden n de f en x_0 se define como la diferencia entre el polinomio y la función:

$$Ef_{n;x_0}(x) = Pf_{n;x_0}(x) - f(x)$$

A menudo escribiremos simplemente E_n si no hay ambigüedad.

La intuición nos dice que, en condiciones normales, el error E_n se hace muy pequeño cuando $x \rightarrow x_0$. Pero ¿podemos hacer más precisa esa idea? ¿Cómo de pequeño, pequeño *comparado con qué*? Esta última pregunta contiene la idea clave.

Polinomios de Taylor que debes conocer.

- $\operatorname{sen}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
- $\operatorname{sh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\operatorname{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
- $\operatorname{Log}(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
- $\operatorname{arctg}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$
- $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)$
- $\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$

Ejercicio 08C02. Usa el notebook de esta sesión para añadir dos términos más a las dos últimas fórmulas de esta tabla.

Ejercicio 08C03. Usa el notebook de esta sesión para hallar el polinomio de Taylor de orden alto (por ejemplo $n = 8$) de $f(x) = \frac{1}{1+x}$.

Ejercicio 08A02. Mira en la tabla el polinomio de Taylor de

$$f(x) = \log(1+x)$$

¿Cuál es la derivada de $f(x)$? ¿Cuál es la derivada *término a término* de su polinomio de Taylor? Piensa en el resultado.

Ejercicio 08A03. Mira en la tabla el polinomio de Taylor de $f(x) = \arctan(x)$. ¿Cuál es la derivada de $f(x)$? ¿Cuál es la derivada *término a término* de su polinomio de Taylor? Ahora sustituye x por x^2 en la función $\frac{1}{1+x}$ y también en su polinomio. Piensa en el resultado.

Ejercicio 08C04. Usa la tabla y sustituye x por x^3 en la función $\sin(x)$. Usa sympy para obtener el desarrollo de Taylor de esa función $\sin(x^3)$. Piensa en el resultado. Haz experimentos similares con otras funciones.