

Sesión 10

Crecimiento y extremos de una función.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 10. Crecimiento y extremos de una función.



Curruca capirotada, Villaviciosa, Asturias.

- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

- 1 Introducción.
- 2 Crecimiento y decrecimiento de una función. Extremos locales.
- 3 Relación entre crecimiento y signo de la derivada. Puntos críticos.
- 4 Relación entre extremos locales y signo de la derivada.
- 5 Derivadas de orden superior y extremos locales.
- 6 Ampliación: Teorema del Valor Medio

Introducción.

Cuando los métodos del Cálculo aparecieron en la época de Newton, el contenido de esta sesión fue, sin duda y entre otras muchas, una de las principales razones que causaron un enorme interés en comprender la, por entonces, *nueva matemática*. Una vez que un problema se traducía al lenguaje de las funciones, el Cálculo ofrecía en muchos casos un procedimiento práctico para encontrar la solución óptima a ese problema de entre todas las posibles. El Cálculo fue y sigue siendo por esa razón el principal fundamento de los métodos de Optimización. Hasta entonces la técnica, la industria y la ciencia habían avanzado a menudo a tientas, por prueba y error y sin tener la certeza sobre si la solución alcanzada era la mejor posible. Al despejar ese camino los métodos del Cálculo demostraron una capacidad transformadora que los convierten, sin exageración, en uno de los más valiosos patrimonios intelectuales de la humanidad.

Pero descendamos a un terreno más concreto. En esta sesión vamos a aprender a utilizar las derivadas para analizar el crecimiento y decrecimiento de una función. Veremos también cómo caracterizar los valores extremos (máximos o mínimos) que la función puede alcanzar en un conjunto de valores de la variable. Y lo ilustraremos con algunos ejemplos que permiten atisbar el alcance de estos métodos.


Crecimiento y decrecimiento de una función. Extremos locales.

Vocabulario básico sobre crecimiento.

Una función $f(x)$ es **creciente** en un intervalo I si para cualesquiera dos puntos $a < b$ de I se cumple $f(a) \leq f(b)$. La función es **estrictamente creciente** si siempre se cumple la desigualdad estricta $f(a) < f(b)$.

De modo análogo se define **decreciente** y **estrictamente decreciente**.


Desde el principio queremos invitarte a pensar en que, incluso en el caso de funciones sencillas estrictamente crecientes o decrecientes, existen cuatro tipos básicos de comportamiento, de (a) a (d) en esta figura.



Las gráficas de muchas funciones sencillas se pueden ver como una concatenación de arcos de uno de estos tipos.

Y vocabulario básico sobre extremos.

La función $f(x)$ alcanza un **máximo local o relativo** en x_0 si existe un intervalo I que contiene a x_0 tal que $f(x) \leq f(x_0)$ para todo x de I (y con x en el dominio de f). De modo análogo se define un **mínimo local o relativo**. Los máximos y mínimos locales se denominan conjuntamente **extremos locales**. Busca en la siguiente figura arcos de los tipos (a) hasta (d).



Cuando $f(x) \geq f(x_0)$ para todos los x del dominio de f decimos que f alcanza un **máximo absoluto** en x_0 .

Relación entre crecimiento y signo de la derivada. Puntos críticos.

Interpretación del signo de la derivada

Aunque ya lo avanzamos al discutir el Teorema de Rolle, vamos a hacer un enunciado formal. Sea f una función derivable en todos los puntos de un intervalo I contenido en su dominio. Entonces:

- (1) f es creciente en I si y sólo si $f'(x) \geq 0$ para todo x de I .
- (2) f es decreciente en I si y sólo si $f'(x) \leq 0$ para todo x de I .
- (3) f es *estrictamente* creciente en I si y sólo si $f'(x) > 0$ para todo x de I .
- (4) f es *estrictamente* decreciente en I si y sólo si $f'(x) < 0$ para todo x de I .

De esa manera, si sabemos analizar el signo de $f'(x)$, entenderemos el crecimiento y decrecimiento de $f(x)$.

Con esta construcción GeoGebra puedes explorar estas ideas.

Ejercicio 10A01. Analizar el signo de la derivada e identificar intervalos de crecimiento y decrecimiento para la función: $f(x) = (x^2 - 3x + 1)e^x$

Relación entre extremos locales y signo de la derivada.

Puntos críticos y extremos

Identificar los intervalos en los que el signo de la derivada se mantiene constante conduce a localizar los **puntos críticos** de la función, que son de dos tipos:

- puntos donde $f'(x) = 0$
- puntos donde f' no existe. **¡No olvides este tipo de puntos!**

Condición necesaria **pero no suficiente** de extremo

Todos los extremos locales de f son puntos críticos de f . ¡No funciona al revés!

Ejemplos clave: recuerda siempre estos ejemplos, en el origen:

$$\underbrace{f(x) = x^2}_{f'=0, \text{ extremo}}, \quad \underbrace{f(x) = x^3}_{f'=0, \text{ no extremo}}, \quad \underbrace{f(x) = |x|}_{f' \text{ no existe, extremo}}, \quad \underbrace{f(x) = \frac{1}{x^2}}_{f' \text{ no existe, no extremo}}$$

Criterio de la derivada primera (cambios de signo de f').

Sea x_0 un punto crítico de f y supongamos que f es continua en x_0 . + Si existe un intervalo (a, b) que contiene a x_0 tal que:

$f' > 0$ en (a, x_0) y $f' < 0$ en (x_0, b) .

Entonces f alcanza un **máximo local** en x_0 .

- Análogamente, si existe un intervalo (a, b) que contiene a x_0 tal que:

$f' < 0$ en (a, x_0) y $f' > 0$ en (x_0, b) .

Entonces f alcanza un **mínimo local** en x_0 .

- Finalmente, si f' no cambia de signo al pasar por x_0 , entonces f **no alcanza extremo local** en x_0 .

Observaciones:

- Una de las virtudes del criterio de la derivada primera es que se puede aplicar a puntos donde f no es derivable.
- **La continuidad sin embargo es esencial.** Recuerda $f(x) = \frac{1}{x^2}$.
- Para aplicarlo eficazmente piensa siempre en **factorizar la derivada** y analizar el signo de cada factor; después combínalos.

Ejercicio 10A02. Usa esto y los resultados de 10A01 para clasificar los extremos locales de $f(x) = (x^2 - 3x + 1)e^x$.

Ejercicio 10A02. Hallar los intervalos de crecimiento y los extremos relativos de la función:

$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 2x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Ejercicio 10B01. Analiza el crecimiento y los posibles extremos locales de $f(x) = x^5 - 15x^3 + 1$.

Ejercicio 10C01. Usa el notebook de esta sesión para dibujar estas funciones y confirmar tus resultados.

Ejercicios Hoja 2B GITI 25-26. 26, 27, 28.

Derivadas de orden superior y extremos locales.

Análisis de puntos críticos mediante el polinomio de Taylor

Aunque el criterio de la derivada primera es muy útil, su uso depende de nuestra capacidad de analizar el signo de f' . Es necesario por tanto disponer de alternativas cuando eso resulta difícil. La idea clave es que el polinomio de Taylor describe la forma de la función cerca del punto crítico que estemos examinando. Vamos a usar el siguiente ejercicio para explorar esta idea.

Ejercicio 10A03.

(1) Supongamos que sabes que $f(3) = 7$, $f'(3) = 0$, $f''(3) = -4$. ¿Cómo te imaginas la gráfica de f cerca de $x_0 = 3$?

(2) ¿Qué cambiaría si fuera $f''(3) = 8$, manteniendo los valores $f(3)$ y $f'(3)$?

(2) Ahora supongamos que

$$f(3) = 7, \quad f'(3) = 0, \quad f''(3) = 0, \quad \dots, \quad f^{(7)}(3) = 0, \quad f^{(8)}(3) = -2.$$

¿Cómo es la gráfica de f cerca de $x_0 = 3$?

Criterio de las derivadas de orden superior

Sea $f(x)$ una función con n derivadas continuas en un punto crítico x_0 . Supongamos que

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0 \text{ pero que } f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

Es decir, n corresponde a la **primera derivada no nula después de que la primera derivada sea nula**. Entonces:

- Si n es par y $f^{(n)}(x_0) < 0$, f alcanza un **máximo** local en x_0 .
- Si n es par y $f^{(n)}(x_0) > 0$, f alcanza un **mínimo** local en x_0 .
- Si n es impar, f **no** alcanza un extremo local en x_0 .

Ejercicio 10A04. Estudia si la función

$$f(x) = \frac{x^6}{2} - e^{x^6} + \sin(x^6) + \cos(x^3)$$

tiene un extremo local en $x_0 = 0$ y en tal caso, identifica de qué tipo es.

Indicación: Taylor.

Ejercicio 10C02. Haz los cálculos del ejercicio 10A04 **primero a mano** y luego usa el notebook de esta sesión para comprobarlos.

Ampliación: Teorema del Valor Medio

Aunque no vamos a usarlo directamente, este teorema está detrás de varios de los resultados que hemos visto en esta sesión. Y es uno de esos teoremas globales valiosísimos, porque nos permite pasar de la **escala local microscópica** de la derivada en un punto, a la *escala global macroscópica* de un intervalo cuyo tamaño puede ser muy grande

Teorema del Valor Medio

Sea f una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Entonces existe al menos un valor $c \in (a, b)$, en principio desconocido, tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a)$$

Observación: para empezar a entender la utilidad del teorema, fíjate en que siempre se cumple $b - a > 0$. Así que el signo del *incremento global* de f en $[a, b]$ coincide con el signo de $f'(c)$. Aunque no sepas el valor de c , si sabes que $f' > 0$ en el intervalo, entonces puedes decir que $f(a)$ es ...

Como ves, este teorema traslada la información sobre f' a estimaciones sobre incrementos de f .