

39

午前の部

試験問題	試験時間
1～97	10時00分～12時25分

● 指示があるまで開かないこと。

《注意事項》

1. 問題の数

試験問題は1～97までの97問である。

2. 受験地、受験番号、氏名の記入方法

注意事項を読み終わったら、まず受験地、受験番号、氏名を文字と数字で記入する。次に答案用紙右側の受験地、受験番号の該当する○をマークする(塗りつぶす)。なお、記入に当たっては次の例を参考のこと。

(例) 受験地・東京都、受験番号・90123、氏名・栄養花子の場合

午前

受験地	東京都	受験番号	90123
氏名	栄養花子		

受験地	北海道	宮城県	埼玉県	東京都	愛知県	大阪府	岡山県	福岡県	沖縄県
	○	○	○	●	○	○	○	○	○
受験番号	万	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	千	●	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	百	①	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	拾	①	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦
	巻	①	①	②	●	④	⑤	⑥	⑦

3. 答案の作成

- (1) HBの鉛筆を使用し濃くマークすること、○の外にはみ出さないように注意すること。

良い解答の例…… ● (濃くマークすること。)

悪い解答の例……  (解答にならない。)

- (2) 答えを修正した場合は、必ず「消しゴム」であとが残らないように完全に消すこと。鉛筆の色が残ったり  のような消し方などをしたりした場合は、修正したことにはならないので注意すること。
- (3) 答案用紙は折り曲げたりメモ等で汚したりしないよう特に注意すること。

4. 解答方法

解答方法は次のとおりである。

- (1) (例 1-1) の問題では(1)から(5)までの 5 つの選択肢があるので、そのうち質問に対する答えを 1 つ選び、答案用紙にマークすること。なお、この質問に 2 つ以上マークした場合は誤りとする。

(例 1-1)

201 管理栄養士の名称を用いて業務を開始できる日として、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 管理栄養士国家試験の合格発表日
- (2) 管理栄養士国家試験の合格証書受領日
- (3) 管理栄養士免許の申請日
- (4) 管理栄養士名簿の登録日
- (5) 管理栄養士免許証の受領日

正解は「(4)」であるから答案用紙の問題番号 201 の④をマークする。

201	①	②	③	④	⑤
↓					
201	①	②	③	●	⑤

また、(例 1-2) のような設問文の場合も、(1)から(5)までの 5 つの選択肢から答えを 1 つ選び、答案用紙にマークすること。なお、これらの質問に 2 つ以上マークした場合は誤りとする。

(例 1-2) ……誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- (2) (例 2)の問題では(1)から(4)までの4つの選択肢があるので、そのうち質問に対する答えとして最も適切なものを1つ選び、答案用紙にマークすること。なお、(例 2)の質問に2つ以上マークした場合は誤りとする。

(例 2)

202 管理栄養士に求められる専門職としてのあり方に関する記述である。**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 自らの幸福を追求する。
- (2) 人々の生活の質の向上を目指す。
- (3) 特定の関係者との協働を重視する。
- (4) 管理栄養士免許取得時の知識を維持する。

正解は「(2)」であるから答案用紙の問題番号202の②をマークする。

202	①	②	③	④
↓				
202	①	●	③	④

1 疾病の自然史と予防手段の適用段階に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 一次予防は、発症前期において行われる。
- (2) 一次予防の例に、がん患者への就労支援がある。
- (3) 二次予防は、感受性期において行われる。
- (4) 二次予防の例に、予防接種がある。
- (5) 三次予防の例に、腎不全患者への人工透析がある。

2 ある地域で採取した水道水の塩化物イオンの濃度は7.090 mg/L(塩素の原子量:35.45)であった。この水道水の塩化物イオン濃度(mmol/L)として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 0.010
- (2) 0.020
- (3) 0.050
- (4) 0.100
- (5) 0.200

3 わが国の国勢調査に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 3年に1回実施されている。
- (2) 調査対象は、層化無作為抽出法により選定する。
- (3) 調査対象は、日本国内に普段住んでいる外国人を含まない。
- (4) 調査項目は、「医療機関への受診の状況」を含む。
- (5) 調査結果をもとに、将来人口推計を行う。

4 A 地域および B 地域の年齢階級別人口と、基準集団の年齢階級別死亡率を表に示す。A 地域の死亡数は 12,000 人、B 地域の死亡数は 12,000 人であった。標準化死亡比は、表中の基準集団を 100 とする。A 地域と B 地域の比較に関して、この表から読み取れる内容の記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) A 地域の老年人口割合は、B 地域よりも高い。
- (2) A 地域の粗死亡率は、B 地域よりも高い。
- (3) A 地域の死亡数は、期待死亡数と同じである。
- (4) A 地域の期待死亡数は、B 地域の期待死亡数よりも多い。
- (5) A 地域の標準化死亡比は、B 地域の標準化死亡比よりも高い。

表 A 地域および B 地域の年齢階級別人口、基準集団の年齢階級別死亡率

年齢階級	A 地域 人口(人)	B 地域 人口(人)	基準集団 死亡率(人口 1 万対)
0～14 歳	240,000	90,000	2
15～64 歳	900,000	500,000	20
65 歳以上	300,000	400,000	300
合計	1,440,000	990,000	

5 集団 A と集団 B のスクリーニング結果を比較した(表)。集団 B の方が高い指標として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 敏感度
- (2) 特異度
- (3) 偽陽性率
- (4) 陽性反応的中度
- (5) 陰性反応的中度

表 集団 A と集団 B のスクリーニング結果と疾病状況

スクリーニング試験	集団 A		集団 B	
	疾病あり(人)	疾病なし(人)	疾病あり(人)	疾病なし(人)
陽性	25	50	250	50
陰性	5	450	50	450

6 ある食品会社は、食品成分 A に血糖値を下げる機能があるかを確認する研究を大学に委託し、機能性表示食品として販売することを企画した。人を対象とした研究を実施する上で、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 研究計画書の研究倫理審査は、この食品会社の役員会議で行われる。
- (2) 委託先の大学の研究者は、研究対象者に研究内容を説明し研究参加の同意を得る。
- (3) 研究計画は、販売しようとする食品の利潤最大化を最優先に作成する。
- (4) この委託研究に従事しない食品会社の社員は、研究の利益相反を開示する。
- (5) 委託先の大学の研究者は、売り上げ状況のモニタリング調査を行う。

7 生活習慣(ライフスタイル)の評価と対策に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 健康日本 21(第二次)の最終評価において、「運動習慣者の割合の増加」は「目標値に達した」と評価された。
- (2) 健康日本 21(第二次)の最終評価において、「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少」は「目標値に達した」と評価された。
- (3) 健康日本 21(第三次)では、休養・睡眠に関する指標として、具体的な睡眠時間は設定されていない。
- (4) 健康づくりのための睡眠ガイド 2023 では、高齢者の床上時間は8時間以上にならないことが目安とされている。
- (5) ブリンクマン指数は、「1日の喫煙本数」に「喫煙開始年齢」を乗じた値である。

8 「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 対象者を18歳未満、18～64歳、65歳以上で区切って、推奨事項が示されている。
- (2) 「座位行動」という概念が取り入れられた。
- (3) 「高齢者」の運動として、筋力トレーニングは推奨されていない。
- (4) 「高齢者」の身体活動として、強度は問わず、1日40分以上行うことが推奨されている。
- (5) 「身体を動かす時間が少ないこども」において推奨されている身体活動の強度は、5メッツ以上である。

9 歯科口腔保健および学校保健に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) フッ化物の歯面塗布の主な目的は、歯周病の予防である。
- (2) シーラントの主な目的は、歯周病の予防である。
- (3) 糖尿病は、歯周病のリスク因子である。
- (4) 直近5年間の学校保健統計調査によると、小学生におけるむし歯(う歯)の被患率は、増加傾向である。
- (5) 直近5年間の学校保健統計調査によると、中学生における被患率が最も高いのは、むし歯(う歯)である。

10 健康増進法に基づき市町村が行う、対策型がん検診に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 胃がん検診の対象年齢は、60歳以上である。
- (2) 子宮頸がん検診の対象年齢は、40歳以上である。
- (3) 乳がん検診の検査方法として、触診が推奨されている。
- (4) 大腸がん検診の検査方法として、内視鏡検査が推奨されている。
- (5) 肺がん検診の受診間隔は、1年に1回が推奨されている。

11 地球温暖化に伴い、流行地域の拡大が懸念されている感染症として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 麻疹
- (2) 風疹
- (3) ポリオ(急性灰白髄炎)
- (4) マラリア
- (5) B型肝炎

12 難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)における、難病の定義に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 発病の機構が明らかでない。
- (2) 治療方法が確立していない。
- (3) 希少な疾病である。
- (4) 致死率が高い。
- (5) 長期にわたり療養を必要とする。

13 わが国の社会保障制度を構成するもののうち、生活保護が該当するものとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 社会保険
- (2) 恩給
- (3) 公的扶助
- (4) 保健医療・公衆衛生
- (5) 社会福祉

14 市町村保健センターに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 市町村は、設置しなければならない。
- (2) センター長は、原則として医師でなければならない。
- (3) 食品衛生の監視を行う。
- (4) 住民の健康相談を担う。
- (5) 地域における健康危機管理の拠点となる。

15 特定健康診査・特定保健指導に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 根拠法は、健康増進法である。
- (2) 75歳以上の被保険者は、対象とならない。
- (3) 保険者は、降圧薬を服薬中の者を、特定保健指導の対象としなければならない。
- (4) 採血は、空腹時に限定されている。
- (5) 腹囲が90 cmで喫煙習慣がある50歳男性の場合、1つの追加リスクがあると動機付け支援の対象となる。

16 高齢者の介護に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 直近の国民生活基礎調査(大規模調査年)によると、要介護者となった原因として最も多いのは、年齢にかかわらず脳卒中である。
- (2) 介護保険制度における保険給付の財源は、全額が被保険者から徴収した保険料である。
- (3) 介護保険制度における予防給付サービスは、要介護者が対象である。
- (4) 介護老人保健施設では、医学的管理は行われない。
- (5) 地域包括支援センターの業務には、権利擁護に関する業務が含まれている。

17 人体を構成する細胞に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 血小板には、核が存在する。
- (2) 細胞外のナトリウムイオン濃度は、細胞内より低い。
- (3) 全ての細胞は、1つの受精卵から発生する。
- (4) 細胞周期のS期では、染色体が形成される。
- (5) マクロファージは、リンパ球から分化する。

18 アミノ酸・たんぱく質・糖質に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) アミノ酸は、両性化合物である。
- (2) たんぱく質の二次構造は、ジスルフィド結合により形成される。
- (3) たんぱく質は、プロテアソームにより折りたたまれる。
- (4) フルクトースは、アルデヒド基をもつ。
- (5) でんぷんは、 β -1,4 グリコシド結合をもつ。

19 生体エネルギー源と代謝に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) AMP は、分子内に高エネルギー結合をもつ。
- (2) ホスホエノールピルビン酸は、高エネルギー化合物である。
- (3) 電子伝達系は、ミトコンドリアの外膜にある。
- (4) 電子伝達系の電子受容体は、窒素分子である。
- (5) 脱共役たんぱく質(UCP)による熱産生は、ATP の合成を伴う。

20 アミノ酸・糖質・脂質の代謝に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ビタミン B₁ は、アミノ基転移反応の補酵素である。
- (2) 尿素回路は、腎臓に存在する。
- (3) セロトニン、トリプトファンから合成される。
- (4) 糖新生は、小胞体で行われる。
- (5) 脂肪酸の合成は、ミトコンドリアで行われる。

- 21 酸塩基平衡に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 過換気症候群では、呼吸性アシドーシスになる。
 - (2) COPD では、呼吸性アルカローシスになる。
 - (3) 大量の嘔吐では、代謝性アシドーシスになる。
 - (4) 原発性アルドステロン症では、代謝性アシドーシスになる。
 - (5) 腎不全では、代謝性アシドーシスになる。
- 22 加齢・疾患に伴う変化に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) テロメアは、細胞分裂を繰り返すと長くなる。
 - (2) 肉芽組織は、線維芽細胞に富んでいる。
 - (3) 良性腫瘍は、悪性腫瘍に比べて細胞の分化度が低い。
 - (4) 上皮性の悪性腫瘍は、肉腫と呼ばれる。
 - (5) 脳死では、自発呼吸がみられる。
- 23 臨床検査に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 動脈血ガス分析検査では、pH が測定される。
 - (2) ビリルビン は、血清たんぱく質である。
 - (3) 心電図の QRS 波は、心房の興奮を反映している。
 - (4) スパイロメトリは、経皮的酸素飽和度を調べる検査である。
 - (5) CT(コンピューター断層撮影)は、磁気を利用する検査である。
- 24 治療に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 発熱の患者に対する解熱鎮痛薬の投与は、原因療法である。
 - (2) 細菌性肺炎に対する抗菌薬の投与は、対症療法である。
 - (3) リハビリテーションは、根治療法である。
 - (4) 輸血療法は、血液浄化療法である。
 - (5) iPS 細胞(人工多能性幹細胞)の使用は、再生医療である。

- 25 脂質代謝に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) インスリンは、リポたんぱく質リパーゼ活性を低下させる。
 - (2) リポたんぱく質リパーゼの異常では、高キロミクロン血症をきたす。
 - (3) 家族性高コレステロール血症は、グルコース-6-ホスファターゼの欠損によって起こる。
 - (4) ネフローゼ症候群の診断基準では、脂質異常症が必須条件である。
 - (5) 著明な高コレステロール血症では、急性膵炎を起こす。
- 26 消化器系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 嚥下時には、軟口蓋が気管を塞ぐ。
 - (2) 内因子は、主細胞から分泌される。
 - (3) 胆汁は、総胆管を経て胆嚢に運ばれる。
 - (4) オッディ (Oddi) 括約筋が弛緩すると、胆汁が十二指腸に排出される。
 - (5) 大腸粘膜には、輪状ヒダがある。
- 27 肝疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) A 型肝炎は、血液感染が最も多い。
 - (2) B 型肝炎ウイルスは、RNA ウイルスである。
 - (3) 肝硬変では、プロトロンビン時間が短縮する。
 - (4) 肝硬変では、血中コリンエステラーゼ値が上昇する。
 - (5) NASH では、肝の線維化がみられる。
- 28 循環器系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 心臓血管中枢は、中脳にある。
 - (2) 肺動脈は、肺と左心房をつなぐ。
 - (3) 心室の収縮期では、僧帽弁は閉鎖する。
 - (4) 動脈は、内膜と外膜の2層からなる。
 - (5) 副交感神経の興奮により、心拍数は増加する。

29 循環器疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 心室細動では、心拍出量が増加する。
- (2) 深部静脈血栓症では、急性肺塞栓を起こす。
- (3) 右心不全では、肺うっ血がみられる。
- (4) 心不全では、血中BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)値が低下する。
- (5) 重度の貧血では、低心拍出性心不全がみられる。

30 腎・尿路系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 1個の腎臓には、約1万個のネフロンがある。
- (2) ヘンレ係蹄は、遠位尿細管と集合管との間に存在する。
- (3) 近位尿細管では、グルコースが再吸収される。
- (4) 健常成人の1日当たりの糸球体濾過量は、約1.5Lである。
- (5) 健常成人の尿比重は、1.100以上に調節されている。

31 A群 β 溶血性連鎖球菌感染を契機とする急性糸球体腎炎に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 高齢者に多い。
- (2) 感染後1～3日で発症する。
- (3) 高血圧を引き起こす。
- (4) 血清中の補体価は上昇する。
- (5) 半数以上は慢性化する。

32 甲状腺・副甲状腺の疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) バセドウ病では、血中LDLコレステロール値が上昇する。
- (2) バセドウ病では、血中甲状腺刺激ホルモン(TSH)値が上昇する。
- (3) 橋本病では、基礎代謝が亢進する。
- (4) 副甲状腺機能亢進症では、腎臓におけるカルシウム再吸収が抑制される。
- (5) 副甲状腺機能低下症では、テタニーが起こる。

- 33 パーキンソン病に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 主な責任病巣は側頭葉である。
 - (2) 脳内のドーパミンが増加している。
 - (3) まだら認知症がみられる。
 - (4) 四肢の筋肉は弛緩する。
 - (5) 便秘をきたす。
- 34 呼吸器系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 呼吸中枢は、大脳皮質に存在する。
 - (2) 気管支平滑筋は、副交感神経の興奮で弛緩する。
 - (3) 横隔膜は、吸気時に収縮する。
 - (4) 内呼吸は、肺胞で行われるガス交換である。
 - (5) 肺活量は、1回換気量と残気量の和である。
- 35 呼吸器疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) COPD に対する治療には、在宅酸素療法がある。
 - (2) 気管支喘息では、発作時に気道が拡張する。
 - (3) 肺結核に対する予防接種には、ツベルクリン反応がある。
 - (4) マイコプラズマ肺炎は、ウイルス性肺炎である。
 - (5) クリプトコッカス肺炎は、細菌性肺炎である。
- 36 平滑筋に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1) 細胞は円柱形である。
 - (2) 横紋が観察される。
 - (3) 介在板が観察される。
 - (4) 骨に付着する。
 - (5) 不随意筋である。

37 骨粗鬆症に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 男性に多い。
- (2) 類骨が増加する。
- (3) 脆弱性骨折がない時の診断基準は、骨密度が若年成人平均値(YAM)の60%未満である。
- (4) 小児に発症した骨粗鬆症をくる病という。
- (5) 糖質コルチコイド過剰により発症する。

38 妊娠糖尿病に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 50 g 経口ブドウ糖負荷試験で診断する。
- (2) 空腹時血糖値 150 mg/dL で HbA1c 6.5% の場合、妊娠糖尿病と診断できる。
- (3) 妊娠 20 週以降には、耐糖能は改善する。
- (4) 将来の2型糖尿病発症リスクである。
- (5) 経口血糖降下薬を使用する。

39 血液系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ヒトのヘモグロ빈は、2本のグロビンからなる二量体である。
- (2) ヘモグロビンと酸素の親和性は、ヘモグロビンと一酸化炭素の親和性よりも高い。
- (3) 還元ヘモグロビン濃度が上昇すると、チアノーゼが出現する。
- (4) エリスロポエチンは、白血球の成熟を促す。
- (5) プラスミンは、凝固因子である。

40 血液疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 鉄欠乏性貧血では、血清フェリチン値が上昇する。
- (2) 再生不良性貧血では、骨髄の過形成がみられる。
- (3) 溶血性貧血では、血中の網赤血球が減少する。
- (4) 血友病 A は、第Ⅸ因子の異常である。
- (5) 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)では、抗血小板抗体が認められる。

41 関節リウマチに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 発症のピーク年齢は、60 歳以上である。
- (2) 男性に多い。
- (3) 滑膜の炎症が生じる。
- (4) 関節炎症状は、片側の関節に好発する。
- (5) 自己抗体は、陰性である。

42 感染症に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 日和見感染とは、感染しても症状が現れない場合をいう。
- (2) ブドウ球菌は、グラム陰性菌である。
- (3) 帯状疱疹の病原体は、単純ヘルペスウイルスである。
- (4) 劇症型溶連菌感染症は、再興感染症である。
- (5) 発疹チフスの病原体は、クラミジアである。

43 野菜類に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) なす果皮のナスニンは、カロテノイド色素である。
- (2) とうがらしの辛み成分は、イソチオシアネートである。
- (3) ほうれんそうのあく成分は、ホモゲンチジン酸である。
- (4) ブロッコリー(花序・ゆで)の可食部 100 g 当たりのビタミン C 含量は、だいこん(根・皮なし・生)より多い。
- (5) にんじん(根・皮なし・生)の可食部 100 g 当たりのカルシウム含量は、こまつな(葉・生)より多い。

44 きのご類に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 干しいたけの香りの主成分は、ヌートカトンである。
- (2) まつたけの香りの主成分は、ノナジエノールである。
- (3) きくらげは、7-デヒドロコレステロールを含む。
- (4) 傘が7割程度開いた肉厚の干しいたけを、どんこ(冬菇)という。
- (5) トリュフは、コナラなどの原木で栽培される。

45 肉類に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。


- (1) と畜後、グリコーゲンが嫌氣的に分解されることで、pHが上昇する。
- (2) 鶏肉の0～4℃における最大死後硬直期までの時間は、牛肉より長い。
- (3) と畜後、アクトミオシンが形成されると、肉質は軟化する。
- (4) 熟成中にATPが増加することで、うま味が増す。
- (5) メトミオグロビンにおけるヘム中の鉄イオンは、3価である。

46 油脂類に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。


- (1) サフラワー油は、ヒマワリの種子を原料として製造される。
- (2) バターのリノール酸含量は、とうもろこし油より多い。
- (3) えごま油の α -リノレン酸含量は、ごま油より多い。
- (4) カカオ脂のヨウ素価は、オリーブ油より大きい。
- (5) 米ぬか油のけん化価は、パーム油より大きい。

47 精白米の第一制限アミノ酸は、塩基性であり、アミノカルボニル反応が生じやすい。このアミノ酸の構造式として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。


(1)




(2)




(3)



(4)



(5)



48 食品の機能性成分には、消化管内で作用する機能(消化管内)と、吸収後に標的組織で作用する機能(標的組織)とがある。食品成分の三次機能と作用する場所の組合せとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) サーデンペプチドによる血圧の低下 ————— 消化管内
- (2) 大豆イソフラボンによる骨の健康維持 ————— 消化管内
- (3) 難消化性デキストリンによる血糖値上昇の抑制 ————— 標的組織
- (4) EPA による血中中性脂肪の減少 ————— 標的組織
- (5) CPP(カゼインホスホペプチド)によるカルシウムの吸収促進 ——— 標的組織

49 特定保健用食品の関与成分による三次機能と作用機序の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) キシリトールの低う蝕作用 ——— 再石灰化の促進
- (2) 難消化性オリゴ糖の整腸作用 ——— プロバイオティクスとしての作用
- (3) 中鎖脂肪酸の体脂肪低蓄積性 ——— 脂肪組織での β 酸化関連酵素の活性化
- (4) キトサンの血中コレステロール低下作用 ——— 胆汁酸の再吸収抑制
- (5) γ -アミノ酪酸(GABA)の降圧作用 ——— アンジオテンシン変換酵素の阻害

50 食品の変質に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 食品中の生菌数が 10^3 個/gを超えると、初期腐敗と判定される。
- (2) トリメチルアミンは、肉類における初期腐敗の指標である。
- (3) ヘテロサイクリックアミンは、非酵素的褐変により生成する。
- (4) 油脂の自動酸化は、不飽和脂肪酸から水素原子が脱離することで開始する。
- (5) K 値は、ATP 関連化合物の酵素的分解が進むと低下する。

51 自然毒食中毒に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) テトロドトキシンは、煮沸処理により無毒化される。
- (2) トリカブトによる食中毒の原因物質は、リコリンである。
- (3) ジャガイモによる食中毒の原因物質は、リナマリンである。
- (4) イヌサフランによる食中毒の原因物質は、イルジン S である。
- (5) シガテラ中毒の主症状は、ドライアイスセンセーションである。

52 細菌性食中毒及びウイルス性食中毒に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) カンピロバクターによる食中毒の潜伏期間は、12 時間程度である。
- (2) 腸管出血性大腸菌は、芽胞を形成する。
- (3) 黄色ブドウ球菌の毒素は、煮沸処理では無毒化されない。
- (4) リステリア属菌による食中毒の主症状は、神経麻痺である。
- (5) ノロウイルスは、ヒトを介した二次感染はない。

53 細菌性食中毒の原因菌の学名と主な原因食品の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) *Campylobacter jejuni* ————— 魚介類
- (2) *Clostridium perfringens* ————— カレーライス
- (3) *Salmonella enterica* serovar Enteritidis ——— 二枚貝
- (4) *Staphylococcus aureus* ————— はちみつ
- (5) *Vibrio parahaemolyticus* ————— 鶏卵

54 食品中の有害物質に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) アフラトキシン M1 は、主に落花生から検出される。
- (2) パツリンは、主に米から検出される。
- (3) ベンゾ[a]ピレンは、主に果物から検出される。
- (4) 異常プリオンは、牛の扁桃に蓄積しやすい。
- (5) セシウム 137 は、主に骨に沈着する。

55 食品添加物に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 無毒性量は、ヒトへの試験をもとに設定される。
- (2) 亜硝酸ナトリウムは、着色料として使用される。
- (3) ソルビン酸カリウムは、酸化防止剤として使用される。
- (4) オルトフェニルフェノールは、防かび剤として使用される。
- (5) 甘味料は、一括名での表示が可能である。

56 栄養成分とその分析方法の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) たんぱく質 ————— カールフィッシャー法
- (2) 脂質 ————— 原子吸光光度法
- (3) 炭水化物 ————— ジエチルエーテルによるソックスレー抽出法
- (4) 食物繊維 ————— プロスキー法
- (5) ナトリウム ————— ケルダール法

57 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 脂質は、補給ができる旨の表示に関する基準値がある。
- (2) 不飽和脂肪酸の量は、表示が推奨されている。
- (3) 食塩を使用していない場合は、ナトリウムの含有量にかかわらず食塩相当量を「0」と表示できる。
- (4) 「甘さひかえめ」は、糖類が低減された旨の表示ではない。
- (5) 大豆を原材料に含む場合は、アレルゲンとしての表示が義務づけられている。

58 栄養機能食品として表示が認められているビタミンと栄養機能表示の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ビタミン B₁ —— 腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。
- (2) ビタミン C —— 抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。
- (3) ビタミン D —— 炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
- (4) ビタミン E —— 皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。
- (5) ビタミン K —— 正常な血液凝固能を維持する栄養素です。

59 機能性表示食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 授乳婦用に開発された加工食品は、対象に含まれる。
- (2) サプリメント形状の加工食品は、対象に含まれる。
- (3) 安全性および機能性の根拠に関する情報は、消費者庁のウェブサイトで確認することができる。
- (4) 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談する。
- (5) 容器包装に、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

60 食品の加工法に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ブランチングは、紅茶製造における茶葉の発酵に用いられる。
- (2) 電気透析は、食塩の製造に用いられる。
- (3) 噴霧乾燥は、するめの製造に用いられる。
- (4) 逆浸透は、ビール製造における酵母の除去に用いられる。
- (5) 水素添加は、バター製造に用いられる。

61 牛乳および牛乳加工品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 牛乳製造におけるホモジナイズとは、カゼインミセルの大きさを均質化することである。
- (2) バター製造におけるチャーニングとは、牛乳やクリームから分離した脂肪を練り上げることである。
- (3) チーズ製造におけるカードとは、原料乳にレンネットを加えた際に生じる凝固物のことをいう。
- (4) アイスcream類の1つであるラクトアイスは、乳固形成分が15.0%以上と規定されている。
- (5) 発酵乳であるヨーグルトは、主に β -ラクトグロブリンが等電点沈殿したものである。

62 食品とその製造に利用される酵素の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 水あめ ————— インベルターゼ
- (2) カップリングシュガー ———— カタラーゼ
- (3) 果糖ぶどう糖液糖 ————— グルコースイソメラーゼ
- (4) 食用油脂 ————— トランスグルタミナーゼ
- (5) 成型肉 ————— ペクチナーゼ

63 食品の保存に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 質量パーセント濃度が同一であれば、ショ糖より食塩の方が浸透圧を高める効果が高い。
- (2) レトルト食品の殺菌は、65℃で30分以上行う。
- (3) 水分活性0.9以上において、ほとんどの微生物の増殖は抑制される。
- (4) 無機酸の微生物増殖抑制効果は、有機酸より優れている。
- (5) チルドとは、食品を半凍結状態で貯蔵することである。

64 植物性食品の加熱調理とその目的の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 山菜を重曹水でゆでる。 ————— 軟化の抑制
- (2) れんこんを酢水でゆでる。 ————— 軟化の促進
- (3) 黒豆を鉄なべで煮る。 ————— 色の安定化
- (4) さつまいもをミョウバン入りの水でゆでる。 ——— 軟化の促進
- (5) カリフラワーを酢水でゆでる。 ————— あく抜き

65 揚げ物の調理に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 揚げ物に用いる油の比熱は、水の約2倍である。
- (2) 150℃程度の揚げ油では、天ぷら衣はすぐに浮き広がる。
- (3) 魚介の天ぷらの揚げ油の適温は、ドーナッツよりも高い。
- (4) フライドポテトの揚げ油の適温は、200℃程度である。
- (5) ポテトチップスの吸油率は、かき揚げよりも高い。

66 オレンジピーマン(果実・生)可食部100g当たりのビタミンA量を表に示した。

レチノール活性当量(μgRAE)として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 35
- (2) 48
- (3) 53
- (4) 59
- (5) 72

表 オレンジピーマン(果実・生)可食部100g当たりのビタミンA量(μg)

レチノール	α -カロテン	β -カロテン	β -クリプトキサンチン
—	150	420	290

日本食品標準成分表 2020 年版(八訂)からの抜粋

67 なす 200 g から先端とへたを取り除き(廃棄率 10%)、なす重量の 5 % のなたね油を用いて油いためを作った。表は、可食部 100 g 当たりのエネルギー値および調理による重量変化率である。この油いためのエネルギー量(kcal)として、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 100
- (2) 105
- (3) 112
- (4) 131
- (5) 180

表 可食部 100 g 当たりのエネルギー値および調理による重量変化率

			エネルギー(kcal)	重量変化率(%)
なす	果実	生	18	—
なす	果実	油いため	73	76
なたね油			887	—

日本食品標準成分表 2020 年版(八訂)からの抜粋

68 食欲の調節に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 空腹感は、出生後の食経験によって形成される。
- (2) 脂肪細胞におけるトリグリセリド分解が亢進すると、満腹感が生じる。
- (3) 満腹中枢は、動脈と静脈の血中グルコース濃度の差が大きいと刺激される。
- (4) レプチンは、主に胃から分泌される。
- (5) グレリンは、食欲を抑制する。

69 管腔内消化の調節に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 腸相は、胃に食物が入ることによって起こる応答である。
- (2) 交感神経は、消化液の分泌を促進する。
- (3) 副交感神経は、消化管の運動を抑制する。
- (4) ガストリンは、胃酸分泌を抑制する。
- (5) コレシストキニンは、胆嚢の収縮を促進する。

70 栄養素の吸収に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) フルクトースは、 Na^+ の濃度勾配を利用して吸収される。
- (2) ラクトースを構成する単糖は、SGLT 1 により吸収される。
- (3) アミノ酸は、 H^+ の濃度勾配を利用して吸収される。
- (4) 短鎖脂肪酸は、主にミセルを形成して吸収される。
- (5) コレステロールの吸収は、胆汁酸を必要としない。

71 インスリンの作用に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 食欲を促進する。
- (2) GLUT 4 の細胞膜への移行を促進する。
- (3) グリコーゲンの分解を促進する。
- (4) 糖新生を促進する。
- (5) 体たんぱく質の分解を促進する。

72 空腹時と比べたときの食後の糖質代謝に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 骨格筋への血中グルコースの取り込みが抑制される。
- (2) 肝臓グリコーゲンの合成が抑制される。
- (3) グルコースからの脂肪酸の合成が亢進する。
- (4) 乳酸からのグルコースの合成が亢進する。
- (5) アラニンからのグルコースの合成が亢進する。

73 空腹時と比べたときの食後の脂質代謝に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 小腸上皮細胞でキロミクロンの合成が抑制される。
- (2) 末梢血管でリポたんぱく質リパーゼの活性が抑制される。
- (3) 骨格筋で β 酸化が亢進する。
- (4) 脳でケトン体の利用が亢進する。
- (5) 血中への遊離脂肪酸の放出が抑制される。

74 脂肪酸および脂肪酸由来の生理活性物質に関する記述である。

誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) オレイン酸は、一価不飽和脂肪酸である。
- (2) α -リノレン酸は、生体内で合成されない。
- (3) EPA は、リノール酸から合成される。
- (4) アラキドン酸は、エイコサノイドの前駆体である。
- (5) プロスタグランジンは、エイコサノイドの一種である。

75 たんぱく質・アミノ酸の体内代謝に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) たんぱく質の摂取量が不足すると、窒素出納が正になる。
- (2) たんぱく質の摂取量が不足すると、ビタミン B₆ の必要量が増加する。
- (3) たんぱく質の摂取量が増加すると、尿中尿素量が減少する。
- (4) たんぱく質を過剰に摂取すると、アミノ酸の異化が抑制される。
- (5) エネルギー摂取量が不足すると、たんぱく質の必要量が増加する。

76 ビタミンDの栄養学的特徴と機能に関する記述である。

誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) ビタミンD₂は、7-デヒドロコlesteroールから合成される。
- (2) ビタミンDは、水酸化されることにより活性型となる。
- (3) ビタミンDは、腎臓で活性型に至る。
- (4) 活性型ビタミンDは、核内受容体と結合する。
- (5) 活性型ビタミンDは、カルシウム結合たんぱく質の合成を促進する。

77 ビタミンB群とその補酵素型の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ビタミンB₁ ———— ピリドキサルリン酸(PLP)
- (2) ビタミンB₂ ———— フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)
- (3) ビタミンB₆ ———— チアミンニリン酸(TDP)
- (4) ビオチン ———— コエンザイムA(CoA)
- (5) 葉酸 ———— メチルコバラミン

78 ミネラルとそれを構成成分とする酵素の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 鉄 ———— セルロプラスミン
- (2) 亜鉛 ———— キサンチンオキシダーゼ
- (3) 銅 ———— カタラーゼ
- (4) セレン ———— グルタチオンペルオキシダーゼ
- (5) モリブデン ———— スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)

79 鉄の吸収と体内利用に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 鉄の吸収は、体内鉄貯蔵量の影響を受けない。
- (2) 非ヘム鉄は、Fe³⁺として吸収される。
- (3) トランスフェリンは、鉄の血中輸送を行う。
- (4) 貯蔵鉄は、主にヘモグロビンとして蓄えられる。
- (5) 赤血球の破壊で遊離した鉄は、再利用されない。

80 水の出納に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 栄養素 1 g 当たりの代謝水の量は、たんぱく質より脂質が多い。
- (2) 水分摂取量が増加すると、不可避尿量は増加する。
- (3) 水分摂取量が不足すると、バソプレシンの分泌は減少する。
- (4) 発汗では、ナトリウムの損失がない。
- (5) 不感蒸泄量は、外気温の影響を受けない。

81 35 歳、女性。身長 158 cm、体重 50 kg、BMI 20.0 kg/m^2 。基礎代謝基準値 22.0 kcal/kg 体重/日、安静時代謝量は基礎代謝量の 1.1 倍。5.0 メッツの活動を 2 時間行った。その 2 時間の総エネルギー消費量(kcal)として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 242
- (2) 417
- (3) 458
- (4) 504
- (5) 726

82 栄養アセスメントに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 上腕筋面積は、肩甲骨下部皮下脂肪厚と上腕周囲長から求める。
- (2) 体脂肪率は、水中体重秤量法により推定できる。
- (3) ウエスト周囲長は、息を吸った状態で測定する。
- (4) 尿中クレアチニン排泄量は、測定前に摂取した食事たんぱく質の影響を受ける。
- (5) 生体電気インピーダンス(BIA)法は、測定前に摂取した食事の影響を受けない。

83 日本人の食事摂取基準(2020年版)における基本的事項に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) DGの設定で対象とした生活習慣病の1つに、COPDがある。
- (2) DGには、エビデンスレベルが付されている。
- (3) 単糖は、AIが設定されている。
- (4) 参照体位は、性・年齢区分別の望ましい体位である。
- (5) 習慣的な摂取を把握するための期間は、3日間程度とされている。

84 日本人の食事摂取基準(2020年版)におけるエネルギーに関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 成人の身体活動レベルの算出には、二重標識水法による総エネルギー消費量測定値が用いられた。
- (2) 小児におけるエネルギー摂取量の過不足の評価は、BMIで行う。
- (3) 目標とするBMIの範囲は、40歳と75歳で同じである。
- (4) 成人の推定エネルギー必要量(EER)の算定式は、安静時代謝量(kcal/日)×身体活動レベルである。
- (5) 推定エネルギー必要量(EER)は、高齢者施設の自立した入所者には適用できない。

85 日本人の食事摂取基準(2020年版)におけるビタミン・ミネラルに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ビタミンAのULは、成人と乳児とで回避対象としている健康障害が異なる。
- (2) ビタミンEのAIは、血中のγ-トコフェロール濃度から算定された。
- (3) ビタミンB₁のEARは、たんぱく質1g当たりの必要量から算定された。
- (4) ナトリウムのDGは、24時間尿中ナトリウム排泄量から算定された。
- (5) 鉄の妊娠後期のEAR付加量は、妊娠初期と同じ鉄吸収率を基に算定された。

86 日本人の食事摂取基準(2020年版)において、生活習慣病の重症化予防を目的とした量を設定した栄養素である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) たんぱく質
- (2) 飽和脂肪酸
- (3) トランス脂肪酸
- (4) ナトリウム
- (5) カリウム

87 妊娠期の母体の生理的变化に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 循環血液量は、減少する。
- (2) 基礎代謝は、低下する。
- (3) たんぱく質の同化は、抑制される。
- (4) 血清総コレステロール値は、低下する。
- (5) インスリン感受性は、低下する。

88 日本人の食事摂取基準(2020年版)における授乳婦の推定エネルギー必要量(kcal/日)の求め方である。妊娠前の推定エネルギー必要量(kcal/日)をA、母乳のエネルギー量(kcal/日)をB、体重減少分のエネルギー量(kcal/日)をCとした算出式として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) A
- (2) $A + B$
- (3) $A + C$
- (4) $A + B + C$
- (5) $A + B - C$

89 新生児期・乳児期の生理的特徴に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 乳児の体重に対する細胞外液量の割合は、成人と比べて低い。
- (2) 生理的体重減少は、生後1か月頃に出現する。
- (3) 唾液中のアミラーゼ活性は、離乳食の開始により低下する。
- (4) 吸啜反応は、頬や口唇に触れた刺激に対して、その方向に顔を向け口を開く反射である。
- (5) 新生児の最大尿濃縮能は、成人と比べて低い。

90 新生児期・乳児期の栄養ケア・マネジメントに関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 母乳性黄疸では、母乳を中止しなければならない。
- (2) 鉄欠乏性貧血は、乳児期の後期(離乳期)に起こりやすい。
- (3) 乳糖不耐症のある乳児には、母乳を与える。
- (4) はちみつは、生後9か月から与えても良い。
- (5) 食物アレルギーの発症予防のためには、離乳期における特定の食物の摂取開始を遅らせる。

91 幼児期・学童期・思春期に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 基礎代謝基準値(kcal/kg 体重/日)は、思春期より幼児期の方が高い。
- (2) 乳幼児身体発育曲線における1歳6か月児の身長は、立位で測定された値に基づく。
- (3) 乳歯は、2歳までに生えそろう。
- (4) 神経性やせ症では、頻脈がみられる。
- (5) 起立性調節障害では、起立により血圧が上昇する。

92 更年期の女性において、増加または上昇するものである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 血中プロゲステロン値
- (2) 血中エストロゲン値
- (3) 血中 LDL コレステロール値
- (4) 血管内皮細胞での一酸化窒素の合成
- (5) 骨密度

93 45 歳、男性。身長 170 cm、体重 66.5 kg、BMI 23.0 kg/m²。表は、1 週間の平均的な身体活動をまとめたものである。「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」で推奨されている身体活動量(23 メッツ・時/週)の達成に向けた取組に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 達成しているため、追加すべき身体活動はない。
- (2) 立位での食事の支度(2.0 メッツ)30 分を、週 7 回追加する。
- (3) 犬の散歩(3.0 メッツ)30 分を、週 4 回追加する。
- (4) ランニング(6.0 メッツ)15 分を、週 3 回追加する。
- (5) 腕立て伏せ(8.0 メッツ)6 分を、週 2 回追加する。

表 対象者の 1 週間の身体活動状況

	強度(メッツ)	時間(分)	頻度(日/週)
自転車(通勤)	4.0	15	5
デスクワーク(座位)	1.3	300	5
打ち合わせ、会話、電話	1.5	120	5
食事	1.5	60	7
身支度	2.0	20	7
スクワット	5.0	6	4
子どもの世話	3.0	30	7

94 嚥下機能を評価するためのスクリーニング法である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) Functional Independence Measure (FIM)
- (2) Fall Risk Index (FRI)
- (3) Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI)
- (4) Mini-Mental State Examination (MMSE)
- (5) Repetitive Saliva Swallowing Test (RSST)

95 体力評価における測定項目と評価内容の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 長座体前屈 ————— 敏捷性
- (2) 20 m シャトルラン ————— 平衡性
- (3) 握力 ————— 巧緻性
- (4) 閉眼片足立ち時間 ————— 柔軟性
- (5) 上体起こし ————— 筋持久力

96 25歳、男性、バスケットボール選手。身長 170 cm、体重 70 kg、BMI 24.2 kg/m²。

筋肉量の増加を目的に、通常の練習に加え筋力トレーニングを行っている。エネルギー目標量を 3,200 kcal/日に設定した。1日当たりのたんぱく質摂取量(g)として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 70
- (2) 120
- (3) 180
- (4) 240

97 汎(全身)適応症候群に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 警告反応期のショック相では、血圧が低下する。
- (2) 警告反応期の反ショック相では、血糖値が低下する。
- (3) 抵抗期では、基礎代謝が低下する。
- (4) 疲はい期では、副腎皮質の機能が亢進する。
- (5) 疲はい期では、体温が上昇する。



39

午後の部

試験問題	試験時間
98～200	13時40分～16時20分

● 指示があるまで開かないこと。

《注意事項》

1. 問題の数

試験問題は 98～200 までの 103 問である。

2. 受験地、受験番号、氏名の記入方法

注意事項を読み終わったら、まず受験地、受験番号、氏名を文字と数字で記入する。次に答案用紙右側の受験地、受験番号の該当する○をマークする(塗りつぶす)。なお、記入に当たっては次の例を参考のこと。

(例) 受験地・東京都、受験番号・90123、氏名・栄養花子の場合

午後

受験地	東京都	受験番号	90123
氏名	栄養花子		

受験地	北海道	宮城県	埼玉県	東京都	愛知県	大阪府	岡山県	福岡県	沖縄県
	○	○	○	●	○	○	○	○	○
受験番号	万	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	千	●	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	百	①	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	拾	①	②	●	③	④	⑤	⑥	⑦
	巻	①	②	③	●	④	⑤	⑥	⑦

3. 答案の作成

- (1) HBの鉛筆を使用し濃くマークすること、○の外にはみ出さないように注意すること。

良い解答の例…… ● (濃くマークすること。)

悪い解答の例…… 
(解答にならない。)

- (2) 答えを修正した場合は、必ず「消しゴム」であとが残らないように完全に消すこと。鉛筆の色が残ったり  のような消し方などをしたりした場合は、修正したことにはならないので注意すること。
- (3) 答案用紙は折り曲げたりメモ等で汚したりしないよう特に注意すること。

4. 解答方法

解答方法は次のとおりである。

- (1) (例 1-1) の問題では(1)から(5)までの 5 つの選択肢があるので、そのうち質問に対する答えを 1 つ選び、答案用紙にマークすること。なお、この質問に 2 つ以上マークした場合は誤りとする。

(例 1-1)

201 管理栄養士の名称を用いて業務を開始できる日として、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 管理栄養士国家試験の合格発表日
- (2) 管理栄養士国家試験の合格証書受領日
- (3) 管理栄養士免許の申請日
- (4) 管理栄養士名簿の登録日
- (5) 管理栄養士免許証の受領日

正解は「(4)」であるから答案用紙の問題番号 201 の④をマークする。

201	①	②	③	④	⑤
↓					
201	①	②	③	●	⑤

また、(例 1-2) のような設問文の場合も、(1)から(5)までの 5 つの選択肢から答えを 1 つ選び、答案用紙にマークすること。なお、これらの質問に 2 つ以上マークした場合は誤りとする。

(例 1-2) ……誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- (2) (例 2)の問題では(1)から(4)までの4つの選択肢があるので、そのうち質問に対する答えとして最も適切なものを1つ選び、答案用紙にマークすること。なお、(例 2)の質問に2つ以上マークした場合は誤りとする。

(例 2)

202 管理栄養士に求められる専門職としてのあり方に関する記述である。**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 自らの幸福を追求する。
- (2) 人々の生活の質の向上を目指す。
- (3) 特定の関係者との協働を重視する。
- (4) 管理栄養士免許取得時の知識を維持する。

正解は「(2)」であるから答案用紙の問題番号202の②をマークする。

202	①	②	③	④
↓				
202	①	●	③	④

98 女性の健康週間に、アルコールに起因する健康問題とその予防に関する情報を、一般成人向けのウェブサイトで発信することになった。発信する情報と、関連するヘルスビリーフモデルの「認知」の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 男性よりも少ない飲酒量で健康問題が生じる事実 —— 罹患性の認知
- (2) 飲酒以外のストレス発散方法 —— 重大性の認知
- (3) おいしいノンアルコール飲料の種類 —— 利益の認知
- (4) 節酒で体調が改善した女性の体験談 —— 障害の認知
- (5) 生活習慣病のリスクを高める飲酒量を超えた場合の健康問題 —— 自己効力感の認知

99 「趣味のスイーツ食べ歩きと SNS 発信は、フォロワーのためにもやめられない。」と話す、高度肥満の女性タレントである。体重が増え続けていることを気にして、栄養カウンセリングを受けることにした。計画的行動理論における、主観的規範を高める声かけとして、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) スイーツの食べ歩きをやめよう、と思ったことはありませんか。
- (2) やめてしまうのではなく、食べ歩きの回数を減らしてみませんか。
- (3) あなたの健康状態を心配する、フォロワーからのコメントはありませんか。
- (4) ヘルシーなスイーツをたくさん紹介して、新たなフォロワー獲得につなげませんか。

100 K 中学校に勤務する栄養教諭である。養護教諭より、オンラインゲームを始めてから急に体重が増えた生徒への個別相談を依頼された。行動変容の準備性を確認するための、生徒への質問として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 体重が増えたことについて、ご家族から何か言われていますか。
- (2) これまでの体重のグラフを見て、どのように思いますか。
- (3) ゲーム中に、どのようなものを飲食することが多いですか。
- (4) 時間を決めてゲームをするようにしてはどうですか。

101 減量が必要な女性に対し、動機づけ面接を用いたカウンセリングを行った。アンビバレンスを示す女性の発言として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 飲み会に誘われると嬉しいですし、付き合いもあるので断るのは難しいです。
- (2) 家族に協力してもらいながら食事制限に取り組んで、体重を減らしたいと思います。
- (3) 食事制限はストレスがたまるので、暴飲暴食してしまうかもしれません。
- (4) お菓子の量を減らした方が良いと思いますが、お菓子が好きなので我慢するのは難しいです。
- (5) お菓子作りは一番の趣味なので、やめられないです。

102 地域在住の高齢女性に、個別の栄養カウンセリングを行い、フレイル予防のための目標を話し合った。行動契約の目標宣言として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) たんぱく質を多く含む食品の摂取量を増やす。
- (2) 間食で牛乳や乳製品を摂るように心がける。
- (3) 今よりも体重が低下しないようにする。
- (4) 肉と魚を両方とも1日1回以上食べる。

103 K社では、社員の多くが食塩を過剰に摂取しており、健康への関心が薄い。そこで、社員食堂で減塩を目指し、ナッジを活用した取組を実施することにした。効果が見込める取組内容として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 社員の食塩摂取状況を、社員食堂の入口でデジタルサイネージに表示する。
- (2) 全てのメニューの食塩相当量を、社員食堂の食券販売機に掲示する。
- (3) 食塩を多く含むメニューを、提供しないようにする。
- (4) 減塩をアピールせずに、減塩メニューに魅力的な名称をつけて販売する。

104 ストレスマネジメントには、問題焦点コーピングと情動焦点コーピングがある。

毎日の離乳食作りが負担になっている母親のストレスマネジメントである。母親の行動とコーピングの組合せとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 友人に、離乳食作りの苦勞について話を聞いて _____ 問題焦点コーピング
もらう。
- (2) 離乳食作りは一生続くわけではないと自分に言 _____ 問題焦点コーピング
い聞かせる。
- (3) 夫婦で、離乳食作りの分担について話し合う。 _____ 問題焦点コーピング
- (4) 負担を感じたときに利用できる市販の離乳食を _____ 情動焦点コーピング
常備する。
- (5) 離乳食作りの動画を視聴して、負担軽減の方法 _____ 情動焦点コーピング
を考える。

105 K 大学では一人暮らしの1年生に対して、5月の連休明けに、自宅での食事作りをサポートすることになった。参加者のグループダイナミクスが期待できる取組として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 自宅で食事を作るようになった先輩の話を聞かせた上で、各自の感想をオンラインフォームに入力してもらう。
- (2) 各自で、自宅での食事作りの目標を設定してもらう。
- (3) 食事作りの悩みや苦勞していることについて、グループに分かれて話し合ってもらう。
- (4) グループに分かれて、インターネットで簡単そうなレシピを探してもらう。

106 若い世代の魚離れが進んでいる漁港のある町で、子育て中の保護者を対象に魚食推進の食育プログラムを計画した。プリシード・プロシードモデルの項目とアセスメント内容の組合せとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 行動とライフスタイル ———— 漁港から魚類を安価で入手できる方法を知っている者の割合
- (2) 環境 ———— 家庭で魚料理を作る頻度
- (3) 準備要因 ———— 魚の調理を面倒と思わない者の割合
- (4) 強化要因 ———— 地域のスーパーマーケットにおける魚類の販売状況
- (5) 実現要因 ———— 地場産の魚類の名前を知っている者の割合

107 健康教育において、目標設定を行うために SMART の法則を用いた。SMART を構成する5つの項目である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) Specific
- (2) Measurable
- (3) Achievable
- (4) Representative
- (5) Time-bound

108 正常高値血圧の人を対象とした教室を開催することになり、栄養教育の目標を設定した。目標の内容と種類の組合せとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 減塩調味料を常備している家庭の割合を、60%以上に増やす。 _____ 実施目標
- (2) 食塩摂取量の目標が6g/日未満であることを知っている人の割合を、70%以上に増やす。 _____ 学習目標
- (3) 減塩メニューがある飲食店を利用する人の割合を、50%以上に増やす。 _____ 環境目標
- (4) 教室に最後まで参加した人の割合を、70%以上にする。 _____ 結果目標
- (5) 半年後に参加者の収縮期血圧の平均値を、3mmHg下げる。 _____ 行動目標

109 K女子高校で「やせ」をテーマとした食育を、全校生徒を対象に実施することになった。効果的な実施方法として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 養護教諭が、過度なダイエット行動の危険性について動画を作成し、視聴を勧める。
- (2) 教育委員会の栄養教諭が、簡易な食事記録用紙を作成し、生徒に配布する。
- (3) 家庭科クラブの生徒が、家庭科教員のレクチャーを含めたワークショップを企画し実施する。
- (4) 生徒会が、やせ防止に関するポスターコンテストを開催し、入賞作品を食堂に掲示する。

110 地域在住高齢者を対象に、フレイル予防の食事講座を5回シリーズで開催した。

事業に対する評価の内容と種類の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 講座終了後に参加者同士のグループが形成され、仲が深まったと感じている者の割合 _____ 企画評価
- (2) 講座で使用した教材は分かりやすかったと回答した者の割合 _____ 経過評価
- (3) 講座終了後に食品摂取の多様性得点が改善した者の割合 _____ 形成的評価
- (4) 講座の参加費が適正であると回答した者の割合 _____ 経済評価
- (5) フレイル予防には食事が大切であると理解できた者の割合 _____ 結果評価

111 診療報酬における加算および指導料と、その算定の規定に関する組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 個別栄養食事管理加算 _____ 感染対策チームに管理栄養士が参画している。
- (2) 栄養サポートチーム加算 _____ 栄養治療実施計画を作成する。
- (3) 入院栄養食事指導料 _____ 入院中3回まで算定できる。
- (4) 集団栄養食事指導料 _____ 1回の指導時間は20分とする。
- (5) 早期栄養介入管理加算 _____ 回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者を対象とする。

112 臨床栄養における行為とそれに対応する用語の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 患者が治療に積極的に参加する。 ———— クリニカルパス
- (2) 栄養食事指導前に患者の氏名を確認する。 ———— 守秘義務
- (3) 患者の低栄養の重症度を判定する。 ———— リスクマネジメント
- (4) 栄養介入の内容を患者に説明し、同意を得る。 ———— インフォームド・コンセント
- (5) 患者が医師の指示に従い治療を受ける。 ———— ノーマリゼーション

113 骨格筋量をアセスメントするための指標である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 腹囲
- (2) 下腿周囲長
- (3) フィッシャー比
- (4) 尿中ナトリウム排泄量
- (5) 呼吸商

114 傷病者のエネルギー必要量に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ハリス - ベネディクト (Harris-Benedict) の式で算出された値は、推定エネルギー必要量である。
- (2) ハリス - ベネディクト (Harris-Benedict) の式には、体表面積を用いる。
- (3) 脳梗塞により意識障害をきたした患者のエネルギー必要量は、基礎代謝量の1.5倍とする。
- (4) 安静時エネルギー消費量は、間接熱量計で測定できる。
- (5) 重症熱傷患者では、NPC/N を健常時より高くする。

115 静脈栄養法に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 末梢静脈栄養では、2,500 kcal/日の投与ができる。
- (2) 末梢静脈栄養では、浸透圧比(血漿浸透圧との比)を5とする。
- (3) 脂肪は、1.5 g/kg/時の速度で投与する。
- (4) 中心静脈栄養では、糖質濃度 20% の維持液の使用が可能である。
- (5) 中心静脈栄養は、経腸栄養に比べてバクテリアルトランスロケーションを起こしにくい。

116 77 歳、男性。身長 160 cm、体重 45 kg、BMI 17.6 kg/m²。ここ 1 か月ほど、ほとんど食事を摂れていなかった。3 か月前の体重 55 kg。血液検査結果は、尿素窒素 10 mg/dL、クレアチニン 0.8 mg/dL。この患者が近医に入院し、1 日当たりエネルギー 1,500 kcal、アミノ酸 45 g、脂肪 20 g の静脈栄養が、入院初日から開始された。投与 2 日後、意識障害に陥り、K 病院に転院した。転院時の血液検査結果として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) カリウム値の上昇
- (2) マグネシウム値の上昇
- (3) ビタミン B₁ 値の上昇
- (4) リン値の低下
- (5) インスリン値の低下

117 食品が医薬品に及ぼす影響に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 牛乳は、ビスホスホネート薬の効果を減弱する。
- (2) グレープフルーツジュースは、カルシウム拮抗薬の効果を減弱する。
- (3) クロレラは、ワルファリンの効果を増強する。
- (4) セント・ジョーンズ・ワートは、テオフィリンの効果を増強する。
- (5) 納豆は、スタチンの効果を増強する。

118 大規模災害の被災地で、数か月にわたり在宅避難している高齢者の栄養アセスメントを行った。その中に皮下出血や歯茎からの出血がみられる者がいた。この症状から欠乏が疑われるビタミンとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) ビタミン A
- (2) ビタミン B₁
- (3) ビタミン B₂
- (4) ナイアシン
- (5) ビタミン C

119 糖尿病治療薬とその主作用に関する記述である。

誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) α -グルコシダーゼ阻害薬は、二糖類の分解を抑制する。
- (2) SGLT2 阻害薬は、尿細管での糖再吸収を抑制する。
- (3) ビグアナイド薬は、肝臓での糖新生を抑制する。
- (4) GLP-1 受容体作動薬は、インクレチン分解を抑制する。
- (5) スルホニル尿素(SU)薬は、インスリン分泌を促進する。

120 高キロミクロン血症の栄養管理に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 炭水化物の摂取エネルギー比率を 65%E 以上とする。
- (2) 脂肪の摂取エネルギー比率を 15%E 以下とする。
- (3) n-3 系多価不飽和脂肪酸の摂取を制限する。
- (4) 果汁飲料の摂取を増やす。
- (5) アルコールの摂取量の上限を 40 g/日とする。

121 55 歳、男性。会社員。運動習慣なし。電車通勤片道 1 時間。健康診断で高尿酸血症を指摘され医療機関を受診した。医師より薬物治療を勧められたが、本人の希望で服薬せずに食事療法を開始することになり、栄養食事指導を行った。身長 170 cm、体重 65 kg、BMI 22.5 kg/m²。空腹時の血液検査値は、血糖 95 mg/dL、HbA1c 5.3%、尿酸 8.2 mg/dL、LDL コレステロール 125 mg/dL、HDL コレステロール 65 mg/dL、トリグリセリド 115 mg/dL。表は、患者から聞き取った普段の食事内容である。優先すべき栄養食事指導の内容として、**最も適切な**のはどれか。1 つ選べ。

- (1) 主菜(魚、肉、卵、大豆)の量を少なくする。
- (2) 卵は 1 日に 1 個までにする。
- (3) 野菜料理を追加する。
- (4) 禁酒を勧める。

表 普段の食事内容

朝食	昼食(弁当)	夕食
ご飯(150 g)	ご飯(200 g)	ご飯(150 g)
納豆(40 g)	卵焼き(3 切れ)	刺身(100 g)
鶏卵(1 個)	鶏唐揚げ(60 g)	冷奴(200 g)
味噌汁(1 杯)	ウインナー(40 g)	肉野菜炒め(1 皿)
	温野菜(80 g)	焼酎(25 度)(360 mL)
	マヨネーズ(10 g)	

122 膵炎の栄養管理に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 急性膵炎で激しい上腹部痛がある場合、成分栄養剤を用いて経腸栄養を行う。
- (2) 急性膵炎患者の食事開始時は、脂質 10 g/日以下とする。
- (3) 慢性膵炎非代償期では、たんぱく質を 0.8 g/kg 標準体重/日に制限する。
- (4) 慢性膵炎非代償期では、脂溶性ビタミンの摂取を制限する。
- (5) 慢性膵炎非代償期で二次性糖尿病がみられる場合、エネルギー量は 20 kcal/kg 標準体重に制限する。

123 消化器疾患と摂取を制限すべき栄養素等の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 逆流性食道炎 ————— 炭水化物
- (2) 胆石症 ————— カルシウム
- (3) たんぱく質漏出性胃腸症 ————— たんぱく質
- (4) 潰瘍性大腸炎寛解期 ————— 水分
- (5) クローン病活動期 ————— 脂肪

124 57 歳、男性。高校教諭。狭心症の外来患者。身長 176 cm、体重 70 kg、BMI 22.6 kg/m²。血圧 145/85 mmHg。空腹時の血液検査値は、LDL コレステロール 150 mg/dL、HDL コレステロール 52 mg/dL、トリグリセリド 136 mg/dL。この患者の 1 日当たりの目標栄養量を、コレステロール 200 mg/日未満、食塩 6.0 g/日未満とした。これと併せて設定した、他の目標栄養量の組合せとして、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

	エネルギー (kcal/日)	脂肪 (g/日)	飽和脂肪酸 (g/日未満)
(1)	1,600	40	15
(2)	1,600	55	20
(3)	2,000	45	15
(4)	2,000	45	20
(5)	2,000	60	20

125 75 歳、女性。心不全。軽度の身体活動で呼吸苦があり、状態が悪化して入院となった。浮腫も認められ、利尿薬の投与が開始された。身長 150 cm、体重 45 kg、BMI 20.0 kg/m²。空腹時の血液検査値は、ナトリウム 135 mEq/L、カリウム 4.0 mEq/L、クレアチニン 0.6 mg/dL。かろうじて経口摂取ができています。この患者の 1 日当たりの目標栄養量として、最も適切なものはどれか。1 つ選べ。

- (1) エネルギーは、1,600 kcal とする。
- (2) たんぱく質は、60 g とする。
- (3) 食塩は、3 g とする。
- (4) 水分は、2,000 mL とする。

126 45 歳、女性。会社員。CKD。身長 153 cm、体重 50 kg、BMI 21.4 kg/m²。血圧 145/92 mmHg。食塩摂取量を推定するために 24 時間蓄尿を行ったところ、尿量 1.0 L、尿中ナトリウム濃度 255 mEq/L であった。この患者の尿中食塩排泄量 (g/日) として、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 5
- (2) 8
- (3) 10
- (4) 12
- (5) 15

127 62 歳、男性。無職。糖尿病腎症。身長 165 cm、体重 63 kg、目標体重 60 kg。血圧 148/92 mmHg。空腹時の血液検査値は、血糖 151 mg/dL、HbA1c 8.4%、尿素窒素 38 mg/dL、クレアチニン 1.3 mg/dL、eGFR 45 mL/分/1.73 m²、カリウム 5.7 mEq/L。尿アルブミン/クレアチニン比 350 mg/gCr。この患者の 1 日当たりの目標栄養量として、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) エネルギーは、2,200 kcal とする。
- (2) たんぱく質は、30 g とする。
- (3) 脂肪は、20 g とする。
- (4) 食塩は、7.5 g とする。
- (5) カリウムは、1,800 mg とする。

128 腎疾患の病態および栄養管理に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 一次性ネフローゼ症候群では、LDL コレステロール値が低下する。
- (2) 急性腎障害(AKI)では、血清クレアチニン値が低下する。
- (3) 微小変化型ネフローゼ症候群では、たんぱく質摂取量を 0.8 g/kg 標準体重/日とする。
- (4) 急性糸球体腎炎の乏尿期では、食塩を 5 g/日 とする。
- (5) 腹膜透析では、食事のエネルギー量は、目標エネルギー量から、腹膜吸収ブドウ糖のエネルギー分を差し引いて求める。

129 ステロイド薬を服用している患者に対して栄養食事指導を行うことになった。この患者に認められる所見である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 免疫力の低下
- (2) 高血圧
- (3) 食欲の亢進
- (4) 高カリウム血症
- (5) 耐糖能異常

130 神経疾患の病態、診断および栄養管理に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 食行動異常は、認知症の中核症状である。
- (2) 認知症のスクリーニングには、DESIGN-R[®]が用いられる。
- (3) パーキンソン病では、嚥下障害がみられる。
- (4) パーキンソン病では、エネルギー目標量を安静時エネルギー消費量の2倍とする。
- (5) レボドパ(L-ドーパ)は、薬の効果を高めるために、高たんぱく質食と一緒に内服する。

131 14 歳、女性。神経性やせ症。BMI 16.5 kg/m²。母親に伴われ外来受診した。初回の栄養食事指導に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 1 か月後の体重増加目標量を決める。
- (2) 体重を毎日測定するように指示する。
- (3) 過食症状の有無を確認する。
- (4) 食欲が増すように運動を推奨する。
- (5) 栄養バランスを整えるように食事内容を指導する。

132 80 歳、男性。ADL 自立。身長 155 cm、体重 47 kg、BMI 19.6 kg/m²。標準体重 53 kg。握力 20 kg。サルコペニアと診断された。血液検査値は、アルブミン 3.2 g/dL、クレアチニン 0.6 mg/dL、尿素窒素 12 mg/dL。たんぱく尿(－)。この患者の 1 日当たりの目標栄養量の組合せとして、最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- | | エネルギー
(kcal/日) | たんぱく質
(g/日) |
|-----|-------------------|----------------|
| (1) | 1,000 | 40 |
| (2) | 1,600 | 40 |
| (3) | 1,600 | 65 |
| (4) | 2,000 | 100 |

133 食物アレルギーと除去対象となる食品・原材料の組合せである。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 牛乳アレルギー ———— 牛肉
- (2) 鶏卵アレルギー ———— 卵殻カルシウム
- (3) 大豆アレルギー ———— 緑豆もやし
- (4) カシューナッツアレルギー ———— ピスタチオ
- (5) 小麦アレルギー ———— 麦芽糖

134 イレウスにより空腸の一部、回腸全体および回盲弁を切除し、空腸と結腸を吻合した。残存小腸は約 100 cm であった。この患者の病態の経過および栄養管理に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 第Ⅰ期(術直後期)には、腸蠕動運動の亢進後に腸管麻痺が起こる。
- (2) 第Ⅰ期(術直後期)には、経腸栄養法とする。
- (3) 第Ⅱ期(回復適応期)には、下痢の回数が増加する。
- (4) 第Ⅱ期(回復適応期)には、経口摂取を禁忌とする。
- (5) 第Ⅲ期(安定期)には、ビタミン B₁₂ を注射により補給する。

135 重度嚥下障害患者の直接訓練で用いる食品である。

最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 麦茶
- (2) とろみ茶
- (3) おもゆ
- (4) よく潰したバナナ
- (5) 絹ごし豆腐

136 メープルシロップ尿症の治療用ミルクで除去されているアミノ酸である。

最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) フェニルアラニン
- (2) トリプトファン
- (3) メチオニン
- (4) ロイシン
- (5) スレオニン

137 公衆栄養活動に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 傷病者の治療を目的として行う。
- (2) ソーシャルキャピタルは、公衆栄養活動のための財源である。
- (3) コミュニティオーガニゼーションは、住民参加を通して、地域に存在する諸問題を解決に導く過程である。
- (4) ポピュレーションアプローチでは、特定健康診査においてリスクありと判定された個人に対して、働きかけを行う。
- (5) エンパワメントのための公衆栄養活動は、自治体を中心となって行う。

138 平成 22(2010)年～令和元(2019)年の国民健康・栄養調査における 20 歳以上の身体および栄養・食生活の状況に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 男性における肥満者(BMI 25 kg/m^2 以上)の割合は、減少している。
- (2) 女性におけるやせの者(BMI 18.5 kg/m^2 未満)の割合は、減少している。
- (3) 65 歳以上の高齢者における低栄養傾向の者(BMI 20 kg/m^2 以下)の割合は、増加している。
- (4) 令和元(2019)年の食塩摂取量の平均値は、男女ともに 40～50 歳台よりも 60 歳以上で多い。
- (5) 野菜摂取量の平均値は、増加している。

139 食料需給表から算出された、わが国の食料自給率のうち、米、野菜、果実、鶏卵の品目別自給率(重量ベース)の年次推移である(図)。鶏卵については、飼料自給率を考慮した値である。図のa～dに該当する食品の組合せとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- | | a | b | c | d |
|-----|----|----|----|----|
| (1) | 鶏卵 | 米 | 果実 | 野菜 |
| (2) | 鶏卵 | 米 | 野菜 | 果実 |
| (3) | 米 | 鶏卵 | 野菜 | 果実 |
| (4) | 米 | 果実 | 野菜 | 鶏卵 |
| (5) | 米 | 野菜 | 果実 | 鶏卵 |




図 品目別自給率(重量ベース)の推移

鶏卵の値は、飼料自給率を考慮している。

140 世界の健康・栄養問題の現状と課題に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 死亡者数は、NCDs によるものが最も多い。
- (2) COVID-19 は、NCDs に分類される。
- (3) 2000 年以降、低中所得国の NCDs による死亡者数は、減少傾向にある。
- (4) 主要先進国(G7)においては、過去 20 年で成人の肥満者の割合が減少している。
- (5) 日本におけるナトリウム摂取量は、北アメリカに比べて少ない。

141 健康増進法に定められている事項と、その実施者の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 食事摂取基準の策定 ————— 内閣総理大臣
- (2) 特別用途表示の許可 ————— 内閣総理大臣
- (3) 国民健康・栄養調査の調査世帯の指定 ——— 厚生労働大臣
- (4) 栄養指導員の任命 ————— 厚生労働大臣
- (5) 健康診査の実施等に関する指針の策定 ——— 都道府県知事

142 栄養士法に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 大正時代に制定された。
- (2) 栄養士は、特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設において、特別の配慮を必要とする給食管理を行うことを業とする者と定義されている。
- (3) 管理栄養士は、傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うことを業とする者と定義されている。
- (4) 管理栄養士免許は都道府県知事が与えることについて定めている。
- (5) 国民健康・栄養調査員の任命について定めている。

143 健康日本 21(第三次)における目標である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 適正体重を維持している者の増加(肥満、若年女性のやせ、低栄養傾向の高齢者の減少)
- (2) 果物摂取量の改善
- (3) 地域等で共食している者の増加
- (4) 食品ロス削減のために何らかの行動をしている者の増加
- (5) 「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」の推進

144 第4次食育推進基本計画に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 各都道府県において策定されている。
- (2) 計画期間は、12 年間である。
- (3) 「持続可能な食を支える食育の推進」を重点事項としている。
- (4) 「20 歳未満の者の飲酒をなくす」という目標項目がある。
- (5) 食育推進計画を作成・実施している市町村を 80% にする目標値を設定している。

145 国民健康・栄養調査に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 対象者は、住民基本台帳から無作為に抽出する。
- (2) 栄養摂取状況調査の対象者は、6 歳以上である。
- (3) 栄養摂取状況調査は、日曜日または祝祭日に実施する。
- (4) 栄養摂取状況調査は、陰膳法を用いる。
- (5) 栄養素等摂取量の算出では、調理による食品中の栄養素量の変化を考慮している。

146 食事バランスガイドにおける料理区分と「1つ(SV)」基準の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 主食 ————— 主材料に由来する炭水化物として 80 g
- (2) 副菜 ————— 主材料の重量として 100 g
- (3) 主菜 ————— 主材料に由来するたんぱく質として 6 g
- (4) 牛乳・乳製品 ——— 主材料に由来するカルシウムとして 200 mg
- (5) 果物 ————— 主材料の重量として 50 g


147 集団の栄養素等摂取量を評価するために行う食事記録法に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 食事記録法のうち、目安量法は、秤量法に比べて摂取量推定の誤差が小さい。
- (2) 陰膳法に比べて、対象者1人当たりの調査費用が高い。
- (3) 24時間食事思い出し法に比べて、対象者の負担が小さい。
- (4) 食物摂取頻度調査法に比べて、対象者の記憶に依存する。
- (5) 食物摂取頻度調査法に比べて、調査員の負担が大きい。

148 K 地域における 20 歳台女性 100 人の BMI の分布である(図)。この集団のエネルギー摂取状況について、日本人の食事摂取基準(2020 年版)を用いて評価した。この評価に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) BMI の中央値のある階級は、 $17.5 \sim 18.0 \text{ kg/m}^2$ である。
- (2) BMI の中央値と平均値は、同じである。
- (3) エネルギー摂取量の不足者の割合は、35% である。
- (4) エネルギー摂取量の過剰者の割合は、16% である。
- (5) エネルギー摂取量が適切である者の割合は、30% である。



※区間の上限は未満である。

図 BMI の分布 (n=100)

149 公衆栄養マネジメントに関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 地域診断の結果を基に、PDCA サイクルに従って進める。
- (2) プリシード・プロシードモデルの最終目標は、QOL の向上である。
- (3) 課題解決型アプローチでは、目指す姿を、専門家ではなく住民が主体となつて決定する。
- (4) 目標達成までの取組期間を明示する。
- (5) 投入した資源に対する、公衆栄養活動の効果を評価する。

150 公衆栄養アセスメントに用いる統計情報とその出典の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 平均寿命 ————— 国民生活基礎調査
- (2) 幼児の朝食習慣 ————— 乳幼児栄養調査
- (3) 学校給食実施率 ————— 学校保健統計調査
- (4) 食中毒の患者数 ————— 感染症発生動向調査
- (5) 健診・人間ドックの受診状況 ———— 患者調査

151 地域において公衆栄養プログラムを展開するための社会資源に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 民間企業は、スマート・ライフ・プロジェクトに参画することができない。
- (2) 食生活改善推進員は、市町村の職員として公衆栄養活動を行う。
- (3) 栄養ケア・ステーションは、市町村が設置する。
- (4) 行政の管理栄養士の役割として、食育推進のためのネットワークの構築がある。
- (5) 地域ケア会議は、都道府県知事が開催する。

152 母子に対する公衆栄養に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 未熟児の訪問指導の実施主体は、都道府県である。
- (2) 乳児の健康診査の対象月齢は、全国で統一されている。
- (3) 乳幼児健康診査の受診者に対する支援方法の決定には、医師の指示が必要である。
- (4) 「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針」には、飲酒に関する記載がある。
- (5) 「授乳・離乳の支援ガイド」では、離乳食を進める際は月齢を最優先することと記載されている。

153 特定給食施設が給食を通して担うことのできる役割である。

誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) 給食を活用した栄養教育
- (2) 望ましい食習慣の形成
- (3) 不特定かつ多数の者の栄養管理
- (4) 利用者の食環境の整備
- (5) 健康の保持増進

154 健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 昼食を 100 食提供する保育所 _____ 配置しなければならない。
- (2) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 150 食提供する介護老人福祉施設 _____ 配置しなければならない。
- (3) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 250 食提供する介護老人保健施設 _____ 配置しなければならない。
- (4) 朝食、昼食、夕食を合わせて 800 食提供する病院 _____ 配置するように努めなければならない。
- (5) 従業員の 8 割が利用する、1 日 1,500 食提供する従業員食堂 _____ 配置するように努めなければならない。

155 給食経営管理におけるサブシステムと、その主な目的の組合せである。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 栄養・食事管理 _____ 大量調理機器の購入計画の作成
- (2) 品質管理 _____ 計画どおりの食事の提供
- (3) 提供管理 _____ 調理従事者の労働安全性の確保
- (4) 人事・労務管理 _____ 献立作成基準の設定
- (5) 施設・設備管理 _____ 作業工程計画に沿った食事の生産

156 給食施設における管理栄養士の業務と、その業務に関して連携することが望ましい他職種の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 保育所での児の食事摂取状況の把握 _____ 健康運動指導士
- (2) 小学校給食の配膳指導 _____ スクールカウンセラー
- (3) 事業所給食の給与栄養目標量の設定 _____ 食品衛生監視員
- (4) 病院での患者の食事摂取量の把握 _____ 臨床検査技師
- (5) 病院での摂食嚥下機能障害がある患者に対する食形態の決定 _____ 言語聴覚士

157 小学校の給食業務を外部委託している自治体が、給食受託会社に委託できる業務である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

- (1) アレルギー対応の献立作成
- (2) 食材料の調達
- (3) 調理従事者の健康チェック表の点検・確認
- (4) 調理作業時の異物の確認
- (5) 調理機器の保守点検

158 K 病院では直営で給食を運営し、調理システムはクックサーブシステムを採用している。人的資源不足に対応した取組に関する記述として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 調理する献立の品数を増やす。
- (2) 加工度の高い食材料から加工度の低い食材料に切り替える。
- (3) 大量調理機器の稼働率を下げる。
- (4) 中央配膳方式から病棟配膳方式に切り替える。
- (5) 朝食をアッセンブリーサーブシステムで運用する。

159 食単価契約で給食を運営している K 事業所における、給食販売価格の構成である(図)。図の a ~ c に該当する用語の組合せとして、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。




図 K 事業所における給食販売価格の構成

160 ある社員食堂では、利用率を高めるための対策を検討している。取り組む内容とマーケティング用語の組合せとして、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 提供メニューが購入された時間と食数の情報を管理する。 _____ merchandising
- (2) 売上成長率と売上構成比から、既存メニューの位置づけを知る。 _____ product portfolio management
- (3) 期間限定メニューを商品化する計画を立てる。 _____ point of sales
- (4) 新規メニューの写真入りポスターを社内に掲示する。 _____ place
- (5) 新規メニューをテイクアウトコーナーで販売する。 _____ promotion

161 ある工場の従業員食堂では、昼食に定食を毎日提供している。表は、1 か月を 30 日とした場合の、定食の主食種類別の提供頻度(表 1)と、食品構成表の抜粋(表 2)である。主食に使用する 1 人 1 食当たりの米の純使用量(g)として、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 40
- (2) 50
- (3) 60
- (4) 70
- (5) 90

表 1 定食の主食種類別の提供頻度

主食の種類	回/月
ご飯	20
パン	3
めん	7

表 2 定食の食品構成表(抜粋)

食品群	小分類	重量 (g)	エネルギー (kcal)
穀類	米類	60	215
	パン類	6	18
	めん類	30	51
	その他穀類	4	15

162 給食の品質管理に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 設計品質は、発注書で示される。
- (2) 設計品質は、検収簿で確認できる。
- (3) 適合品質は、検食簿で評価する。
- (4) 適合品質は、利用者の満足度調査の結果で評価する。
- (5) 総合品質は、献立表で評価する。

163 ブロッコリーのサラダを調理する。1人当たりの純使用量を60g、廃棄率を40%とした場合、300人分のブロッコリーの使用量(kg)として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 10.8
- (2) 18.0
- (3) 25.2
- (4) 30.0
- (5) 45.0

164 食材料管理に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 年間の価格変動が大きい生鮮果物は、指名競争入札方式で購入する。
- (2) 生鮮カット野菜は、1週間ごとに一括購入する。
- (3) 食肉類は、納入時の品温が10℃以下であることを確認する。
- (4) トッピング用のかつお節は、検収を省略できる。
- (5) 同じ料理に使う食肉類と野菜類は、まとめて同じ容器に保管する。

165 給食の生産・提供システムに関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) コンベンショナルシステムでは、前倒し調理による計画生産が可能である。
- (2) セントラルキッチンシステムでは、サテライトキッチンで調理した料理をセントラルキッチンに配送する。
- (3) 真空調理システムでは、低温加熱により食材料の風味を逃さず軟らかく調理することができる。
- (4) クックサーブシステムでは、調理した料理を急速冷凍して、提供日まで保管する。
- (5) クックチルシステムでは、加熱調理後の料理を90分以内に5℃まで冷却する。

166 白身魚のフライと人参のサラダの作業動線の案を作成した(図)。図中の機器・設備の配置は変えずに、適切な作業動線となるよう、見直すべき事項として、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 検収した人参を洗浄するシンク
- (2) 下処理後の人参を加熱機器に運ぶ動線
- (3) 加熱後の人参を冷却機器に運ぶ動線
- (4) 加熱後の人参を冷却する機器
- (5) 冷却後の人参を調味する作業場所





図 作業動線の案

167 K 事業所の食堂では、対面サービス方式で給食を提供している(図)。各料理を適温で効率よく安全に提供したい。鶏の唐揚げ(付け合わせ：トマト、レタス)、小松菜のお浸し、味噌汁、ご飯の献立の場合、提供場所(A～C コーナー)と料理の組合せとして、最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- | A コーナー | B コーナー | C コーナー |
|-------------|---------|---------|
| (1) 鶏の唐揚げ | 小松菜のお浸し | 味噌汁 |
| (2) 鶏の唐揚げ | 味噌汁 | 小松菜のお浸し |
| (3) 小松菜のお浸し | 鶏の唐揚げ | 味噌汁 |
| (4) 小松菜のお浸し | 味噌汁 | 鶏の唐揚げ |
| (5) 味噌汁 | 鶏の唐揚げ | 小松菜のお浸し |



利用者の動線 →

図 配膳場所のレイアウト

168 給食施設において、鮭のムニエル(付け合わせ：トマト)を調理した。各調理工程における衛生管理上の問題とその際の対応に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 鮭の検収時の温度が8℃であったため、急速冷却した。
- (2) トマトの殺菌用の次亜塩素酸ナトリウム溶液の濃度が20 mg/Lであったため、殺菌時間を5分から15分間に延長した。
- (3) 消毒済みのトマトを魚用のバットで保管したため、トマトの細菌検査を実施した。
- (4) 鮭の加熱調理時の中心温度が70℃であったため、75℃以上になるまで加熱を続け1分間維持した。
- (5) 鮭のムニエルを保温するウォーマーの温度が50℃であったため、鮭をスチームコンベクションオーブンで再加熱した。

169 大量調理施設衛生管理マニュアルに基づく衛生管理に関する記述である。

最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 手指に化膿創がある場合は、手袋を着用して調理を行う。
- (2) フードカッターの取扱いは、床面から30 cmの場所で行う。
- (3) 加熱調理後に冷却した食品の一時保管は、下処理室で行う。
- (4) 貯水槽の水を使用する場合は、遊離残留塩素が0.1 mg/L以上であることを確認する。
- (5) 使用後の容器は、洗浄後60℃で5分間の加熱殺菌をする。

170 K 病院において、災害発生時の食事提供に関するマニュアルを更新する。更新に当たり、改めて確認が必要な内容として、誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 協力機関との連絡方法
- (2) 冷凍野菜の購入先
- (3) 電気・ガスが使えないときの熱源
- (4) 調理従事者の通勤手段
- (5) 食事の配膳・下膳方法

次の文を読み「171」、「172」、「173」に答えよ。

K市保健センターに勤務する管理栄養士である。乳幼児相談において、男児(8か月、第一子)の母親からの相談に応じている。

母親は、授乳や離乳食の与え方が適切かどうか自信がなく、男児の発育の状態を心配している。夫は育児に協力的だが、昼間は母親と男児の2人でおり、引っ越してきたばかりで近所に知り合いはいない。

171 図1は、男児の出生時からの身長と体重の変化を、母親が母子健康手帳の乳児身体発育曲線の図に記録したものである。図から読み取った結果を踏まえた、母親への管理栄養士の発言として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 身長、体重ともに成長に心配があります。
- (2) 身長の伸びに心配があります。
- (3) 身長に対して、体重が少ないようです。
- (4) 身長、体重ともに順調に成長しています。




図1 男児の発育の記録

172 図2は、男児の授乳と離乳の状況を聞き取った内容である。この内容を踏まえた、母親への管理栄養士の助言として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 離乳食の全卵は、もう少し月齢が進んでからにしましょう。
- (2) 授乳の回数が少ないので、回数を増やしましょう。
- (3) 不足しがちな栄養素を補うため、フォローアップミルクを与えましょう。
- (4) 月齢や成長・発達の段階に応じた与え方ができています。

○授乳と離乳について

現在の授乳内容……母乳・ミルク・ <u>混合</u> ・フォローアップミルク・牛乳・その他（ ）	
回数と量……………（ おおよそ5回。母乳は、子どもが欲しがるときに、あげている。 母乳中心。寝る前だけミルクを180 mL。 ）	
授乳と食事の時間	
起床 授乳 離乳食+授乳 離乳食+授乳 授乳 授乳 就寝 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 3:00	
離乳食を始めた月齢	主に与えている食品
(5) か月	(おかゆ、うどん、小松菜、白身魚、全卵、鶏ささみ、豆腐、バナナ)
水分補給の内容 … <u>白湯</u> ・ <u>麦茶</u> ・ジュース・果汁・乳酸菌飲料・イオン飲料・その他（ ）	
離乳食の食べ方は口をもぐもぐしてから、ごっくんしているか …………… <u>はい</u> ・ いいえ	

図2 男児の授乳と離乳の状況

173 今後に向けた、母親への管理栄養士の助言である。

最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) お子さんの成長を確認するため、身長と体重を毎日計測してはいかがでしょうか。
- (2) 不安なことがあれば、インターネットで検索してみてもいいでしょうか。
- (3) 保健センターで行う離乳後期向けの教室で、仲間づくりをしませんか。
- (4) お母さんが心配すぎるのは、お子さんにとってもあまり良くないですよ。

次の文を読み「174」、「175」に答えよ。

K 社健康保険組合の管理栄養士である。

対象者は、40 歳、男性。喫煙習慣なし。一人暮らし。昔からお酒が好きだが、体重が増えてきたので、外食のビール 1 杯と家ではチューハイ 1 缶で我慢している。

小学生の頃に、サッカーを始め、大学まで打ち込んできた。就職してからもサッカーを趣味として続けていたが、忙しくなり 30 歳からやめている。30 歳台から体重が増加していたが、あまり気にしてこなかった。40 歳時の健診で、特定保健指導の動機付け支援の対象となった。身長 178 cm、体重 90 kg、BMI 28.4 kg/m²、腹囲 98.5 cm。20 歳時の体重 72 kg。

血圧 128/82 mmHg。空腹時の血液検査値は、総コレステロール 190 mg/dL、トリグリセリド 185 mg/dL、LDL コレステロール 110 mg/dL、HDL コレステロール 43 mg/dL、血糖 98 mg/dL、HbA1c 5.5%。

平日の食事内容は、表のとおりである。

表 対象者の平日の食事内容

朝食(コンビニで購入)	間食	昼食(社員食堂)	夕食(外食)	夜食(帰宅後)
おにぎり (ツナマヨと鮭を各 1 個)	カフェラテ (加糖 360 mL)	唐揚げ定食 ご飯(300 g)	とんこつラーメン(並盛 1 杯)	チューハイ(500 mL)
あんパン(1 個)		唐揚げ(大 4 個)	餃子(6 個)	冷奴(150 g)
野菜スムージー(1 パック)		ミックスサラダ(1 皿)	ビール(中ジョッキ 1 杯)	枝豆(100 g)
		わかめの味噌汁(1 杯)		

174 初回面接で、対象者は「食事のことはよく分からないので、運動で体重を減らしたいです。サッカーを再開するために、ジョギングを始めたいと思います。」と話した。3か月間で3kg減らす目標を設定した。体重のセルフモニタリングに加えて、運動と食事に関するプランを提案する。ジョギングの身体活動の強度は7メッツである。このプランに関する助言として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) ジョギングを毎日30分して、食事はそのままが良いですよ。
- (2) ジョギングを週4日、30分ずつして、食事はできそうなことからやってみましょう。
- (3) ジョギングを週2時間して、カフェラテは無糖にしましょう。
- (4) ジョギングを週3時間して、お酒をやめましょう。

175 3か月後の評価で、目標体重を達成していた。対象者は3か月間を振り返り、「体重を測ることが大事だと分かりました。体重を測れば、増えた理由を自分で考えるし、食事のことも気にするようになりました。」と話した。今後に向けた助言として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 体重管理に必要なスキルが身についたのは、素晴らしいですね。
- (2) 今後、体重を測ることを、周囲の人にも勧めてくださいね。
- (3) 食事にも関心を持たれるようになったので、食事内容の改善にも取り組んでみませんか。
- (4) 20歳時の体重を目標に、さらに体重を減らせるように頑張りましょう。

次の文を読み「176」、「177」に答えよ。

K クリニックに勤務する管理栄養士である。

患者は、55 歳、閉経後の女性。事務職。5 年前に 2 型糖尿病を発症し、経口血糖降下薬を処方されている。糖尿病の合併症はない。

身長 155 cm、体重 56 kg、BMI 23.3 kg/m²。標準体重 53 kg。血圧 128/85 mmHg。空腹時の血液検査値は、血糖 140 mg/dL、HbA1c 7.2 %、総コレステロール 198 mg/dL、LDL コレステロール 116 mg/dL、HDL コレステロール 48 mg/dL、トリグリセリド 185 mg/dL、尿酸 5.8 mg/dL、AST 15 U/L、ALT 16 U/L、γ GT 19 U/L、クレアチニン 0.59 mg/dL。

医師から、エネルギー 1,600 kcal/日を指示されている。

176 薬物療法により患者の病態は安定しているが、食事に不安があるとのことで、3 か月ぶりに栄養食事指導を行うこととなった。患者から普段の食事内容を聞き取った(表 1)。患者の優先すべき栄養上の問題として、最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) たんぱく質の摂取量が少ない。
- (2) 脂肪の摂取量が多い。
- (3) 炭水化物の摂取量が多い。
- (4) 食塩の摂取量が多い。

表 1 患者の普段の食事内容

朝食	昼食	間食	夕食
ハニーバタートースト 食パン 6 枚切 2 枚 はちみつ 15 g バター 15 g	和風たらこパスタ (1 人前) トマトサラダ (トマト 50 g、たまねぎ 40 g) バナナヨーグルト (バナナ 1/2 本 加糖ヨーグルト 60 g)	ぶどうパン (2 個) ミルクティー (無糖・牛乳 60 mL)	ご飯 (200 g) 焼き鮭 (1 切れ) ポテトサラダ (じゃがいも 50 g きゅうり 10 g にんじん 10 g) 具だくさんの味噌汁 (豆腐 30 g、だいこん 30 g しめじ 20 g)

177 さらに3か月後に栄養食事指導を行った。体重 57 kg。空腹時の血液検査値は、血糖 138 mg/dL、HbA1c 7.4%、LDL コレステロール 109 mg/dL、HDL コレステロール 40 mg/dL、トリグリセリド 225 mg/dL、尿酸 6.5 mg/dL。表2は、本人が持参した食事メモである。患者への助言として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 今の食事を続けましょう。
- (2) 主食は、今の半分量にしましょう。
- (3) 果物は、1日1回にしましょう。
- (4) 牛乳・乳製品は、1日1回にしましょう。

表2 食事メモ

朝食	昼食	間食	夕食
トースト(8枚切2枚)	わかめうどん(1人前)	ミルクティー (無糖・牛乳 60 mL)	ご飯(150 g)
バター	ほうれん草の白和え	みかん(2個)	豚カツ、キャベツ、トマト
ツナサラダ (ツナ、レタス、トマト ノンオイルドレッシング)	無糖ヨーグルト(60 g)		なすときのこの炒め物
カフェオレ (無糖・牛乳 60 mL)			きゅうりの酢の物
バナナ(1本)			りんご(1/2 個)

次の文を読み「178」、「179」、「180」に答えよ。

K リハビリテーション病院に勤務する管理栄養士である。

患者は、67 歳、女性。夫は他界しており、娘家族と同居。健診で、高血圧症を指摘されていた。

アテローム血栓性脳梗塞の発症後、急性期病院での治療を経て、右片麻痺に対する運動機能リハビリテーションのために当院へ転院してきた。軽度嚥下障害があるが、軟菜食と液体にはとろみを付けることで対応できている。

脳梗塞の発症前は、身長 156 cm、体重 63 kg、BMI 25.9 kg/m²。食事は、娘が準備しており、間食に自分で買ってきたみたらし団子をよく食べていた。

転院時は、体重 55 kg、BMI 22.6 kg/m²。血圧 120/62 mmHg。血清アルブミン値 3.2 g/dL、eGFR 92 mL/分/1.73 m²。安静時エネルギー消費量 1,100 kcal/日。

178 栄養管理計画の作成に当たり、医師等と連携して、この患者の 1 日当たりの栄養補給量を検討した。その組合せとして、最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

	エネルギー (kcal/日)	たんぱく質 (g/日)
(1)	1,200	60
(2)	1,200	80
(3)	1,700	60
(4)	1,700	80

179 リハビリを開始して1週間が経過すると、運動はできているが食欲が低下し、約700 kcal/日しか摂取できなくなった。リハビリは継続する予定であるが、食欲回復には2週間以上要することを想定して、新たに栄養管理計画を作成することにした。不足分を補うための栄養投与方法として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 経口栄養補助食品
- (2) 経鼻胃管栄養法
- (3) 末梢静脈栄養法
- (4) 中心静脈栄養法

180 その後、食欲は徐々に回復し、リハビリも順調に進んだ。1か月後、外来通院できることが確認できたため退院となり、退院後の食事内容について栄養食事指導を行うことになった。入院中は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の嚥下調整食分類2021のコード4(嚥下調整食4)の基準に合わせて、食事を提供していた。患者と家族に示す献立(料理)例として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 全粥ペーストのゼリー、湯豆腐、かぼちゃの煮物、かぶの味噌汁(とろみ付き)、プリン
- (2) 全粥、かれい煮魚、鶏団子と里芋・人参の煮物、ふろふき大根の銀あんかけ、バナナ
- (3) フレンチトースト、ひき肉入りオムレツ、コーンとキャベツのマヨネーズサラダ、みかん入りヨーグルト
- (4) 軟飯、蒸し鶏の甘酢あんかけ、きゅうりと春雨の酢の物、豆腐とわかめの味噌汁、みたらし団子

次の文を読み「181」、「182」、「183」に答えよ。

K 透析クリニックに勤務する管理栄養士である。

患者は、68 歳、男性。15 年前から高血圧症と CKD で通院加療し、食事療法を続けてきたが、病態が悪化してきたため当クリニックに転院し、週 3 回の血液透析に移行した。

身長 165 cm、ドライウエイト 65 kg、標準体重 60 kg。尿量 300 mL/日。血圧 170/95 mmHg。透析開始前の血液検査値は、総たんぱく質 6.8 g/dL、アルブミン 3.3 g/dL、尿素窒素 86 mg/dL、クレアチニン 8.6 mg/dL、ナトリウム 140 mEq/L、カリウム 5.2 mEq/L、リン 4.8 mg/dL、HbA1c 5.5%。

181 血液透析導入後の食事について、栄養食事指導を行った。この患者における指示たんぱく質量と指示カリウム量の組合せである。

最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

	たんぱく質 (g/日)	カリウム (mg/日)
(1)	35	1,500
(2)	70	1,500
(3)	35	2,000
(4)	70	2,000

182 血液透析導入1か月後に、2回目の栄養食事指導を行った。患者は、食事メモを持参した(表)。患者への助言として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 朝食に、牛乳を加えましょう。
- (2) 昼食の天井は、野菜のかき揚げ丼にしましょう。
- (3) 夕食の揚げ出し豆腐は、湯豆腐にしましょう。
- (4) 夕食のいも料理は、1品に減らしましょう。

表 食事メモ

朝食	昼食	夕食
ご飯(160 g)	天井	ご飯(200 g)
卵焼き(卵 1/2 個)	(ご飯 200 g、きす 2 尾 えび 3 本、かぼちゃ 1 切)	つくねの甘だれ焼き(100 g)
焼きなす(なす 1 本)	こまつなと油揚げの煮びたし	じゃがいもの煮物(小鉢 1 杯)
紅白なます(小鉢 1 杯)	(小鉢 1 杯)	揚げ出し豆腐(100 g)
りんご(1/4 個)		山芋のすりおろし(小鉢 1 杯)

183 栄養食事指導の際、患者から「間食を摂りたい。」と相談があった。患者に適した間食の例として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 芋かりんとう 30 g
- (2) マシュマロ 30 g
- (3) ヨーグルト 75 g
- (4) きんつば 50 g

次の文を読み「184」、「185」、「186」に答えよ。

K 総合病院の在宅診療部に勤務する管理栄養士である。

患者は、76 歳、独居男性。脳梗塞後遺症により要支援 1。嚥下機能に問題はない。高血圧症のため通院加療を続けていた。最終通院時、血圧 112/68 mmHg、身長 167 cm、体重 62 kg、BMI 22.2 kg/m²。

1 週間前に、発熱、咽頭痛が生じ、近医を受診したところ、新型コロナウイルス感染症と診断された。自宅での薬物療法により、発熱、咽頭痛は改善された。解熱鎮痛薬服用 6 日目に、心窩部痛と食欲不振が出現した。翌日になっても症状が改善しないため、近医から当院に連絡があり、担当医が男性宅を訪問し、診療した。

口渇を訴えているものの、心窩部痛があるため市販のゼリー飲料と経口補水液のみを摂取していた。尿検査を行ったところ、濃縮尿であった。入院加療の必要性はないと担当医が判断し、在宅で加療することとなった。

184 この時点での対症療法として、最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 経鼻胃管栄養法
- (2) 胃瘻栄養法
- (3) 末梢静脈栄養法
- (4) 中心静脈栄養法

185 担当医の指示により、在宅で3日間の対症療法を行った。バイタルサインを確認した後に、把握すべき所見として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 認知機能
- (2) 下腿周囲長
- (3) ツルゴール
- (4) 眼球結膜の黄染

186 担当医の訪問から4日目になると食欲が出てきて、患者は訪問介護員に食材の購入依頼を行い、おかゆを少しずつ食べ始めていた。数日後に訪問看護師から「心窩部痛はあるものの、全身状態が改善している。おかゆの他に何か食べたそうにしている。」と連絡があった。患者が希望する副食のうち、管理栄養士が勧めるものとして、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 麻婆豆腐
- (2) 筑前煮
- (3) ビーフシチュー
- (4) とりつくね煮

次の文を読み「187」、「188」、「189」に答えよ。

K 診療所に勤務している管理栄養士である。

患者は、80 歳、男性。妻(75 歳)と同居。中等度認知症。糖尿病でインスリン治療を行っており、妻が管理している。月に 1 回、外来受診し、医師からエネルギー 1,600 kcal/日を指示されている。

車椅子での移動で、食事は自立している。妻が用意する 3 食の食事はきちんと食べている。甘い菓子が好きで、間食を楽しみにしている。

受診時、身長 158 cm、体重 62 kg、BMI 24.8 kg/m²。血圧 120/70 mmHg。

空腹時の血液検査値は、アルブミン 3.9 g/dL、血糖 280 mg/dL、HbA1c 10.0%、トリグリセリド 200 mg/dL、AST 18 U/L、ALT 22 U/L、尿素窒素 10.2 mg/dL、クレアチニン 0.8 mg/dL。

187 この患者の血糖コントロール目標(HbA1c 値)として、**最も適切な**のはどれか。

1 つ選べ。

- (1) 6.5% 未満
- (2) 6.5～7.5% 未満
- (3) 7.0～8.0% 未満
- (4) 7.5～8.5% 未満

188 医師は、インスリン投与量を増量した上で、管理栄養士による栄養食事指導を指示した。患者の食事記録は表のとおりである。患者への指導として、**最も適切な**のはどれか。1 つ選べ。

- (1) 昼食と夕食のご飯は、それぞれ 2 単位にしましょう。
- (2) 野菜の量を増やしましょう。
- (3) 間食は、2 回から 1 回に減らしましょう。
- (4) コーヒーに砂糖を入れるのはやめましょう。

表 自宅での食事記録

時	食事	
6(起床) 7	朝食	ロールパン 2個(60 g) 野菜サラダ(キャベツ 30 g、トマト 20 g) 茹で卵 1個 牛乳 1本(200 mL)
10	間食	コーヒー 1杯(砂糖大さじ1杯) 大福 1個(50 g)
12	昼食	ご飯(150 g) 刺身(まぐろ 60 g) 味噌汁 1杯 肉じゃが オレンジ 1/4個
15	間食	コーヒー 1杯(砂糖大さじ1杯) カステラ 1切れ(50 g)
18	夕食	ご飯(150 g) 鶏肉の照り焼き(80 g) 切干大根の煮物 湯豆腐(100 g)
21(就寝)		

189 設問 188 の栄養食事指導の内容は遵守され、3 か月が経過した。空腹時血糖値 140 mg/dL、HbA1c 8.4%。栄養食事指導の際に、妻から、「血糖値が気になります。間食はやめさせた方が良いですか。」と相談があった。管理栄養士の助言として、**最も適切な**のはどれか。1 つ選べ。

- (1) 血糖コントロールを良好にするために、間食はやめましょう。
- (2) 間食は、1 週間に 1 度食べる曜日を決めましょう。
- (3) 間食は、果物にしましょう。
- (4) 間食は、今のまま食べてもらって良いです。

次の文を読み「190」、「191」、「192」に答えよ。

K社の社員寮に勤務する管理栄養士である。毎年120人程度の新入社員が、1年間、この寮を利用している。調理従事者は5人で、シフト勤務している。3月4日、16時頃までに、30人の新入社員が、腹痛、下痢、嘔吐の症状を訴えた。16時30分に、施設長の判断により、食中毒の可能性があるとは保健所に通報した。


190 通報後、17時30分に保健所の職員が寮に到着した。新入社員への夕食の調理は完了していた。この時点で5人の調理従事者の体調に問題はなかった。症状のない新入社員に対する夕食の対応について、保健所の職員に相談した管理栄養士の発言である。**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 予定どおり、夕食を提供しても良いですか。
- (2) 食品保管庫に備蓄している災害用の食品を、提供しても良いですか。
- (3) 提携している弁当屋に弁当を注文して、夕食を提供しても良いですか。
- (4) 新入社員の皆さんに、飲食店で夕食を摂ってもらっても良いですか。

191 3月5日の昼、腹痛と下痢を発症した者は、新入社員60人、調理従事者4人に増えた。その頃、保健所から、有症者の便と3月3日夕食のちらし寿司の保存食から、ノロウイルスが検出されたと報告があった。

図は、ちらし寿司の作業工程に、保健所の職員が作業時の手洗い、中心温度測定、手袋着用の有無を聞き取り、追記したものである。ちらし寿司の材料は、米飯、ちらし寿司の素(しいたけ甘煮・酢れんこん・人参)、卵、さやえんどう、えびである。ノロウイルスの汚染が疑われる作業工程として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) a
- (2) b
- (3) c
- (4) d



保健所職員による追記

(手洗い) : 手洗いとアルコール消毒
 (手袋着用) : 使い捨て手袋着用
 (中心温度) : 中心温度測定・記録

図 作業工程

192 今回の件を踏まえ、調理従事者に衛生教育を実施することになった。重点的に行う内容として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- (1) 食材料の検収・保管に関すること。
- (2) 加熱調理食品の加熱温度管理に関すること。
- (3) 手洗い及び手袋着用に関すること。
- (4) 調理機器および調理器具の洗浄・殺菌に関すること。

次の文を読み「193」、「194」、「195」に答えよ。

K 町健康課の管理栄養士である。K 町は人口 7,000 人で高齢化率は 30%、国民健康保険(国保)加入率は 27% である。町民は農業のほか、地場産業関連の中小企業への就労が多い。隣接市には大手 A 社の事業場(従業員 50 名)があり、勤務している町民もいる。

K 町は、脳血管疾患の標準化死亡比が県内で最も高い。そこで、国保担当者と連携して国保データベース(KDB)システム等の情報を活用し、町民の壮年期からの脳血管疾患対策を検討することになった。

193 町全体の脳血管疾患対策を検討することを目的として、特定健康診査・特定保健指導、医療費に関する情報をより広く収集するために、優先して連携する組織である。**最も適切な**のはどれか。1 つ選べ。

- (1) A 社健康保険組合
- (2) 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- (3) 後期高齢者医療広域連合
- (4) 市町村職員共済組合

194 特定健康診査結果を見ると、K 町の年齢区分別高血圧有所見率は、壮年期を含めて、県内の市町村の中でも特に高い状況にあった。医療費分析の結果、高血圧症の外来医療費は低く、脳血管疾患の入院医療費は高い傾向にあった。これらの結果を踏まえ、今後の対策を検討するために、優先的に確認する情報である。

最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 高血圧症で通院している者の特定健康診査実施率
- (2) 特定保健指導実施率
- (3) 高血圧に関して受診勧奨が行われた者の医療機関受診率
- (4) 降圧薬の服用者の割合

195 分析の結果、高血圧改善に焦点を当て、栄養分野では減塩に取り組むことになった。県民健康・栄養調査結果を参照すると、K 町を含む地域での食塩摂取源は、調味料が最も多かった。減塩に向けて効果が期待される取組である。

最も適切なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 町の SNS アカウントで、管理栄養士お勧めの減塩レシピ動画を配信する。
- (2) 町の広報誌に高血圧有所見率が高いという情報を掲載し、減塩調味料の利用を呼びかける。
- (3) 保健センターで、壮年期を対象とした減塩料理教室を開催する。
- (4) スーパーマーケットに協力を依頼し、減塩調味料の必要性の周知とともに、販売促進を毎月行ってもらう。

次の文を読み「196」、「197」に答えよ。

K 市健康増進課の管理栄養士である。K 市では過疎化が進み、小売店の閉店が相次ぎ、スーパーマーケットは K 市郊外の 1 店舗を残すのみとなった。また、高齢者は身体活動の不足による食欲低下により、低栄養傾向にある者の割合が増加している。この対策として、K 市は健康増進計画において、低栄養傾向にある者の割合の減少に関する 10 年間の目標を設定し、取組を行ってきた。

196 高齢者を対象に食事調査を行った。図は、食事バランスガイドの SV の目安量の範囲と、食事摂取量を比較した結果である。この結果を踏まえた食事改善のための呼びかけとして、**最も適切な**のはどれか。1 つ選べ。

- (1) エネルギーを摂るために、主食を増やしましょう。
- (2) たんぱく質を摂るために、主菜を増やしましょう。
- (3) 食物繊維を摂るために、副菜を増やしましょう。
- (4) ビタミンを摂るために、果物を増やしましょう。




図 食事バランスガイドのSVの目安量の範囲と比較した食事摂取量の評価

197 K市の高齢者における低栄養傾向を改善するために、市内のスーパーマーケットの協力を得て、食環境整備を行うことにした。このスーパーマーケットは、宅配サービスと移動販売車による販売の実績がある。食環境整備の内容に関する記述として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) 高齢者を対象に、宅配サービスを無料にしてもらう。
- (2) 移動販売車で扱う食品を増やし、巡回頻度を増やしてもらおう。
- (3) 簡単に調理できる料理を店内で実演し、その食材の販売コーナーを作ってもらおう。
- (4) K市が低栄養改善のための料理レシピを考案し、店内に置いてもらおう。

次の文を読み「198」、「199」、「200」に答えよ。

K 県健康増進課の管理栄養士である。K 県では、全国に比べて、男女ともに脳血管疾患と虚血性心疾患の年齢調整死亡率が高い。また、K 県では、全国に比べて、男女ともに 20 歳以上の野菜摂取量の年齢調整平均値が低く、食塩摂取量の年齢調整平均値が高い。

198 K 県における高血圧症、脂質異常症、糖尿病の 20 歳以上の有病者数を推計するためのデータとして、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 人口動態調査による死亡の原因
- (2) 患者調査による入院・外来の推計患者数
- (3) 国民健康・栄養調査に準じる方法で行った県民健康・栄養調査の身体状況調査結果
- (4) 国民生活基礎調査(大規模調査年)における傷病による通院の状況
- (5) レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)の特定健康診査データ

199 県内の A 大学は、県の協力のもと、20 歳以上の県民を対象に前向きコホート研究を実施してきた。食塩および野菜の摂取量に関して、高血圧症、脂質異常症、糖尿病の罹患の相対危険を算出したところ、表の結果を得た。統計学的な有意水準は両側 5 % とする。この解釈として、最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

- (1) 食塩摂取量は、7 g/日より多い群に比べて、7 g/日以下の群で、高血圧症罹患の相対危険が有意に低い。
- (2) 食塩摂取量は、7 g/日より多い群に比べて、7 g/日以下の群で、脂質異常症罹患の相対危険が有意に低い。
- (3) 食塩摂取量は、7 g/日より多い群に比べて、7 g/日以下の群で、糖尿病罹患の相対危険が有意に低い。
- (4) 野菜摂取量は、350 g/日未満の群に比べて、350 g/日以上以下の群で、脂質異常症罹患の相対危険が有意に低い。
- (5) 野菜摂取量は、350 g/日未満の群に比べて、350 g/日以上以下の群で、糖尿病罹患の相対危険が有意に低い。

表 食塩および野菜の摂取量による各疾患罹患の相対危険(95% 信頼区間)

疾患	食塩摂取量 $\leq 7 \text{ g/日}^{※1}$	野菜摂取量 $\geq 350 \text{ g/日}^{※1}$
	相対危険 $^{※2}$ (95% 信頼区間)	相対危険 $^{※3}$ (95% 信頼区間)
高血圧症	0.68(0.55~0.85)	0.76(0.62~0.93)
脂質異常症	0.98(0.62~1.56)	0.92(0.62~1.38)
糖尿病	0.89(0.55~1.44)	0.69(0.46~1.04)

※1 食塩摂取量は $> 7 \text{ g/日}$ 、野菜摂取量は $< 350 \text{ g/日}$ が基準群

※2 性、年齢、BMI、喫煙状況、総エネルギー摂取量、野菜摂取量で調整

※3 性、年齢、BMI、喫煙状況、総エネルギー摂取量、食塩摂取量で調整

200 設問 199 の表の結果を踏まえ、K 県民の食事改善に向けたポピュレーションアプローチを実施することになった。具体的内容として、**最も適切な**のはどれか。1つ選べ。

- (1) K 県内のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、外食店に協力してもらい、野菜の多い料理を販売・提供してもらう。
- (2) A 大学の学生を対象とし、減塩のための標語コンテストを実施し、入選作品を広報に掲載する。
- (3) K 県の県立病院の受診者を対象に、野菜摂取量増加と減塩の重要性が書かれたチラシを配布する。
- (4) 多くの K 県民が利用する駅構内とバス停に、野菜摂取量増加と減塩の重要性に関するポスターを掲示する。

令和 7 年 3 月 28 日

【照会先】

健康・生活衛生局健康課栄養指導室

室 長 塩 澤 信 良（内線 2978）

室長補佐 田中 早 苗（内線 2333）

試験免許係長 北 さゆみ（内線 2972）

（代表電話）03(5253)1111

（直通電話）03(3595)2440

第 39 回管理栄養士国家試験の合格発表

令和 7 年 3 月 2 日（日）、東京ほか計 9 地区において実施した第 39 回管理栄養士国家試験の合格者を令和 7 年 3 月 28 日（金）午後 2 時に発表しました。

なお、受験者数 16,169 名のうち合格者数は 7,778 名であり、合格率は 48.1%です。

〔配布資料一覧〕

1. 第 39 回管理栄養士国家試験の結果について
2. 第 39 回管理栄養士国家試験正答

1. 第39回管理栄養士国家試験の結果について

令和7年3月2日 実施

令和7年3月28日合格発表

1) 合格基準

配点を1問1点とし、次の合格基準を満たす者を合格とする。

総合点 120点以上／200点

2) 合格状況

受験者16,169名 合格者7,778名 合格率48.1%

(参考) 年次別受験者数、合格者数、合格率

	令和3年 (第35回)	令和4年 (第36回)	令和5年 (第37回)	令和6年 (第38回)
受験者数	16,019	16,426	16,351	16,329
合格者数	10,292	10,692	9,254	8,056
合格率	64.2%	65.1%	56.6%	49.3%

3) 学校区分別合格者状況

	受験者数	合格者数	合格率
管理栄養士養成課程 (新卒)	8,629名	6,908名	80.1%
管理栄養士養成課程 (既卒)	2,101名	234名	11.1%
栄養士養成課程 (既卒)	5,439名	636名	11.7%

2. 第39回管理栄養士国家試験 正答

問番号	正答	問番号	正答	問番号	正答	問番号	正答
1	5	51	5	101	4	151	4
2	5	52	3	102	4	152	4
3	5	53	2	103	4	153	3
4	5	54	4	104	3	154	3
5	4	55	4	105	3	155	2
6	2	56	4	106	3	156	5
7	4	57	4	107	4	157	1
8	2	58	5	108	2	158	5
9	3	59	1	109	3	159	4
10	5	60	2	110	2	160	2
11	4	61	3	111	2	161	5
12	4	62	3	112	4	162	3
13	3	63	1	113	2	163	4
14	4	64	3	114	4	164	3
15	2	65	3	115	4	165	3
16	5	66	3	116	4	166	3
17	3	67	1	117	1	167	3
18	1	68	3	118	5	168	4
19	2	69	5	119	4	169	4
20	3	70	2	120	2	170	2
21	5	71	2	121	4	171	4
22	2	72	3	122	2	172	4
23	1	73	5	123	5	173	3
24	5	74	3	124	3	174	3
25	2	75	5	125	2	175	3
26	4	76	1	126	5	176	3
27	5	77	2	127	5	177	3
28	3	78	4	128	5	178	4
29	2	79	3	129	4	179	2
30	3	80	1	130	3	180	2
31	3	81	4	131	3	181	4
32	5	82	2	132	3	182	4
33	5	83	2	133	4	183	2
34	3	84	1	134	5	184	3
35	1	85	1	135	2	185	3
36	5	86	4	136	4	186	4
37	5	87	5	137	3	187	4
38	4	88	5	138	4	188	3
39	3	89	5	139	5	189	4
40	5	90	2	140	1	190	3
41	3	91	1	141	2	191	2
42	4	92	3	142	3	192	3
43	4	93	3	143	4	193	2
44	4	94	5	144	3	194	3
45	5	95	5	145	5	195	4
46	3	96	2	146	3	196	1
47	3	97	1	147	5	197	2
48	4	98	1	148	3	198	3
49	4	99	3	149	3	199	1
50	4	100	2	150	2	200	4