

Table A.86. Gulf of Maine Atlantic cod fully recruited fishing mortality (F_{full}) from 1982 to 2011 as estimated from the ASAP SAW55_3BLOCK_BASE ($M = 0.2$) and SAW55_3BLOCK_BASE_M_SPLIT (M -ramp) models.

Year	SAW55_3BLOCK_BASE	SAW55_3BLOCK_BASE_M_SPLIT
	Fully recruited F (F_{full})	Fully recruited F (F_{full})
1982	0.73	0.75
1983	0.87	0.89
1984	0.78	0.80
1985	0.91	0.93
1986	0.83	0.85
1987	0.82	0.83
1988	0.62	0.62
1989	0.92	0.93
1990	1.13	1.13
1991	1.26	1.23
1992	1.35	1.31
1993	1.53	1.46
1994	1.45	1.32
1995	0.99	0.86
1996	1.03	0.85
1997	0.92	0.72
1998	0.82	0.61
1999	0.48	0.35
2000	0.62	0.45
2001	0.72	0.51
2002	0.57	0.40
2003	0.67	0.48
2004	0.68	0.50
2005	0.92	0.70
2006	0.78	0.60
2007	0.75	0.60
2008	0.94	0.77
2009	0.98	0.83
2010	0.87	0.79
2011	0.86	0.90