

LINAG Ü7

8.6.5 $K \dots$ Körper $n \in \mathbb{N}$

a) $\forall A \in GL_n(K) \exists P(X) \in K[X]: P(A) = A^{-1}$

$\chi_A(X) = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i$ mit $\chi_A(A) = 0$ laut Cayley-Hamilton

$\sum_{i=1}^{\infty} a_i X^i + a_0 \cdot X^0 = \sum_{i=1}^{\infty} a_i X^i + a_0 E = 0$

$\Leftrightarrow -a_0 E = \sum_{i=1}^{\infty} a_i A^i \Leftrightarrow E = \sum_{i=1}^{\infty} -\frac{a_i}{a_0} A^i = A \cdot \left(\sum_{i=1}^{\infty} -\frac{a_i}{a_0} A^{i-1} \right)$

$\Leftrightarrow A^{-1} = \sum_{i=0}^{\infty} -\frac{a_{i+1}}{a_0} A^i$

$P(X) = \sum_{i=0}^{\infty} -\frac{a_{i+1}}{a_0} X^i \in K[X]$ mit $P(A) = A^{-1}$

b) $A = J_2(1) \in GL_2(K)$ zz: $\nexists P(X) \in K[X]: P(A) = A^T$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} 1-X & 1 \\ 0 & 1-X \end{pmatrix} = (1-X)^2$

$\chi_{A^T}(X) = \det \begin{pmatrix} 1-X & 0 \\ 1 & 1-X \end{pmatrix} = (1-X)^2$

$\Rightarrow \exists \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in K^2: A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x+y \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \dots \text{EV von } A$

$\Rightarrow \exists \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in K^2: A^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ a+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \dots \text{EV von } A^T$

$P(X) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i X^i \quad P(A) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i A^i = \sum_{i=0}^{\infty} b_i A$, da $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} c & c \\ 0 & c \end{pmatrix}$ wenn $c = \sum_{i=0}^{\infty} b_i$ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 1 & 1 \\ 0 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\chi_{P(A)}(X) = \det \begin{pmatrix} c-X & c \\ 0 & c-X \end{pmatrix} = (c-X)^2$

$\Rightarrow \exists \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in K^2: P(A) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} c(x+y) \\ c y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c x \\ c y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \dots \text{EV von } P(A)$

Da $P(A)$ und A^T verschiedene Eigenvektoren besitzen,

bzw. da $P(A) = \begin{pmatrix} c & c \\ 0 & c \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ existiert kein $P(X) \in K[X]$ mit

$P(A) = A^T$.