

NUM UE9

Ida Hönigmann

December 6, 2021

1 Aufgabe 33:

Proof. a) Wie letzte Woche gezeigt gilt $\|A\|_\infty = \sup_{\|x\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty$.

Sei $x \in \mathbb{K}^n$ mit $\|x\|_\infty = 1$ beliebig. Also gilt $\max_{j=1,\dots,n} |x_j| = 1$.

$$\|Ax\|_\infty = \max_{j=1,\dots,m} |(Ax)_j| = \max_{j=1,\dots,m} \left| \sum_{k=1}^n a_{jk} x_k \right| \leq \max_{j=1,\dots,m} \sum_{k=1}^n |a_{jk}| \cdot |x_k| \leq \max_{j=1,\dots,m} \sum_{k=1}^n |a_{jk}|$$

Sei $j \in \{1, \dots, m\}$ mit $\sum_{k=1}^n |a_{jk}|$ maximal. Falls $\sum_{k=1}^n |a_{jk}| = 0$ folgt $\forall k = 1, \dots, n \forall j = 1, \dots, m : a_{jk} = 0$ und somit ist die Aussage klar. Sonst gilt für

$$x = \begin{pmatrix} \operatorname{sgn}(a_{j1}) \\ \operatorname{sgn}(a_{j2}) \\ \dots \\ \operatorname{sgn}(a_{jn}) \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n \quad \|x\|_\infty = 1$$

$$\|Ax\|_\infty = \max_{l=1,\dots,m} \left| \sum_{k=1}^n a_{lk} x_k \right| = \max_{l=1,\dots,m} \left| \sum_{k=1}^n a_{lk} \cdot \operatorname{sgn}(a_{jk}) \right| = \left| \sum_{k=1}^n |a_{jk}| \right| = \sum_{k=1}^n |a_{jk}| = \max_{j=1,\dots,m} \sum_{k=1}^n |a_{jk}|$$

Also folgt $\|A\|_\infty = \max_{j=1,\dots,m} \sum_{k=1}^n |a_{jk}|$.

b) Um $\|A\|_1 = \max_{k=1,\dots,n} \sum_{j=1}^m |a_{jk}|$ zu zeigen schauen wir uns zunächst folgendes an:

Sei $x \in \mathbb{K}^n$ mit $\|x\|_1 = 1$ beliebig. Also gilt $\sum_{j=1}^n |x_j| = 1$.

$$\begin{aligned} |(Ax)_j| &= \left| \sum_{k=1}^n a_{jk} x_k \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n \max_{l=1,\dots,n} |a_{jl}| x_k \right| = \max_{l=1,\dots,n} |a_{jl}| \left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \\ &\leq \max_{l=1,\dots,n} |a_{jl}| \sum_{k=1}^n |x_k| = \max_{l=1,\dots,n} |a_{jl}| \cdot \|x\|_1 = \max_{l=1,\dots,n} |a_{jl}| \\ \Rightarrow \|Ax\|_1 &= \sum_{j=1}^m |(Ax)_j| \leq \sum_{j=1}^m \max_{k=1,\dots,n} |a_{jk}| = \max_{k=1,\dots,n} \sum_{j=1}^m |a_{jk}| \end{aligned}$$

Wähle $j \in \{1, \dots, n\}$ so, dass $\sum_{k=1}^m |a_{kj}|$ maximal ist. Sei $x \in \mathbb{K}^n$ mit $x_j = 1$ und $\forall l \neq j : x_l = 0$.

Dann gilt

$$\begin{aligned} |(Ax)_l| &= \left| \sum_{k=1}^n a_{lk} x_k \right| = |a_{lj}| \\ \|Ax\|_1 &= \sum_{k=1}^m |(Ax)_k| = \sum_{k=1}^m |a_{kj}| = \max_{j=1, \dots, n} \sum_{k=1}^m |a_{kj}| \end{aligned}$$

Also folgt $\|A\|_1 = \max_{k=1, \dots, n} \sum_{j=1}^m |a_{jk}|$.

□

2 Aufgabe 34:

Proof. Sei $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$... irreduzibel und diagonaldominant beliebig.

zz: A ist regulär

Angenommen A wäre nicht regulär, also $\exists x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} : Ax = 0$. Dann folgt

$$\begin{aligned} 0 &= (Ax)_j = \sum_{l=1}^n a_{jl}x_l \\ \implies -a_{jj}x_j &= \sum_{l=1, l \neq j}^n a_{jl}x_l \\ \implies |a_{jj}| \cdot |x_j| &= |a_{jj}x_j| = \left| \sum_{l=1, l \neq j}^n a_{jl}x_l \right| \leq \sum_{l=1, l \neq j}^n |a_{jl}| \cdot |x_l|. \end{aligned}$$

Definieren wir nun $J := \{j \in \{1, \dots, n\} : |x_j| = \|x\|_\infty\}$ und $K := \{k \in \{1, \dots, n\} : |x_k| < \|x\|_\infty\}$.
Offensichtlich gilt $J \cup K = \{1, \dots, n\}$ und $J \cap K = \emptyset$.

Fallunterscheidung:

1. Fall: $K = \emptyset$

Also gilt $|x_1| = |x_2| = \dots = |x_n|$.

$$\begin{aligned} |a_{jj}| \cdot |x_j| &\leq \sum_{l=1, l \neq j}^n |a_{jl}| \cdot |x_l| \\ \implies |a_{jj}| &\leq \sum_{l=1, l \neq j}^n |a_{jl}| \end{aligned}$$

Was ein Widerspruch zu $\forall j \in \{1, \dots, n\} : |a_{jj}| \geq \sum_{l=1, l \neq j}^n |a_{jl}| \wedge \exists j \in \{1, \dots, n\} : |a_{jj}| > \sum_{l=1, l \neq j}^n |a_{jl}|$ ist.

2. Fall: $K \neq \emptyset$

Da A irreduzibel ist $\exists k \in K \exists j \in J : a_{jk} \neq 0$

$$|a_{jj}| \leq \sum_{l=1, l \neq j}^n |a_{jl}| \frac{|x_l|}{|x_j|} = \sum_{l=1, l \neq j}^n |a_{jl}| \underbrace{\frac{|x_l|}{\|x\|_\infty}}_{\leq 1 \wedge \exists l: < 1} < \sum_{l=1, l \neq j}^n |a_{jl}|$$

Was ein Widerspruch zu $\forall j \in \{1, \dots, n\} : |a_{jj}| \geq \sum_{l=1, l \neq j}^n |a_{jl}|$ ist.

In beiden Fällen folgt aus dem Widerspruch, dass A regulär ist.

zz: $\forall j = 1, \dots, n : a_{jj} \neq 0$

Angenommen $\exists j \in \{1, \dots, n\} : a_{jj} = 0$. Da A diagonaldominant ist folgt

$$\begin{aligned} \sum_{k=1, k \neq j}^n |a_{jk}| &\leq |a_{jj}| = 0 \\ \implies \forall k \in \{1, \dots, n\} : |a_{jk}| &= 0 \end{aligned}$$

Was im Widerspruch zur Regularität von A steht.

Also folgt, dass A regulär und $\forall j \in \{1, \dots, n\} : a_{jj} \neq 0$. □