数I

集合と命題

・集合 … 範囲がはっきりしたものの集まり

・要素 … 集合を構成するもの

(例) 1から10までの自然数の集まり

$$\overbrace{\{\underset{\text{要素}}{\underline{1}},\ \underset{\text{要素}}{\underline{2}},\ \underset{\text{要素}}{\underline{3}},\ \underset{\text{要素}}{\underline{4}},\ \underset{\text{要素}}{\underline{5}},\ \underset{\text{要素}}{\underline{6}},\ \underset{\text{要素}}{\underline{7}},\ \underset{\text{要素}}{\underline{8}},\ \underset{\text{要素}}{\underline{9}},\ \underset{\text{要素}}{\underline{10}}\}}^{\text{集合}}$$

x が集合Aに属するとき $x \in A$ と書く.

x が集合Aに属さないとき $x \notin A$ と書く.

練習 1 有理数全体の集合を Q とする。次の□に適する記号 $\in$ または $\notin$ を入れよ。

(1) $4 \square Q$ (2) $-\frac{2}{3} \square Q$

(3) $\sqrt{2} \square Q$

(1) $4 \in Q$ (2) $-\frac{2}{3} \in Q$ (3) $\sqrt{2} \notin Q$

集合には2通りの書き表し方がある

① 集合Aの要素を全て並べる. ⇒ $A=\{a_1, a_2, a_3, \cdots\}$

(例) 1から10までの自然数の集合A　$A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

② 集合Aの式と条件のみを書く. ⇒ $A=\{$式$\mid$条件$\}$

(例) 1から10までの自然数の集合A　$A=\{x \mid x$は1から10までの自然数$\}$

練習 2 次の集合を，要素を書き並べて表せ。

(1) 20 の正の約数全体の集合 A

(2) $B=\{x \mid x$ は 10 以下の正の奇数$\}$

(3) $C=\{3n+1 \mid n=0, 1, 2, 3, \cdots\cdots\}$

(1) $A=\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$

(2) $B=\{1, 3, 5, 7, 9\}$

(3) $C=\{1, 4, 7, 10, \cdots\}$

・部分集合…集合Aの要素の全てが集合Bに含まれているときの集合A



このとき、AはBに含まれる → $A \subset B$ と書く

BはAを含む → $B \supset A$ と書く。

また、AとBの要素が一致しているとき $A = B$. AとBは等しい。

(例) 集合Aを10以下の正の奇数, 集合Bを1から10までの自然数とすると

$A \subset B$ が成立。

・空集合…要素が1つもない集合. 記号 $\emptyset$ (ファイ) で表す.

空集合は全ての集合の部分集合である.

練習 3 次の 2 つの集合の関係を，⊂，＝を使って表せ。

(1) $A=\{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$，$B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$

(2) $C=\{1,\ 2,\ 5,\ 10\}$，$D=\{x \mid x$ は 10 の正の約数$\}$

(3) $P=\{x \mid x$ は 12 以下の自然数$\}$，$Q=\{x \mid x$ は 12 の正の約数$\}$

(1) $A \subset B$

(2) $D=\{1,2,5,10\}$ より

$C=D$

(3) $P=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$

$Q=\{1,2,3,4,6,12\}$

$P \supset Q$

練習 4 次の集合の部分集合をすべてあげよ。

(1) $\{1,\ 2\}$ (2) $\{a,\ b,\ c\}$

(1) $\emptyset$

$\{1\}, \{2\}$

$\{1, 2\}$

(2)

$\emptyset$

$\{a\}, \{b\}, \{c\}$

$\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$

$\{a, b, c\}$

・共通部分…集合Aと集合Bの両方に属する要素の集合

$A \cap B$ と表す.（共通部分がない場合 $A \cap B$ の要素は $\emptyset$）

・和集合…集合A, 集合Bの少なくともどちらか一方に属する要素の集合

$A \cup B$ と表す.



練習 5 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6\}$, $B=\{2,\ 4,\ 6,\ 8\}$, $C=\{1,\ 3\}$ について，次の集合を求めよ。

(1) $A \cap B$　　(2) $A \cup B$

(3) $B \cap C$　　(4) $B \cup C$

(1) $A \cap B = \{2,\ 4,\ 6\}$

(2) $A \cup B = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8\}$　(3) $B \cap C = \emptyset$

(4) $B \cup C = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8\}$

- 補集合 … 全体集合Uの部分集合Aに対して,Uの要素であるがAに属さない要素の集合.全体集合Uの部分集合Aの補集合は$\overline{A}$と表す.

- 全体集合 … 集合Aを部分集合にもつ集合.全体集合はUで表す.



左図のように要素が入っているとき

$U=\{a, b, c, d, e, f\}$

$A=\{a, b, c\}$

$\overline{A}=\{d, e, f\}$

補集合の性質

Uを全体集合とし，A，Bをその部分集合とするとき

$$A\cap\overline{A}=\varnothing,\quad A\cup\overline{A}=U,\quad \overline{\overline{A}}=A$$

$A\subset B$ ならば $\overline{A}\supset\overline{B}$

練習 6 例 7 の集合 U と A，B について，次の集合を求めよ。

(1) $\overline{B}$　　(2) $\overline{A \cap B}$　　(3) $\overline{A} \cap \overline{B}$

(4) $\overline{A} \cup \overline{B}$　　(5) $\overline{A} \cap B$　　(6) $A \cap \overline{B}$



$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 6\}$

$\overline{A} = \{4, 5, 6\}$, $\overline{B} = \{1, 2, 4, 5\}$

(1) $\overline{B} = \{1, 2, 4, 5\}$　　(2) $\overline{A \cap B} = \{1, 2, 4, 5, 6\}$　　(3) $\overline{A} \cap \overline{B} = \{4, 5\}$

(4) $\overline{A} \cup \overline{B} = \{1, 2, 4, 5, 6\}$　　(5) $\overline{A} \cap B = \{6\}$　　(6) $A \cap \overline{B} = \{1, 2\}$

ド・モルガンの法則

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$\overline{A}$ と $\overline{B}$ は，それぞれ図[1]と図[2]の斜線部分であり，その共通部分 $\overline{A} \cap \overline{B}$ は，図[3]の斜線部分である。

図[3]の斜線部分は $\overline{A \cup B}$ であるから，$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ が成り立つ。

[1] $\overline{A}$　　[2] $\overline{B}$　　[3] $\overline{A} \cap \overline{B}$



練習 7　$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ が成り立つことを，図を用いて確かめよ。

[1] $\overline{A}$　　[2] $\overline{B}$



[1] [2] より $\overline{A} \cup \overline{B}$ は $\overline{A \cap B}$ なので

$\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B}$

$\overline{A \cap B}$



・3つの共通部分と和集合

3つの集合の共通部分… 3つの集合A, B, Cのすべてに属する要素全体の集合

$A \cap B \cap C$ と書く。

3つの集合の和集合…A, B, Cの少なくとも1つに属する要素全体の集合

$A \cup B \cup C$ と書く。

練習 1 $A=\{1, 2, 3, 6\}$, $B=\{2, 3, 4, 5, 6\}$, $C=\{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ について，$A \cap B \cap C$ と $A \cup B \cup C$ を求めよ。

$A \cap B \cap C = \{2, 6\}$

$A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$

・命題 …一般に正しいか正しくないかが定まる文や式

命題が正しいときその命題は真である.

命題が正しくないときその命題は偽である.

・条件 … 文字xを含む文や式でxに値を代入することで真偽が定まるもの

全体集合 … 条件を考えるときの条件に含まれる文字を要素とする集合

練習 9 次の命題の真偽を述べよ。

(1) 円周率 π は有理数である。

(2) 実数 -1 について $(-1)^2 \geqq 0$ である。

(1) πは無理数なので偽

(2) 真

命題 $p \Longrightarrow q$

1　命題 $p \Longrightarrow q$ は，「p を満たすものはすべて q を満たす」ということを表す。

2　条件 p を満たすもの全体の集合を P，条件 q を満たすもの全体の集合を Q とするとき，「命題 $p \Longrightarrow q$ が真である」と「$P \subset Q$ が成り立つ」とは同じことである。

p：仮定
q：結論

練習 10　次の条件 p，q について，命題 $p \Longrightarrow q$ の真偽を，集合を用いて調べよ。

(1)　実数 x に関する 2 つの条件　　p：$x \leqq 2$，q：$x \leqq 4$

(2)　自然数 m に関する 2 つの条件

　　p：m は 12 の正の約数，q：m は 24 の正の約数

(3)　実数 x に関する 2 つの条件　　p：$-1<x<1$，q：$x>0$

(1) 2つの集合P, Qを

$P=\{x \mid x \leqq 2\}$

$Q=\{x \mid x \leqq 4\}$ とする.



上図より $P \subset Q$ なので 真

(2)

2つの集合P, Qを

$P=\{m \mid m$ は12の正の約数$\}$

$Q=\{m \mid m$ は24の正の約数$\}$ とする.

$P=\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

$Q=\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$

$P \subset Q$ より 真

(3) 2つの集合P, Qを

$P=\{x \mid -1<x<1\}$

$Q=\{x \mid x>0\}$ とする.



$P \subset Q$ ではないので 偽

・反例…命題 $p \Rightarrow q$ が偽であることを示す例

練習 11 n は自然数とする。次の命題が偽であることを示せ。

n が素数ならば，n は奇数である。

$n=2$ は素数だが偶数なのでこの命題は偽である.

2つの条件 p, q について

・命題 $p \Rightarrow q$ が真であるとき

p は q であるための十分条件

q は p であるための必要条件





・命題 $p \Rightarrow q$ が成り立つかつ $q \Rightarrow p$ が成り立つとき

p は q であるための必要十分条件である。
q は p であるための必要十分条件である。

（このとき p と q は同値 $(p = q)$ である。）

条件 p, q を満たすもの全体の集合を P, Q とすると，$p \Leftrightarrow q$ が成り立つことと $P = Q$ は同じ。

練習 12 x，y は実数とする。次の $\boxed{}$ に，「必要」，「十分」のうち，適する言葉を入れよ。

(1) $x=-2$ は $x^2=4$ であるための $\boxed{\text{十分}}$ 条件である。

(2) $x>0$ は $x>1$ であるための $\boxed{\text{必要}}$ 条件である。

(3) $x=y$ は $(x-y)x=0$ であるための $\boxed{\text{十分}}$ 条件である。

練習 13

x, y, z は実数とする。次の中で，$x=y$ と同値な条件をすべて選べ。

① $x+z=y+z$　② $x^2=y^2$　③ $(x-y)^2=0$

①は両辺から z を引くと $x=y$

②は $x=\pm y$

③は $x-y=\pm 0 \Rightarrow x=y$

よって①と③

練習 14

x, y は実数とする。次の $\boxed{}$ に，

「必要条件であるが十分条件ではない」，

「十分条件であるが必要条件ではない」，

「必要十分条件である」

のうち，適する言葉を入れよ。

(1) △ABC が正三角形であることは，△ABC が二等辺三角形であるための $\boxed{}$。

(2) $x<3$ は $-1<x<1$ であるための $\boxed{}$。

(3) $|x|=|y|$ は $x^2=y^2$ であるための $\boxed{}$。

(1) 十分条件であるが必要条件でない

(2) 必要条件であるが十分条件でない

(3) 必要十分条件である.

・条件の否定 … 条件 p に対して存在する「p でない」条件. p に対して $\overline{p}$ で表す.

練習 15 n は自然数とする。次の条件の否定を述べよ。

(1) n は偶数である　　(2) n は5より小さい

(1) n は奇数である.　(2) n は5以上である.

全体集合を U とし，U の要素の中で，条件 p，q を満たすもの全体の集合を，それぞれ P，Q で表す。

条件「p かつ q」，「p または q」，$\overline{p}$ と集合の関係は，次のようになる。

条件	p かつ q
集合	$P \cap Q$



条件	p または q
集合	$P \cup Q$



条件	$\overline{p}$
集合	$\overline{P}$



「かつ」の否定，「または」の否定

$$\overline{p \text{ かつ } q} \iff \overline{p} \text{ または } \overline{q}$$

$$\overline{p \text{ または } q} \iff \overline{p} \text{ かつ } \overline{q}$$

「ともに」の否定は「少なくとも一方」

「少なくとも一方」の否定は「ともに」

練習 16 x，y は実数とする。次の条件の否定を述べよ。

(1) $x \geqq 0$ かつ $y \geqq 0$　　(2) $x = 0$ または $y = 0$

(3) x，y はともに有理数

(1) $x < 0$ または $y < 0$　(2) $x \neq 0$ かつ $y \neq 0$

(3) x, y の少なくとも一方は無理数

命題 $p \Longrightarrow q$ に対して

$q \Longrightarrow p$ を $p \Longrightarrow q$ の **逆**

$\overline{q} \Longrightarrow \overline{p}$ を $p \Longrightarrow q$ の **対偶**

$\overline{p} \Longrightarrow \overline{q}$ を $p \Longrightarrow q$ の **裏**

という。命題 $p \Longrightarrow q$ とその逆，対偶，裏は，互いに右の図のような関係にある。



もとの命題が真であっても，その逆が真であるとは限らない。

※ 対偶の真偽は一致する.

練習 17 x，y は実数とする。次の命題の真偽を調べよ。また，その逆，対偶，裏を述べ，それらの真偽を調べよ。

(1) $x > y \Longrightarrow x - y > 0$　　(2) $x \neq 0 \Longrightarrow xy \neq 0$

(1) 真

逆 $x - y > 0 \Rightarrow x > y$ 真

裏 $x \leqq y \Rightarrow x - y \leqq 0$ 真

対偶 $x - y \leqq 0 \Rightarrow x \leqq y$ 真

(2) 偽

逆 $xy \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$ 真

裏 $x = 0 \Rightarrow xy = 0$ 真

対偶 $xy = 0 \Rightarrow x = 0$ 偽