


(1) בסעיפים a, b, c לא היו שינויים כלשהם שנראו לעין.

(2) כמו שיישמנו קודם כל מצאנו את ה $n1$ seams באוריינטציה הראשונה ואז מחקנו אותם ומצאנו את ה $n2$ seams באוריינטציה השנייה. כאשר אנו מוצאים $n2$ seams באוריינטציה השנייה הפעולה של ה $find$ seams מתרחשת על תמונה קטנה יותר שכן הורדנו כבר $n1$ seams באוריינטציה הראשונה. כשאנחנו מציירים את ה $n2$ seams בתמונה הגדולה יותר אז זה נראה כאילו מופיעים חורים, החורים האלו הם בעצם התוצאה של ה $n1$ seams שהורדנו בהתחלה מהתמונה



(3) בסעיף זה אנחנו קודם כל משכפלים את ה $n1$ seams באוריינטציה הראשונה ולאחר מכן אנו מוצאים את ה $n2$ seams של האוריינטציה השנייה. מכיוון שה $n2$ seams שאנו מוצאים מצאים על תמונה יותר גדולה אז זה אומר שהם ארוכים יותר ולכן כשאנחנו מציירים אותם אנחנו חותכים ועולים על כמה מה $n1$ seams.

