## INDEX OF A.D.L.

## INDEX DES ACTIVITES DE LA VIE QUOTIDIENNE

**SPECIFICITE** 

\* \* \*

TYPE D'INSTRUMENT

Echelle ordinale de 6 items à 7 degrés

REFERENCE

Katz (S.), Downs (T.D.), Cash (H.R.), Grotz (R.C.) - Progress in development of the index of

ADL. Gerontologist, Spring 1970, Part 1, 20-30.

Langue

Version originale publiée en anglais.

U.S.A.

Localisation

Figure en annexe page 132

Voir réf. biblio nº 6

Pour toute information concernant l'instrument, s'adresser à l'auteur à l'adresse suivante:

Sidney Katz,

Office of Health Services Education and Research

College of Human Medicine Michigan State University

A110 East Fee Hall

East Lansing, Michigan 48824, U.S.A.

ORIGINE

Cet instrument original inspiré par des travaux antérieurs de l'auteur (réf. 7, 8, 9, 10) et d'autres publications de Dyar (réf. 1), Ford (ref. 2), Steinberg (réf. 15), a été réalisé par l'équipe de l'Hôpital Benjamin

Rose de l'Université de Cleveland. Il a servi de point de départ à des versions ulterieures (ref. 5).

BUT

Il a été conçu dans le but de mettre au point une méthode objective d'évaluation des activités de la

vie quotidienne.

POPULATION

Toute population âgée vivant en institution.

MODE DE

Evaluateur: Médecin, infirmier(e), travailleur social.

PASSATION

Temps de passation: 20 minutes.

Entraînement: Nécessaire.

Cotation: Six items à 7 degrés appréciant des niveaux de dépendance.

VARIABLES

Les variables appréciées concerment les 6 activités suivantes:

· Habillage

Continence

· Toilette

· Alimentation

Déplacements

· Soins personnels

**APPLICATIONS** 

Clinique:

- Pronostic et prévention

· Evaluation des effets de traitements

Recherche:

· Enquêtes épidémiologiques

· Enseignement

· Formation en matière de soins et réeducation

Nom:	Date d'évaluation/
Pour chaque fonction, il importe de respecter la desc	ription du niveau de dépendance
Nom:	Pas d'aide (entre et sort sons aide du bain ou de la douche)
	Aide pour une partie du corps (p.ex. le dos ou les membres inférieurs)
	Aide plus importante (p.ex. pour plusieurs parties du corps)
S'habiller sortir les vêtements de la penderie ou de l'armoire, les enfiler et boucler la ceinture	Pas d'assistance
	Aide uniquement pour lacer ou enfiler les chaussures
	Aide pour prendre les vêtements, les ensiler
Utilisation des sanitaires se déplace aux toilettes, s'essuie et se rajuste	Pas d'nide (entre et sort sans oide du bain ou de la douche)
	Aide pour une partie du corps (p.ex. le dos ou les membres inférieurs)
	Aide plus importante (p.ex. pour plusieurs porties du corps)
Assurer les transferts	Descend du lit ou se lève du fauteuil sans aide (oïdes de morche occeptés)
	Aide partielle
	O Incapable de sortir seul du lit
Continence	Continence assurée au plan fécal et urinaire
	Accidents "occasionnels"
	Assistance et surveillance; incontinence totale ou sonde
Alimentation	O Pas d'aide
	Aide particlle (couper la vionde, beuner le poin)
	Aide plus globale. Alimentation entérale ou parentérale
Le score est établi selon les critères suivants:  Classe A= indépendant pour tout  Classe B= indépendant pour tout sauf une fonction  Calsse C= indépendant pour tout sauf pour une fonction  Classe D= indépendant pour tout sauf pour une fonction  Classe E= indépendant pour tout sauf pour une fonction et déplacements  Classe G= dépendant pour tout	n et la tcilette n et pour la toilette et l'habillage n et pour la toilette, l'habillage et l'utilisation des toilettes et pour la toilette, l'habillage, l'utilisation des toilettes et les