

# İkinci Kuvvette Karşılıklılık

Ayberk Zeytin, İbrahim Emir Çiçekli / azeytin@gsu.edu.tr,  
IbrahimEmir.Cicekli@ogr.gsu.edu.tr

Bu yazıda tek bilinmeyenli tamsayı katsayılı denklemlerin çözümüyle ilgileniyor olacağız. Böyle denklemleri ilk olarak derecesine göre sınıflandırırız. Okuyucuların daha ilkökul çağlarından da hissedebileceği gibi derece yükseldikçe denklemlerin çözümleri zorlaşır. Bu noktada yardımımıza yetişen tekniklerden bir tanesi de denklemleri çeşitli modlara indirgeyerek çözmeye çalışmaktır. Örneğin, verilen  $a$  ve  $b$  tamsayıları için  $ax + b = 0$  şeklinde bir denkleminin  $-b/a$  şeklinde verilen rasyonel çözümü yerine modülo  $m$ 'de çözmeye çalışabiliriz. Bu durumda, dikkatli okuyucunun da hemen farkına varacağı üzere bu denklemin modülo  $m$ 'de çözümü  $x = -b/a$  yerine  $x = -ba^{-1}$  şeklinde ifade edilir ki buradan da hemen  $a$ 'nın modülo  $m$ 'de çarpmaya göre tersinin olmasının gerekliliği (ve yeterliliği) görülür. Bu da elbette ki  $a$  ile  $m$ 'nin aralarında asal olmasına denktir.

Dereceye göre tasnifte bir sonraki durum ikinci dereceden denklemler. Verilen  $a, b, c$  tamsayıları için  $ax^2 + bx + c = 0$  şeklindeki tamsayı katsayılı denklemlerinin çözümü, hepimizin aşına olduğu  $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$  ile verilir. Bu çözümü birinci derece olduğu gibi modülo  $m$ 'de ifade edilmesi esnasında en büyük engelin karekök fonksiyonu olduğu hemen göze çarpar. Bu yazıda bu problemi biraz daha genel bir perspektiften ele alacağız. Elde ettiğimiz sonuçları ikinci kuvvette karşılıklılığı ispatlamak üzere kullanacağız. İspatımızda geçecek olan karakterler ve Gauss toplamları gibi bazı kavramlara derinine inmeden değineceğiz. Her iki konunun da ayrı yazılarda detaylandırılmayı hak ettiğini düşünüyoruz.

## 1 Grup Karakterleri

Bu bölümde başrol oyuncusu  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  halkası olacak. Bu halkanın çarpma işlemi altında tersinir elemanlarını kümesini  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  ile göstereyim. Bu küme çarpma işlemi altında bir gruptur. Aşağıda bu grubun karakterlerini tanımlayacağız. Bu karakterleri tamsayılar kümesine genişleterek Dirichlet karakterlerini elde edeceğiz.

**Tanım.**  $m$  bir doğal sayı olsun.  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  grubundan  $\mathbb{C}^\times$  grubuna tanımlı her homomorfie bir karakter, ya da belirtilmesi gerekli olduğu durumda

modülo  $m$ 'de bir karakter denir. Modülo  $m$ 'deki karakterlerin kümesini

$$X(m) := \text{Hom}((\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times, \mathbb{C}^\times)$$

ile göstereceğiz.

Örneğin, modülo 2'de sadece 1 tane karakter var, zira  $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times = \{1\}$ . Modülo 3'de bakacak olursak iki karakter göreceğiz  $((\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times = \{1, 2\})$  : her elemanı 1'e gönderen  $\chi_1$  homomorfisi ve 1'i 1'e ve 2'yi  $-1$ 'e gönderen  $\chi_2$ .

$X(m)$  kümesi içinde verilen herhangi  $\chi, \chi'$  için,

$$(\chi \cdot \chi')(x) := \chi(x)\chi'(x)$$

(noktasal çarpma) işlemini tanımlayabiliriz. Yukarıda modülo üç için tarif edilen  $\chi_2$  karakterine bakacak olursak :

$$1 \cdot \chi_2 = \chi_2, \text{ ve}$$

$$\chi_2 \cdot \chi_2 = 1$$

eşitliklerini görebiliriz. Verilen herhangi iki karakter için :

$$\begin{aligned} (\chi \cdot \chi')(xy) &= \chi(xy)\chi'(xy) \\ &= \chi(x)\chi(y)\chi'(x)\chi'(y) \\ &= \chi(x)\chi'(x)\chi(y)\chi'(y) \\ &= (\chi \cdot \chi')(x)(\chi \cdot \chi')(y). \end{aligned}$$

Dolayısıyla iki karakterin çarpımı da gerçekten bir karakterdir. Okuyucunun da tahmin edeceği üzere :

**Teorem 1.**  $X(m)$  kümesi yukarıda tanımlanan noktasal çarpma işlemi altında bir abelyen gruptur.

**Kanıt.** Birleşme özelliği, işlemimizin tanımı gereği,  $\mathbb{C}^\times$ 'de çarpmanın birleşme özelliğinden geliyor. Bunu yazmayı okura bırakıyoruz. Birim elemanımız  $1(x) := 1$  olarak tanımlanan birim homomorfimiz. Herhangi bir karakter  $\chi \in X(m)$ 'in tersi ne olmalı? Diyelim ki bu ters eleman  $\psi \in X(m)$  ile gösterilsin. Her  $x$  için,

$$(\chi \cdot \psi)(x) = \chi(x)\psi(x) = 1 \Leftrightarrow \psi(x) = 1/\chi(x).$$

Yani  $\psi(x) = \frac{1}{\chi(x)} \in X(m)$  bizim  $\chi$  karakterimizin tersiymiş.  $\psi$ 'yi  $\chi^{-1}$  olarak göstereyim. Ancak bu  $\psi$ 'yi daha detaylı incelemekte fayda var.

Mertebesi  $d$  olan herhangi bir  $t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  için  $1 = \psi(1) = \psi(t^d) = \psi(t)^d$  olduğundan,  $\psi(t)$ ,

$x^d - 1$  polinomunun bir köküdür. Yani her elemanın  $\psi$  altında görüntüsü bir  $d$  için  $x^d - 1$  şeklindeki bir polinomun kökü olacak. Ancak bu geometrik olarak, karakterler grubun elemanlarını karmaşık düzlemde orijin merkezli birim çembere gönderiyor demek. Yani her  $x$  için,  $|\psi(x)| = 1$ .

O zaman,

$$\chi^{-1}(x) = \frac{1}{\chi(x)} = \frac{\overline{\chi(x)}}{\chi(x)\overline{\chi(x)}} = \frac{\overline{\chi(x)}}{|\chi(x)|^2} = \overline{\chi(x)}.$$

Yani  $\chi$  karakterinin tersi tamı tamına  $\chi$  karakterinin karmaşık eşleniğiymiş. Bundan ötürü karakterlerin terslerini karmaşık eşlenik sembolüyle göstereceğiz.

Grubun değişme özelliği karakterlerin görüntü kümesi  $\mathbb{C}^\times$ 'in değişme özelliğinden gelir.

Eğer  $\chi$  karakterinin mertebesi 2 ise, yani  $\chi(t) \in \{\pm 1\}$  ve  $\chi(t) \neq 1$  ise,  $\chi$ 'ya **kuadratik** karakter diyelim. Örneğin,  $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$  grubu 2 tarafından üretilir. Dolayısıyla  $\varphi : (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$  fonksiyonu  $t = 2^k \mapsto (-1)^k$  kuralıyla tanımlanırsa bir homomorfi ve dolayısıyla bir kuadratik karakter olacaktır.

Birazdan listeleyeceğimiz sonuçların bir kısmı  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  grubunun döngüsel olmasına dayanıyor. Ancak bu grup her zaman döngüsel değil. Örneğin  $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ , zira gruptaki birimden farklı her üç elemanın da mertebesi 2. Okuyucunun  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  grubunun döngüsel olması için  $p$  tek bir asal sayı ve  $k$  bir pozitif tamsayı belirtmek üzere  $m = 1, 2, 4, p^k, 2p^k$  koşulunun gerek ve yeterli olduğuna inanmasını isteyelim. Meraklı okuyucu bir ispat için Gauss'un meşhur "Disquisitiones Arithmeticae" kitabında ispatı arayabilir. Akışı bozmamak adına buradan itibaren  $m = 1, 2, 4, p^k, 2p^k$  olarak kabul edeceğiz.

1.  $X(m)$ 'in mertebesi nedir? Öncelikle döngüsel gruplar üzerinde tanımlı homomorfilerin, üreticilerinin görüntüsü tarafından belirlendiğini fark edelim. Diyelim ki  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  grubu  $\omega$  ile üretiliyor. Herhangi bir  $x \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ ,  $\omega$  cinsinden  $x = w^t$  olarak yazılsın. Öyleyse

$$\chi(x) = \chi(w^t) = \chi(w)^t$$

olur. Homomorfinin üreticinin görüntüsü tarafından belirlenmesi demek, bir homomorfi yazarken üretici nereye gönderdiğini söylediğin anda homomorfi belirlendi demek. Dolayısıyla üreticinin gidebileceği görüntü sayısı kadar muhtemel homomorfi var.

Bir önceki ispatımızda her elemanın  $\chi$  altında görüntüsü bir  $d$  için  $x^d - 1$  şeklindeki bir polinomun kökü olacak demistik. Bu durumda

üretici göz önünde bulundurduğumuza göre  $d$ 'miz  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 'nin eleman sayısı olmalı. Bu sayı meşhur Euler'in  $\varphi$  fonksiyonuyla gösterilir.  $\varphi(m)$  fonksiyonu  $m$  ile aralarında asal ve  $m$ 'den küçük doğal sayıların adedini verir. Bu da tamı tamına  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  grubunun eleman sayısıdır. Yani  $\chi$  karakteri  $\omega$  elemanını,  $x^{\varphi(m)} - 1$  polinomun köklerinden birine gönderiyor. Karmaşık sayılarda bu polinomun  $\varphi(m)$  tane kökü var. Bu da  $\omega$  üreticinin muhtemel  $\varphi(m)$  görüntüsü var demek. Her bir ihtimal bir homomorfi verdiğine göre  $\#X(m) = \varphi(m)$ .

2.  $X(m)$  kümesinin elemanlarının  $\mathbb{Z}$ 'ye doğal bir genişlemesi var. Buna da  $\chi$  ile ilişkili modülo  $m$  Dirichlet karakteri deniyor ve şöyle tanımlanıyor: Herhangi bir  $a \in \mathbb{Z}$  için,

$$\tilde{\chi}(a) = \begin{cases} \chi(a + m\mathbb{Z}), & \text{eğer } (a, m) = 1 \text{ ise} \\ 0, & \text{eğer } (a, m) > 1 \text{ ise} \end{cases}$$

Yani  $a$  tamsayısının modülo  $m$ 'de kalan sınıfını buluyor, sonra kalan sınıfını  $\chi$  ile değerlendiriyoruz.

3. Ayrıca elimizde şöyle bir eşitlik var.

$$\sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t) = \begin{cases} \varphi(m), & \text{eğer } \chi = 1 \text{ ise} \\ 0, & \text{eğer } \chi \neq 1 \text{ ise} \end{cases}$$

Bu eşitliği hemen görmek mümkün.  $\chi$  esas karakter olduğunda da bu toplamın grubun eleman sayısını sayacağını hemen görüyoruz. Diğer durumda, yani  $\chi$  karakterinin birim karakter olmadığını varsaydığımızda en az bir  $k \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  için  $\chi(k)$  sayısı 1'den farklı olmalı. O zaman grubunun her elemanını  $k$  ile çarpmak grubun elemanlarının bir permütasyonundan başka bir şey değil, dolayısıyla

$$\begin{aligned} \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t) &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(kt) \\ &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(k)\chi(t) \\ &= \chi(k) \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t). \end{aligned}$$

eşitliğini elde edeceğiz.  $\chi(k) \neq 1$  olduğuna göre, toplam sıfır olmalı. Bu "elemanları kaydırma" hamlesinin bu konuda ve özellikle de bu yazıda sıkça istifade edilen bir yöntem olduğunu okura şimdiden iletelim.

**Tanım.**  $k \mid n$  olacak şekilde  $k$  ve  $m$  doğal sayıları alalım.  $\psi \in X(k)$  ve  $\chi \in X(m)$  iki karakter olsun.

Eğer  $(a, m) = 1$  eşitliğini sağlayan her  $a \in \mathbb{Z}$  için  $\tilde{\chi}(a) = \tilde{\psi}(a)$  eşitliği de varsa,  $\tilde{\chi}$ 'ya  $\tilde{\psi}$ 'den *türetilmiş karakter* denir. Bir  $\chi \in X(m)$  için,  $\tilde{\chi}$ ,  $m$  tam sayısının öz bölenlerinden gelen hiçbir karakterden türetilmiyorsa  $\tilde{\chi}$  karakterine *ilkel karakter* denir.

Misal  $\chi \in X(9)$  Dirichlet karakteri şöyle tanımlanmış olsun:

$$\begin{aligned}\chi(1) &= \chi(4) = \chi(7) = 1 \\ \chi(2) &= \chi(5) = \chi(8) = -1 \\ \chi(3) &= \chi(6) = \chi(9) = 0\end{aligned}$$

Bariz bir şekilde 3-periyodiklik var. Dolayısıyla bu karakterin  $\psi(1) = 1, \psi(2) = -1, \psi(3) = 0$  ile tanımlanmış  $\psi \in X(3)$  karakterinden türetilmiş olduğunu görüyoruz. Eğer  $p$  bir asal sayıysa her  $\chi \in X(p)$ 'nin ilkel karakter olduğunu doğrulamak bu tanımın anlaşılmasını sağlayacak güzel bir alıştırmadır.

## 2 Gauss toplamları

Verilen bir tek  $p$  asal sayısı ve bir tamsayı  $a$  için Legendre sembolü :

$$\left(\frac{a}{p}\right) := \begin{cases} 0 & (a, p) = p \text{ ise} \\ 1 & a \equiv b^2 \pmod{p} \\ & \text{eşitliğini sağlayacak bir} \\ & b \text{ tamsayısı var ise} \\ -1 & \text{diğer hallerde} \end{cases}$$

olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, Legendre sembolü verilen bir tek  $p$  asal sayısı ve  $p$  ile bölünmeyen bir  $a$  tamsayısı için - yazının başında da değinildiği üzere -  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  elemanının yine aynı halka içinde karekökü var ise 1, aksi takdirde -1 sonucu vermektedir. Ya da daha gayri resmi bir dille ifade etmek gerekirse  $(a, p) \neq p$  ise

$$\left(\frac{a}{p}\right) = 1 \Leftrightarrow \sqrt{a} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

Hatırlanacağı üzere  $p$  bir tek asal, ve dolayısıyla  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$  grubu dögüsel.  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \langle \alpha \rangle$  olacak  $\alpha$  seçecek olursak bir  $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$  tamsayısı için  $a = \alpha^k$  olmalı. Buradan hareketle :

$$\begin{aligned}\left(\frac{a}{p}\right) &= 1 \Leftrightarrow k \text{ çift tamsayı, ve} \\ \left(\frac{a}{p}\right) &= -1 \Leftrightarrow k \text{ tek tamsayı.}\end{aligned}$$

Dolayısıyla  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  halkasında:

- eğer iki sayının karekökünü alabiliyorsa çarpımlarının da karekökünü alabiliriz,

- eğer iki sayının karekökünü alamıyorsa çarpımlarının karekökünü alabiliriz, ve
- eğer iki sayıdan birinin karekökünü alabiliyor ancak diğerinin alamıyorsa, çarpımlarının karekökünü alamayız.

Yukarıdaki çıkarımlardan  $\left(\frac{\cdot}{p}\right)$  ile tanımlanan Legendre sembolünün modülo  $p$  kuadratik bir karakter tanımladığını hemen görürüz. Gauss birazdan tanımlayacağımız toplamları Legendre sembolünü kullanarak tanımladı. Biz ise biraz daha genelleştirip modülo  $m$  karakterler için tanımlayacağız. Önce bir gösterim :

$$\zeta_m = e^{\frac{2\pi i}{m}} = \cos\left(\frac{2\pi}{m}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{m}\right)$$

olsun. Dolayısıyla  $\zeta_m$ ,  $z^m - 1$  polinomunun bir köküdür.

**Tanım.** Herhangi bir  $\chi \in X(m)$  ve  $\alpha \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  ikilisi için,  $(\chi, \alpha)$  ile ilişkili Gauss toplamı aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\tau(\chi, \alpha) := \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t) \zeta_m^{\alpha t}$$

Basit bir durum için bir Gauss toplamı hesaplayarak tanım daha iyi anlayalım.  $m$  tamsayısının bir asal - dolayısıyla  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  grubunun dögüsel - olduğunu düşünelim. Örneğin  $\chi = 1$  ve  $\alpha = 1$  için,

$$\begin{aligned}\tau(1, 1) &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} 1(t) \zeta_m^t \\ &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \zeta_m^t \\ &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} e^{\frac{2\pi i t}{m}} \\ &= \sum_{i=1}^{m-1} e^{\frac{2\pi i i}{m}}\end{aligned}$$

0'dan  $m-1$ 'e kadar topluyor olsaydık  $z^m - 1$ 'in köklerini toplamış olurduk ve bu toplam da 0'a eşit olurdu. Ancak  $i = 0$ 'lı terim eksik olduğuna göre,

$$\tau(1, 1) = \sum_{i=1}^{m-1} e^{\frac{2\pi i i}{m}} = -1$$

olmalı.

Grup karakterleri doğal bir biçimde  $\mathbb{Z}$ 'ye genişletilebildiği gibi, Gauss toplamının tanımı da  $\mathbb{Z}$ 'ye genişletilebiliyor. Herhangi bir  $a \in \mathbb{Z}$  için,

$$\tau(\chi, a) = \tau(\chi, a + m\mathbb{Z})$$

şeklinde tanımlansın. Yani önce  $a$ 'nın modülo  $m$ 'de kalan sınıfını bulup ondan sonra Gauss toplamında değerlendirelim. Yazı boyunca, kafa karışıklığına sebep olmayacağını düşündüğümüz yerlerde,  $\tilde{\chi}$  yerine  $\chi$  yazacağız. Ayrıca,  $\tau(\chi)$  yazdığımızda  $\tau(\chi, 1)$  toplamını kastettiğimizde anlaşalım. Gauss toplamı üzerine üç önemli teoremimiz var.

**Teorem 2.**  $m$  pozitif tamsayı,  $\chi \in X(m)$  bir karakter olsun.

$\chi$  ilkel olması  $m$ 'nin her öz böleni  $k$  için,  $(a, m) = 1$ ,  $a \equiv 1 \pmod{k}$  ve  $\tilde{\chi}(a) \neq 1$  koşullarını sağlayacak bir  $a$  tamsayısının varlığına denktir.

**Kanıt.** Varsayalım ki  $(a, m) = 1$  ve  $a \equiv 1 \pmod{k}$  eşitliklerini sağlayan her  $a \in \mathbb{Z}$  için  $\tilde{\chi}(a) = 1$  olacak şekilde bir  $k \mid m$  öz böleni var. Şu örten homomorfiyi inceleyelim. Her  $(a, m) = 1$  olacak şekilde  $a$  tamsayısı için,

$$\begin{aligned} \pi : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times &\longrightarrow (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^\times \\ a + m\mathbb{Z} &\mapsto a + k\mathbb{Z} \end{aligned}$$

Bu homomorfimin çekirdeği elbette

$$\ker(\pi) = \{a + m\mathbb{Z} \mid (a, m) = 1 \text{ ve } a \equiv 1 \pmod{k}\}$$

olacaktır. Ancak bu durumda çekirdekdeki her  $a + m\mathbb{Z}$  için,  $\tilde{\chi}(a) = 1$  olacak. Yani  $\ker(\pi) \subset \ker(\chi)$ . Öyleyse iddia ediyoruz ki  $\psi \circ \pi = \chi$  olacak şekilde bir  $\psi : (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^\times \longrightarrow \mathbb{C}^\times$  homomorfisi vardır. Bu homomorfimin varlığını gösterebilirsek her  $a \in \mathbb{Z}, (a, m) = 1$  için  $\psi(a) = \chi(a)$  olacak şekilde bir  $\psi \in X(k)$  bulmuş olacağız. Yani  $\chi$ ,  $\psi$ 'den türetilmiş olacak. Diyagramımıza bakalım.

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times & \xrightarrow{\pi} & (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^\times \\ & \searrow \chi & \swarrow \exists? \psi \\ & \mathbb{C}^\times & \end{array}$$

$\psi \circ \pi = \chi$  olacak şekilde bir  $\psi$  arıyoruz.  $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^\times$ 'da herhangi bir  $y$  elemanı alalım.  $\pi$  örten olduğuna göre  $\pi(x) = y$  olacak şekilde bir  $x \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  var. O zaman  $\psi$ 'yi  $\psi(y) := \chi(x)$  olacak şekilde tanımlayalım. Tanım gereği  $x \in (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^\times$  için, tam da istediğimiz gibi  $\psi(\pi(x)) = \chi(x)$  olur. Ancak  $\pi(x) = y$  eşitliğini sağlayan birden fazla  $x$  olabilir. Dolayısıyla bu  $\psi$  fonksiyonunun iyi tanımlı olduğunu doğrulamalı. Yani  $x_1, x_2 \in (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^\times$  için,  $\pi(x_1) = \pi(x_2)$  ise,  $\chi(x_1) = \chi(x_2)$  olmalı.

$$\begin{aligned} \pi(x_1) &= \pi(x_2) \\ \Rightarrow \pi(x_1)\pi(x_2)^{-1} &= 1 \\ \Rightarrow \pi(x_1x_2^{-1}) &= 1 \\ \Rightarrow x_1x_2^{-1} &\in \ker(\pi) \end{aligned}$$

Öte yandan  $\ker(\pi) \subset \ker(\chi)$  olduğunu görmüştük. Yani  $x_1x_2^{-1} \in \ker(\chi)$  oldu. O zaman  $\chi(x_1x_2^{-1}) = 1$  yani  $\chi(x_1) = \chi(x_2)$ .

Şimdi ise  $\chi$  karakterinin ilkel olmadığını varsayalım.  $m$ 'nin öz bir böleni  $k$  ve  $(a, m) = 1$ ,  $a \equiv 1 \pmod{k}$  özelliklerini sağlayan her  $a \in \mathbb{Z}$  için,  $\chi(a) = 1$  olduğunu göstereceğiz. İspatın bu yönü nispeten daha kolay.  $\chi$  ilkel olmadığına göre bir  $k \mid m$  ve her  $(a, m) = 1$  olacak  $a$  için  $\tilde{\chi}(a) = \tilde{\psi}(a)$  olacak şekilde bir  $\psi \in X(k)$  var. Öte yandan  $a \equiv 1 \pmod{k}$  ise,

$$\tilde{\chi}(a) = \chi(a + m\mathbb{Z}) = \psi(a + k\mathbb{Z}) = \psi(1 + k\mathbb{Z}) = 1$$

İlk iddiada gösterilmek istenen de buydu.

**Teorem 3.**  $a$  tamsayısı için,  $\overline{\tau(\chi, a)} = \tilde{\chi}(-1)\tau(\bar{\chi}, a)$ . Ayrıca  $(a, m) = 1$  ise veya  $\chi$  ilkelse  $\tau(\chi, a) = \bar{\chi}(a)\tau(\chi)$ .

**Kanıt.**

$$\overline{\tilde{\chi}(-1)}\tilde{\chi}(-1) = \tilde{\chi}(-1)\tilde{\chi}(-1) = \tilde{\chi}(1) = 1$$

olduğundan  $\overline{\tilde{\chi}(-1)} = \tilde{\chi}(1)$  olduğunu görebiliriz. O zaman

$$\begin{aligned} \overline{\tau(\chi, a)} &= \overline{\sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t)e^{\frac{2\pi i}{m}at}} \\ &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \overline{\chi(t)e^{\frac{2\pi i}{m}at}} \\ &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \overline{\chi(t)}e^{-\frac{2\pi i}{m}at} \end{aligned}$$

Eğer  $t + m\mathbb{Z} \mapsto -t + m\mathbb{Z}$  dönüşümünü yaparsak,  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  grubunun bir permütasyonu olduğundan, toplam değişmez. Yani,

$$\begin{aligned} \overline{\tau(\chi, a)} &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \overline{\chi(t)}e^{-\frac{2\pi i}{m}at} \\ &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \overline{\chi(-t)}e^{\frac{2\pi i}{m}at} \\ &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \overline{\chi(-1)\chi(t)}e^{\frac{2\pi i}{m}at} \\ &= \overline{\chi(-1)} \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \overline{\chi(t)}e^{\frac{2\pi i}{m}at} \\ &= \chi(-1) \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \overline{\chi(t)}e^{\frac{2\pi i}{m}at} \\ &= \chi(-1)\tau(\bar{\chi}, a) \end{aligned}$$

Benzer bir şekilde,  $(a, m) = 1$  ise  $a + m\mathbb{Z} \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  olduğundan,  $t + m\mathbb{Z} \mapsto a^{-1}t + m\mathbb{Z}$  de bir

permütasyondur. Dolayısıyla,

$$\begin{aligned}
 \tau(\chi, a) &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t) e^{\frac{2\pi i}{m} at} \\
 &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(a^{-1}t) e^{\frac{2\pi i}{m} aa^{-1}t} \\
 &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(a^{-1}) \chi(t) e^{\frac{2\pi i}{m} t} \\
 &= \chi(a^{-1}) \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t) e^{\frac{2\pi i}{m} t} \\
 &= \chi(a)^{-1} \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t) e^{\frac{2\pi i}{m} t} \\
 &= \overline{\chi(a)} \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t) e^{\frac{2\pi i}{m} t} \\
 &= \overline{\chi(a)} \tau(\chi)
 \end{aligned}$$

Yok eğer  $\chi$  ilkel ve  $(a, m) = q > 1$  ise,  $\tilde{\chi}(a) = 0$  olur. Dolayısıyla eşitlik için  $\tau(\chi, a) = 0$  olduğunu göstermek yeterli.  $a$  ve  $m$  sayılarının en büyük ortak böleni  $q$  olduğuna göre,  $a = qb$  ve  $m = qk$  olacak şekilde  $b, k$  doğal sayıları vardır. İspatladığımız 2. iddiaya göre de öyle bir  $c$  tamsayısı var ki  $(a, c) = 1$ ,  $c \equiv 1 \pmod k$  ve  $\tilde{\chi}(c) \neq 1$ . Şimdi tüm  $t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  için,

$$\begin{aligned}
 \zeta_m^{at} &= e^{\frac{2\pi i}{m} at} = e^{\frac{2\pi i}{qk} qbt} \\
 &= e^{\frac{2\pi i}{k} bt} = e^{\frac{2\pi i}{k} btc} \\
 &= e^{\frac{2\pi i}{qk} qbtc} = e^{\frac{2\pi i}{m} atc} = \zeta_m^{act}
 \end{aligned}$$

olduğuna göre elimizde

$$\begin{aligned}
 \chi(c)\tau(\chi, a) &= \chi(c) \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t) e^{\frac{2\pi i}{m} at} \\
 &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(c)\chi(t) e^{\frac{2\pi i}{m} at} \\
 &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(ct) e^{\frac{2\pi i}{m} at} \\
 &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(ct) e^{\frac{2\pi i}{m} act} \\
 &= \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t) e^{\frac{2\pi i}{m} at} = \tau(\chi, a)
 \end{aligned}$$

eşitliği mevcut.  $\chi(c) \neq 1$  olduğuna göre, tek ihtimal  $\tau(\chi, a) = 0$  olması.

**Teorem 4.**  $\chi$  ilkelse  $|\tau(\chi)| = \sqrt{m}$  ve  $\tau(\chi)\tau(\bar{\chi}) = \tilde{\chi}(-1)m$ .

**Kanıt.**  $|\tau(\chi)|$ 'yi hesaplayalım.

$$\begin{aligned}
 |\tau(\chi)|^2 &= \tau(\chi)\overline{\tau(\chi)} = \tau(\chi) \sum_{k=0}^{m-1} \bar{\chi}(k) \zeta_m^{-k} \\
 &= \sum_{k=0}^{m-1} \tau(\chi) \bar{\chi}(k) \zeta_m^{-k} \\
 &= \sum_{k=0}^{m-1} \tau(\chi, k) \zeta_m^{-k} \\
 &= \sum_{k=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{m-1} \chi(j) \zeta_m^{kj} \zeta_m^{-k}
 \end{aligned}$$

Buradaki ikinci toplam aşağıdaki gibi kolayca hesaplanabilir :

$$\sum_{k=0}^{m-1} \zeta_m^{k(j-1)} = \begin{cases} m & j = 1 \\ 0 & j \neq 1 \end{cases}$$

Aslına bakılırsa bu küçük iddia  $j = 1$  olduğu durumda kolayca görülebilir.  $j \neq 1$  olduğu durumda,  $u = \zeta_m^{j-1} \neq 1$  ve  $u^m = 1$  olacaktır.

$$S = \sum_{k=0}^{m-1} \zeta_m^{k(j-1)} = (1 + u + u^2 + \dots + u^{m-1})$$

dersek  $(1 - u)S = (1 - u^m) = 0$  elde edilir.  $u \neq 1$  olduğundan  $S = 0$  olmalıdır. Dolayısıyla

$$\begin{aligned}
 \chi(c)\tau(\chi, a) &= \sum_{j=0}^{m-1} \left[ \chi(j) \sum_{k=0}^{m-1} \zeta_m^{k(j-1)} \right] \\
 &= \chi(1) \sum_{k=0}^{m-1} 1 \\
 &= m
 \end{aligned}$$

Dolayısıyla,  $|\tau(\chi)| = \sqrt{m}$  ve  $m = |\tau(\chi)|^2 = \tau(\chi)\tau(\bar{\chi}) = \chi(-1)\tau(\chi)\tau(\bar{\chi})$ . Yani  $\chi(-1)m = \tau(\chi)\tau(\bar{\chi})$ . Böylece üçüncü iddiamızı ispatlamış ve dolayısıyla Gauss toplamaları ile ilgili teoremlerimizi kanıtlamış olduk.

### 3 İkinci Kuvvette Karşılıklılık

Nihayet yazımızın ana teoremini sunacağımız bölüme geldik. Buraya kadar yapmış olduğumuz hazırlık bize karşılıklılık teoremini ispatlamada yardımcı olacak.

**Teorem 5.** (Euler Kıstası) Bir  $p$  tek asal sayısı ve  $a$  tamsayısı için

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

**Kanıt.** Verilen  $a$  tamsayısının  $p$ 'nin katı olduğu durumda iddia edilen denkleğin sağlandığı kolayca görülebilir. Öyleyse  $a \notin p\mathbb{Z}$  varsayabiliriz. Legendre sembolünün tanımı bize :

$$\left(\frac{a}{p}\right) = 1 \Leftrightarrow \text{öyle bir } \alpha \in \mathbb{Z}, \\ \text{vardır ki } a \equiv \alpha^2 \pmod{p}$$

denkleğini verecektir. Bu da aşağıdaki diziye yol açacaktır :

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (\alpha^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv \alpha^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

zira  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$  eleman sayısı  $p-1$  olan döngüsel bir grup. ki bu da gösterilmek istenen iddia idi.

Ana teoreminizi sunmaya çok yakınız. Sadece iki tane yardımcı teoremimiz kaldı.

**Teorem 6.**  $p$  tek asal sayı,  $m$ ,  $p$ 'nin katı olmayan bir tamsayı ve  $\chi \in X(m)$  ilkel gerçel karakter olsun. O halde

$$\chi(p) = \left(\frac{\chi(-1)m}{p}\right)$$

eşitliği geçerlidir.

**Kanıt.** Öncelikle şunu gözlemeyelim.  $\chi$  kuadratik karakter ve  $2 \mid p-1$  olduğuna göre  $\chi^{p-1} = 1$  yani  $\chi^p = \chi$ . Yine aynı sebepten  $\chi\bar{\chi} = 1 = \chi^2$  eşitliği var. Buradan da  $\chi = \bar{\chi}$  çıkar. Yani  $\chi^p = \chi = \bar{\chi}$ . Gauss toplamı tam da bu noktada işimize yarayacak.  $\tau(\chi)^p$ 'yi modülo  $p$ 'de hesaplayacağız.

$\tau(\chi)^p = (\sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t)\zeta_m^t)^p$ . Bu noktada multinom açılımı imdadımıza yetişiyor. Ama önce biraz değişken değiştirelim.  $\#(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times = d$  olsun.  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$  'deki  $t$ 'leri  $\{t_1, t_2, \dots, t_d\}$  diye numaralandıralım.  $\chi(t_i)\zeta_m^{t_i} = x_i$  olsun. Toplamımız:

$$\left(\sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t)\zeta_m^t\right)^p = \left(\sum_{i=1}^d x_i\right)^p$$

oldu. Multinom açılımını kullanarak toplamın

$$\sum_{b_1+b_2+\dots+b_d=p} \binom{p}{b_1, b_2, \dots, b_d} \prod_{j=1}^d x_j^{b_j}$$

ifadesine eşit olduğunu görürüz. Biraz karmaşık gözükebilir. Ancak endişelenmeye gerek yok çünkü modülo  $p$ 'de baktığımızdan bazı terimler yok olacak. Bunun için katsayının  $p$ 'ye bölünmesi yeterli. Biraz hesapla  $b_i$ 'lerden herhangi biri  $p$ 'ye eşit olmadığı sürece  $\binom{p}{b_1, b_2, \dots, b_d}$  sayısının her zaman  $p$ 'ye bölündüğünü kolayca ispatlayabiliriz.

$$\binom{p}{b_1, b_2, \dots, b_d} = \frac{p!}{b_1! b_2! \dots b_d!}$$

eşitliği olduğuna göre ve bu ifade bir tamsayı olduğuna göre, şayet  $p$  bu ifadeyi bölmeseydi  $b_i$ 'lerden en az birinin  $p$ 'yi bölüp sadeleştirilmiş olması gerekirdi.  $b_i$ 'ler de  $p$ 'den küçük sayılar olduğuna göre bu durum mümkün değil. Yani ancak  $b_i$ 'lerden herhangi biri  $p$ 'ye eşitse paydaki  $p$  sadeleşebilir ve geride  $p$ 'ye bölünmez bir tamsayı kalır. Dolayısıyla ancak  $b_i$ 'lerden birinin  $p$ 'ye eşit olduğu terimler sıfırlanmıyor. O terimleri açıkça yazarsak

$$\sum_{j=1}^d x_j^p = \sum_{t \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} \chi(t)\zeta_m^{pt} = \tau(\chi, p)$$

Gauss toplamına modülo  $p$ 'de denk olduğunu görürüz. Öte yandan Gauss toplamı ile ilgili ispatladığımız ana teoreminize, yani Teorem 2'ye dayanarak  $\tau(\chi, p) = \chi(p)\tau(\chi)$  diyebiliriz. Buradan da

$$\tau(\chi)^{p+1} = [\tau(\chi)^2]^{\frac{p-1}{2}} \tau(\chi)^2 \\ \equiv \chi(p)\tau(\chi)^2 \pmod{p}$$

denkliği çıkar. Yine aynı teoremden  $\tau(\chi)\tau(\bar{\chi}) = \tau(\chi)^2 = \chi(-1)m$  ve hipotezimizden  $(\chi(-1)m, p) = 1$  olduğuna göre  $\tau(\chi)^2$ , modülo  $p$ 'de tersinir diyebilir ve denklikten  $\tau(\chi)^2$ 'yi sadeleştirerek

$$\left(\frac{\chi(-1)m}{p}\right) \equiv [\tau(\chi)^2]^{\frac{p-1}{2}} \equiv \chi(p) \pmod{p}$$

denkleğini elde edebiliriz. Göstermek istediğimiz de buydu.

**Teorem 7.**  $p$  tek asal sayı olmak üzere

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

$$\left(\frac{-2}{p}\right) = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \text{ veya } 3 \pmod{8} \\ -1, & p \equiv 5 \text{ veya } 7 \pmod{8} \end{cases}$$

**Kanıt.** 6. teoremdaki fonksiyonel denklemi kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla işimize gelecek şekilde bir  $\chi \in X(8)$  ilkel kuadratik karakter tanımlayacağız :

$$\chi(a+8\mathbb{Z}) = (-1)^{\frac{(a-1)(a+1)}{8}} \\ = \begin{cases} 1, & a \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1, & a \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

olarak tanımlarsak tam da istediğimiz gibi bir  $\chi$  elde etmiş oluruz.  $\chi(-1) = 1$  olur.

$\left(\frac{2}{p}\right) = \left(\frac{2^3}{p}\right) = \left(\frac{8}{p}\right) = \left(\frac{\chi(-1)8}{p}\right)$  eşitliği geçerlidir. 6. iddiadaki fonksiyonel eşitliği de kullanırsak

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \left(\frac{\chi(-1)8}{p}\right) = \chi(p) = (-1)^{\frac{(p-1)(p+1)}{8}}$$

olur. Euler kıstası ve Legendre sembolünün çarpımsal özelliği sayesinde de

$$\left(\frac{-2}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{2}{p}\right)$$

En sağdaki ifadenin teoremin beyanında belirtilen şartları sağladığı okur tarafından kolayca doğrulanabilir.

İkinci kuvvette karşılıklılığı ispatlamaya hazırız.

**Teorem 8.** (İkinci kuvvette Legendre sembolü karşılıklılığı)  $p$  ve  $q$  farklı iki tek asal sayı olsun.

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) &= (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}} \\ &= \begin{cases} -1, & p \equiv q \equiv 3 \pmod{4} \\ 1, & \text{diğer durumlarda} \end{cases} \end{aligned}$$

**Kanıt.** Hatırlıyoruz ki her  $q$  asal sayısının karakter grubunda,  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$  döngüsel olduğundan, en az bir kuadratik karakter bulunmakta. Üreteç  $\omega$  için  $\chi_q(\omega^k) = (-1)^k$  karakterini tanımlamak bunu görmek için yeterli. Dolayısıyla 6. iddiadan

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{q}\right) &= \left(\frac{\chi_q(-1)q}{p}\right) \\ &= \left(\frac{(-1)^{\frac{q-1}{2}}q}{p}\right) \\ &= \left(\frac{(-1)^{\frac{q-1}{2}}}{p}\right) \left(\frac{q}{p}\right) \\ &= (-1)^{\frac{q-1}{2} \frac{p-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right) \end{aligned}$$

İki tarafı da  $\left(\frac{q}{p}\right)$  ile çarparsak

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) &= (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}} \\ &= \begin{cases} -1 & p \equiv q \equiv 3 \pmod{4} \\ 1 & \text{diğer durumlarda} \end{cases} \end{aligned}$$

eşitliğini elde ederiz.

## 4 Neden Karşılıklık?

Tabii ki yazının başlığını ve teoremi gördükten sonra sorulacak en doğal soru bu. Neden karşılıklık? Kimle kim karşılıklı? Sayı teorisinin en temel ve önemli teoremlerinden biri olan karşılıklılığın daha yüksek mertebelere genellenmesi başlı başına ileri matematiğin ilgi konularından biri. Öylesine bereketli bir teorem ki yüzlerce ispatı yayınlanmış ve genellikle sayı teorisinin Pisagor teoremi olarak anılıyor.

Aslında mesele modüler denklemleri çözmek. Lineer modüler denklemleri çözmeyi biliyoruz.  $ax + b \equiv 0 \pmod{m}$  cinsinden bir denklemin çözümünün varlığı tamamen  $a$  ve  $m$  sayılarının aralarında asal olup olmamasına bağlı. Varsa modülo  $m$ 'de biricik çözümümüz  $x = -ba^{-1}$  var. Eğer  $a$  tersinir değilse çözümümüz yok.

Ancak ikinci mertebeden denklemlere bakmaya başladığımız anda işler sarp sarıyor. Bilindik cisimler  $\mathbb{R}$  ve  $\mathbb{C}$ 'de ikinci dereceden polinom kökü arar gibi, ya hiç kökü yoktur ya çakışık iki kökü vardır ya da ayrık iki kökü vardır diyemiyoruz. Misal  $x^2 \equiv 1 \pmod{8}$ 'in tam 4 tane çözümü var. 1, 3, 5 ve 7. Ancak Çin kalan teoremi sayesinde, herhangi bir modülo  $m$  bakmak yerine asallarda çözüm bakabildiğimiz için ve  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  de bir cisim olduğu için, yine sevdiğimiz sahalardayız ve 0,1 veya 2 çözümün varlığından bahsedebiliriz.

$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$  gibi rastgele bir denklige bakarsak,  $\mathbb{C}$  'de ikinci dereceden bir polinom çözermişcesine  $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  formülü uygulayamayız tabii ki. Çünkü herhangi bir cisimde kök nasıl alınır bilemiyoruz. Ki bu aslında çok derin bir soru.

İkinci dereceden ifadenin tamsayı katsayılı lineer ifadeler  $(a_1x + b_1)(a_2x + b_2)$  biçiminde çarpanlara ayrılabilmesi de diğer bir durum. Burada da denkliği kolaylıkla çözebiliriz. Mesele iki tane lineer denkliği çözmekten ibaret. Bunu yapabileceğimizi de Çin kalan teoreminden biliyoruz. Eğer bu çarpanlara ayırma yöntemi de pek bariz değilse o zaman ne yapacağız? O zaman da ifadeyi tam kare haline getirme yöntemine başvuracağız. Denkliğin her iki tarafını  $4a$  ile çarparsak

$$4a^2x^2 + 4abx + 4ac \equiv 0 \pmod{p}$$

denkliğini elde ederiz.  $b^2 - 4ac$ 'yi sağ tarafa atarsak

$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$$

olur. Yani aslında mesele  $y^2 \equiv m \pmod{p}$  cinsinden denklemleri çözmek.

Bu çözümleri anlamamanın  $\left(\frac{m}{p}\right)$  Legendre sembollerini anlamaktan geçtiğini, herhangi bir  $m \in \mathbb{Z}$  için de  $\left(\frac{m}{p}\right)$ 'yi anlamamanın  $p$ 'den farklı asal  $q$  için  $\left(\frac{q}{p}\right)$ 'yi anlamaktan geçtiğini bu yazıda anlatmaya

çalıştık. İkinci mertebeden karşılıklık bize  $\left(\frac{q}{p}\right)$  Legendre sembolü ile  $\left(\frac{p}{q}\right)$  Legendre sembolü arasındaki ilişkiyi söylüyor. Yani karşılıklı olan şeyler  $p$  ve  $q$  asalları. Zira  $x^2 \equiv p \pmod{q}$  ve  $x^2 \equiv q \pmod{p}$  denklemlerinin çözümlerinin herhangi bir ilişki içerisinde olduğu hiç de bariz değil.

Diyelim ki  $\left(\frac{60}{89}\right)$  Legendre sembolünü hesaplamak, yani  $x^2 \equiv 60 \pmod{89}$  denkleğinin bir çözümü var mı bilmek istiyoruz.  $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$  olduğuna göre,  $\left(\frac{2}{89}\right)^2 \left(\frac{3}{89}\right) \left(\frac{5}{89}\right)$ 'i hesaplamalı.  $89 \equiv 1 \pmod{8}$  olduğuna göre Teorem 3.3.2'den  $\left(\frac{2}{89}\right)^2 = 1$  çıktı. Kaldı elimizde  $\left(\frac{3}{89}\right) \left(\frac{5}{89}\right)$ . O zaman Teorem 6'nın 8. iddası *Legendre Karşılıklılığı*'ni kullanırsak  $\left(\frac{3}{89}\right)$  ve  $\left(\frac{5}{89}\right)$  ifadelerine takla attırabiliriz.

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{89}\right) &= (-1)^{\frac{3-1}{2} \frac{89-1}{2}} \left(\frac{89}{3}\right) \\ &= \left(\frac{89}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} \left(\frac{5}{89}\right) &= (-1)^{\frac{5-1}{2} \frac{89-1}{2}} \left(\frac{89}{5}\right) \\ &= \left(\frac{89}{5}\right) = \left(\frac{4}{5}\right) \end{aligned}$$

modülo 3'de karelere bakmak kolay. 1'in karesi 1 ve 2'nin karesi  $4 \equiv 1$  olduğuna göre,  $\left(\frac{2}{3}\right) = -1$  olur. 4'ün modülo 5'de bir kare olduğunu hemen söylemek mümkün dolayısıyla

$$\left(\frac{60}{89}\right) = \left(\frac{2}{89}\right)^2 \left(\frac{3}{89}\right) \left(\frac{5}{89}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{4}{5}\right) = -1$$

yani  $x^2 \equiv 60 \pmod{89}$  denkleğinin bir çözümü yok.

Bu yazıyı 119F405 numaralı "Temel Modüler Grupoid(TeMoG)" adlı Tübitak projesi bünyesinde hazırladık. Bu süreçte bize olan desteklerinden dolayı Tübitak'a teşekkürü borç biliriz.