Cofinanziato dall'Unione europea

SVILUPPO RURALE EMILIA-ROMAGNA 2023-27

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

A cura di:
Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni
Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni
Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo

BOLLETTINO DI PRODUZIONE

INTEGRATA E BIOLOGICA

BOLOGNA E FERRARA
N° 1 DEL 04 FEBBRAIO 2025

SPECIALE BANDI

NUOVI BANDI SRA 2025 – APERTURA DOMANDA DI SOSTEGNO

Si rende noto che **è disponibile in SIAG l'attività di compilazione delle domande di sostegno** (Co-PSP bandi anno 2025 – FEASR 2023-2027) per la presentazione delle istanze di contributo relativamente ai bandi per interventi agro-climatici ambientali (**SRA01- Produzione Integrata**, SRA03, SRA04, SRA18, SRA25, SRA26, SRA28, **SRA29 – Produzione Biologica**, SRA30- Bandi aperti - Sviluppo rurale 2023-2027).
Sono possibili malfunzionamenti a causa del perfezionamento del sistema informatico, tali per cui nei primi tempi la domanda potrà essere compilata ma non protocollata.
Tali disguidi saranno tuttavia risolti in breve tempo per consentire la chius

Si ricorda che la **scadenza di invio delle domande** di sostegno è fissata al **28 febbraio 2025** ore 13:00.

SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA (SQNPI)

Si comunica che dal 4 febbraio 2025 è attivo il link sul portale SIAN per la presentazione delle domande SQNPI - annualità 2025. Si sottolinea che il sistema gestionale del fascicolo aziendale grafico è operativo per cui è possibile fare gli aggiornamenti propedeutici alla presentazione della domanda SQNPI.

BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA

DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

ALBICOCCO

Fase fenologica: da gemma ferma a bottone rosso

Cecidomia fiorale: prosegue il volo degli adulti e sta iniziando l'ovideposizione. Negli impianti che hanno registrato danni nell'annata precedente e che si trovano nella fase fenologica più avanzata, si consiglia di posizionare le trappole cromotropiche per il monitoraggio entro la fase di bottone rosso e fare riferimento al proprio tecnico per la valutazione delle catture.
In questa fase l'uso di corroboranti a base di polveri di roccia può avere un'azione di contrasto dell'ovideposizione. Inoltre, eventuali trattamenti con Acetamiprid o Tau-fluvalinate, eseguiti nei confronti degli afidi, possono controllare anche la Cecidomia fiorale.

Cocciniglia di San Josè e **bianca**: negli impianti con presenza di infestazioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata precedente intervenire, a ingrossamento gemme, con Olio minerale (Polithiol). Tale intervento è attivo anche contro cocciniglie del genere *Parthenolecanium*.

PESCO

Fase fenologica: da gemma ferma a rottura gemma a legno

Bolla del pesco: al raggiungimento della fase di rottura delle gemme a legno e in previsione di piogge o nebbie persistenti (con almeno 15 ore di bagnatura) e solo su varietà che si presentano nella fase di inizio rottura gemme a legno per almeno il 10-20% di gemme a legno rotte (con tessuto verde visibile) intervenire impiegando Captano (Max 4) oppure **Ziram(*)** (Max 1) oppure Dodina (Max 2) o Sali di Rame. Si consiglia di curare bene la bagnatura.
(*) Sostanza attiva Candidata alla Sostituzione

SUSINO CINO-GIAPPONESE

Fase fenologica: gemma gonfia

Cocciniglie: in caso di presenze diffuse nell'annata precedente intervenire con Olio minerale (Polithiol) entro e non oltre la fase di gemma gonfia. Tale intervento è attivo anche nei confronti dell'**eriofide delle gemme**.

BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA

DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

ALBICOCCO

Fase fenologica: da gemma ferma a bottone rosso

Cecidomia dei fiori: prosegue il volo degli adulti e sta iniziando l'ovideposizione. Negli impianti che hanno registrato danni nell'annata precedente e si trovano nella fase fenologica più avanzata, si consiglia di posizionare le trappole cromotropiche per il monitoraggio entro la fase di bottone rosso e fare riferimento al proprio tecnico per la valutazione delle catture.
Si ricorda che trattamenti corroboranti a base di polveri di roccia possono avere un'azione di contrasto dell'ovideposizione.

Cocciniglia di San Josè e **bianca**: negli impianti con presenza di infestazioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata precedente, intervenire, a ingrossamento gemme, con Olio minerale (Polithiol). Tale intervento è attivo anche contro cocciniglie del genere *Parthenolecanium*.

PESCO

Fase fenologica: da gemma ferma a rottura gemma a legno

Bolla del pesco: al raggiungimento della fase di rottura delle gemme a legno e in previsione di piogge o nebbie persistenti (con almeno 15 ore di bagnatura) e solo su varietà che si presentano nella fase di inizio rottura gemme a legno (almeno il 10-20% di gemme con tessuto verde visibile) intervenire con Sali di rame e Zolfo.

SUSINO CINO-GIAPPONESE

Fase fenologica: gemma gonfia

Eriofide delle gemme: durante le operazioni di potatura si può verificare facilmente la presenza delle galle causate da questo acaro. L'utilizzo di Olio minerale (Polithiol), entro e non oltre la fase di gemma gonfia, può essere attivo anche contro questa avversità.