

# Affix®

## Ficha técnica

### Fungicida

Nº DE REGISTRO: ES-00318

COMPOSICIÓN: Azoxistrobin 25% SC

CLASIFICACIÓN DEL MODO  
DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):

|       |    |           |
|-------|----|-----------|
| GRUPO | 11 | FUNGICIDA |
|-------|----|-----------|

FORMULACIÓN:  
Suspensión Concentrada (SC)

PRESENTACIÓN: 1 – 5 L



**NATURAGRI**  
S O L U C I O N E S

Glorieta de Bilbao, 1, 1º dcha. • 28004 Madrid. ESPAÑA  
Tel.: (+34) 901 002 012 • [www.naturagri.es](http://www.naturagri.es)

**Affix®** es un fungicida sistémico, translaminar, con acción protectora, curativa y erradicante, que controla numerosas enfermedades fúngicas. Pertenece al grupo químico de las estrobirulinas y, mediante la inhibición de la respiración mitocondrial, inhibe la producción y germinación de las esporas y el crecimiento del micelio.

## APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

| Cultivo   | Agente   | Momento de aplicación | Nº Máximo de aplicaciones | Inter. mín. entre aplic. (días) | Dosis máxima (L producto/ha)          | Volumen máximo de agua (L/ha) | P.S. (días) |
|---|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Ajos  | Alternaria, Roya                                       | BBCH 13-49            | 2                         | 10-14                           | 0,8 - 1                               | 300 - 600                     | 7           |
|   | Mildiu   | BBCH 13-49            | 2                         | 7 - 10                          | 0,8 - 1                               | 300 - 600                     | 7           |
| Alcachofa   | Mildiu y Oídio   | BBCH 10-49            | 2                         | 7 - 10                          | 0,8 - 1                               | 800 - 1000                    | 7           |
| Almorta   | Antracnosis, Botrytis, Didymella, Erysiphe, Roya       | BBCH 10-69            | 1 - 2                     | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 600 - 800                     | 14          |
| Altramuz  | Antracnosis, Botrytis, Didymella, Erysiphe, Roya       | BBCH 10-69            | 1 - 2                     | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 600 - 800                     | 14          |
| Apionabo  | mancha negra, Alternaria, Oídio, Erysiphe              | BBCH 10-49            | 1 - 2                     | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 300 - 600                     | 7           |
| Arroz   | Picularia, Helminthosporium                            | BBCH 41 - 59          | 2                         | 10 - 14                         | 1                                     | 200 - 400                     | 28          |
| Berenjena, Pimiento, Tomate                           | Oídio  | BBCH 10 - 85          | 2                         | 7 - 10                          | 0,64 (inver)<br>0,7 (a.libre)         | 800                           | 3           |
| Berenjena, Pimiento, Tomate                           | Mildiu, Alternaria, Cladosporiosis                     | BBCH 10 - 85          | 2                         | 7 - 10                          | 0,64-0,8 (inver)<br>0,7-0,8 (a.libre) | 800                           | 3           |
| Calabacín, Calabaza, Melón, Pepino, Pepinillo, Sandía | Oídio  | BBCH 10 - 85          | 2                         | 5 - 7                           | 0,64 (inver)<br>0,7 (a.libre)         | 800                           | 3           |
|   | Mildiu, Didymella bryoniae                             | BBCH 10 - 85          | 2                         | 5 - 7                           | 0,64-0,8 (inver)<br>0,7-0,8 (a.libre) | 800                           | 3           |
| Cebada, Trigo   | Oídio, Roya, Septorios, Helminthosporium, Rincosporium | BBCH 32-69            | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 200 - 400                     | 35          |
| Cebolla   | Mildiu, Alternaria, Roya, Botritis                     | BBCH 13 - 49          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 300 - 600                     | 7           |
| Chalote   | Roya, Alternaria, Mildiu                               | BBCH 13 - 49          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 300 - 600                     | 7           |
| Chirivía  | Alternaria, Oídio, Erysiphe                            | BBCH 13 - 49          | 1 - 2                     | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 300 - 600                     | 7           |
| Chufa   | Alternaria, Erysiphe                                   | BBCH 10 - 49          | 1 - 2                     | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 300 - 600                     | 7           |
| Coles de bruselas                                     | Alternaria, Mycosphaerella                             | BBCH 10 - 49          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 600 - 800                     | 14          |
| Col de China  | Mancha negra, Alternaria                               | BBCH 10 - 48          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 600 - 800                     | 14          |
| Coliflor  | Mancha negra, Alternaria                               | BBCH 10 - 49          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 600 - 800                     | 14          |
| Colinabo  | Alternaria, Erysiphe                                   | BBCH 10 - 49          | 1 - 2                     | 10 - 14                         | 0,8 - 1                               | 300 - 600                     | 7           |

| Cultivo                          | Agente  | Momento de aplicación | Nº Máximo de aplicaciones | Inter. mín. entre aplic. (días) | Dosis máxima (L producto/ha) | Volumen máximo de agua (L/ha) | P.S. (días) |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Escorzonera                      | Alternaria, Oídio                             | BBCH 10 - 49          | 1 - 2                     | 10 - 14                         | 0,8 - 1                      | 300 - 600                     | 7           |
| Puerro                           | Roya, Alternaria, Mildiu                      | BBCH 13 - 49          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                      | 300 - 600                     | 15          |
| Espárragos                       | Roya, Stemphylium                             | BBCH 10 - 93          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                      | 600 - 800                     | NA          |
| Fresal                           | Oídio   | BBCH 10 - 85          | 2                         | 7 - 10                          | 0,8 - 1                      | 600 - 800                     | 3           |
| Guisante proteaginoso, Guisantes | Antracnosis, Botritis, Roya, Oídio, Didymella | BBCH 10 - 69          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                      | 600 - 800                     | 14          |
| Judías                           | Roya, Botritis                                | BBCH 10 - 69          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                      | 600 - 800                     | 14          |
| Judías verdes                    | Roya, Botritis                                | BBCH 10 - 69          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                      | 600 - 800                     | 7           |
| Triticale                        | Oídio, Septoriosis                            | BBCH 32 - 69          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                      | 200 - 400                     | 35          |
| Zanahoria                        | Alternaria, Oídio                             | BBCH 10 - 49          | 2                         | 10 - 14                         | 0,8 - 1                      | 300 - 600                     | 7           |