



Trotis® 25 SC

Trotis 25 SC es un fungicida de contacto, dotado de prolongado efecto protector. Se caracteriza por su acción específica sobre hongos del complejo *Rhizoctonia solani*, como patógenos de viruela de la patata y también causantes de la enfermedad de la nascencia en varios cultivos y plantas ornamentales.

Aplicaciones autorizadas

Tratamientos de desinfección de suelos destinados a cultivos de:

- Fresales, patata*, hortalizas, alcachofa**, espárrago y clavel, contra *Rhizoctonia solani*.

Modo de empleo y dosis

Aplicar directamente al suelo en bandas o localizado con el riego por goteo antes de la plantación, o en el momento de la misma, a razón de 5-8 L/ha. (0'5-0'8 cc/m²). En judías, la aplicación deberá hacerse unos días después de la siembra.

* En patata se puede utilizar:

	Dosis por cada 1000 kg de tubérculos		Dosis por ha.	
	Trotis 25 SC	Agua	Trotis 25 SC	Agua
Pulverizando directamente los tubérculos antes de la siembra	0'5-0'75 L	2'5-5 L	1-1'5 L	5-10 L
Pulverizando el surco de plantación abierto, en el momento de la siembra	0'5-0'75 L	40 L	1-1'5 L	80 L

** En alcachofa tratar por inmersión durante 5-10 minutos, antes de efectuar la plantación, los esquejes ("estaquillas") destinados a plantar 1 ha., en un caldo preparado al 0'5% (consumo estimado de 1'5 L/ha. de Trotis 25 SC).

En clavel no aplicar más de una vez en el ciclo del cultivo y no sobrepasar la dosis de 0'6 cc/m².

El producto solamente es activo contra *Rhizoctonia solani*; para controlar otras enfermedades de nascencia es preciso mezclarlo con otros fungicidas autorizados, activos contra las mismas.

Plazo de seguridad

No procede.

Envases: 1 L

Materia activa: 25% pencicuron.

Nº de registro: 17,919.

Clasificación toxicológica: -----, Peligroso para el medio ambiente (N).