

Datos del Producto

Número de Registro: 24343

Estado: ☒ Vigente

Fechas

Inscripción: 14/07/2006

Renovación:

Caducidad: 31/03/2026

Nombre Comercial: SAFRAN

Titular

ALBAUGH TKI d.o.o.

Grajski trg 21

SI-2327 RaE

ESLOVENIA

Fabricante

ALBAUGH EUROPE SARL

World Trade Center Lausanne. Avenue Gratta-Paille, 2.

1018 Lausanne

SUIZA

Composición

ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V

Envases

Botella COEX de 15 ml.Botellas de plástico de HDPE de 250 y 500 ml (Ø boca: 32 mm).Botellas de plástico de HDPE de 1 litro (Ø boca: 50 mm).Garrafas de plástico de HDPE de 5, 10 y 20 litros (Ø boca: 63 mm).Botellas y garrafas fHDPE DE 100 ml a 20 litros (para envases mayores o iguales a 5 litros , Ø boca ≥ 45 mm).

Página 1 de 5

95876 - 2024312



Usos y Dosis Autorizados						
USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Berenjena	Ácaros					
	Liriomiza, Liriomyza spp.	0,05 - 0,1 %	2	20 días	600-1200 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicación en invernaderos permanentes.
Calabacín	Ácaros					
	Liriomiza, Liriomyza spp.	0,05 - 0,1 %	2	20 días	600-1200 l/ha	Aplicación en invernaderos permanentes.
Fresal	Ácaros					
	Liriomiza, Liriomyza spp.	0,05 - 0,1 %	2	14 días	500-1200 l/ha	Aplicación en invernaderos permanentes.
Melón	Ácaros					
	Liriomiza, Liriomyza spp.	0,05 - 0,1 %	2	20 días	600-1200 l/ha	Aplicación en invernaderos permanentes.
Ornamentales herbáceas	Ácaros					
	Liriomiza, Liriomyza spp.	0,05 - 0,1 %	1	--	500-1200 l/ha	Aplicación en invernaderos permanentes.
Pepino	Ácaros					
	Liriomiza, Liriomyza spp.	0,05 - 0,1 %	2	20 días	600-1200 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicación en invernaderos permanentes.
Pimiento	Ácaros					
	Liriomiza, Liriomyza spp.	0,05 - 0,1 %	2	20 días	600-1200 l/ha	Aplicación en invernaderos permanentes.
Sandía	Ácaros					
	Liriomiza, Liriomyza spp.	0,05 - 0,1 %	2	20 días	600-1200 l/ha	Aplicación en invernaderos permanentes.
Tomate	Ácaros					
	Liriomiza, Liriomyza spp.	0,05 - 0,1 %	2	20 días	600-1200 l/ha	Aplicación en invernaderos permanentes. Máximo 1 l/ha.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Calabacín, Fresal, Melón, Pepino, Sandía	3
Berenjena, Pimiento, Tomate	7
Ornamentales herbáceas	NO PROCEDE



Condiciones Generales de Uso

Tratamiento insecticida/acaricida en invernadero por pulverización foliar.Aplicar en pulverización normal mediante pistola pulverizadora, cañón exterior o mediante sistemas automáticos, sin sobrepasar en ningún caso la dosis de 1 l/ha en tomate y 1,2 l/ha para el resto de usos.Para evitar problemas de resistencias, no tratar más de tres veces al año y alternar con acaricidas de distinto modo de acción.Se recomienda no utilizar abamectina en los cultivos de invernadero de noviembre a febrero.En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto.Los usos autorizados en invernadero para este producto han sido solicitados con anterioridad al 1 de junio de 2022, y por tanto no han sido evaluados de acuerdo con los nuevos criterios de evaluación de sistemas de cultivo, en consonancia con las conclusiones del Southern Member States Steering Committee (SMS SC) y los criterios de EFSA Journal 2014; 12(3): 3615.



Uso profesional agrario.

Clase de Usuario



Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

- Para los usos en tomate, pimiento, berenjena, pepino, calabacín, melón y sandía, el aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química; y durante la aplicación si es manual (pistola-cultivos altos) utilizará; guantes de protección química y mono tipo 4; si la aplicación es con cañón exterior, utilizará: guantes de protección química y mono tipo 6; y si la aplicación es por sistemas automáticos, no es necesario EPI.

- Para su uso en fresal, el aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química; y durante la aplicación (pistola-cultivos bajos), utilizará; guantes de protección química y mono tipo 6.

- Para su uso en ornamentales herbáceas, el aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química; y durante la aplicación, si es manual (pistola-cultivos bajos) y/o cañón exterior, utilizará; guantes de protección química y mono tipo 6; si la aplicación es por sistemas automáticos, no es necesario EPI.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

- El trabajador utilizará, durante la reentrada al cultivo de fresal: guantes de protección química.

NORMATIVA APLICABLE:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables. En el caso del trabajador deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.

- Ropa de protección química tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009.

- Ropa de protección nivel C1/C3, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN ISO 27065:2017 /A1:2019.

- Mascarilla autofiltrante para partículas según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010 o bien mascarilla con filtro para partículas según norma UNE-EN 143:2021.

- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4] según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.

- Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).

- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Cuando el cultivo supere el metro de altura, la anchura libre entre las líneas del cultivo deberá ser como mínimo de 1,2 metros.

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.

- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

- En tomate, sandía, pimiento, pepino, melón, berenjena y calabacín, el trabajador deberá respetar un plazo de reentrada de 3 días tras la última aplicación, para tareas superiores a 2 horas.

- En ornamentales herbáceas, el trabajador deberá respetar un plazo de reentrada tras la aplicación, para tareas superiores a 2 horas, de 11 días.

- En la evaluación del riesgo no se ha tenido en cuenta las posibles mezclas del producto para aumentar su eficacia.





Otras Indicaciones reglamentarias

Otros componentes además del ingrediente activo técnico:

Ciclohexanol (CAS 108-93-0).  
Hidroxitolueno butilado (CAS 128-37-0).

Otras leyendas e indicaciones:

El preparado no se usará en combinación con otros productos.  
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

OBSERVACIONES:

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

