

Zadanie numeryczne 2

12. (Zadanie numeryczne NUM2) Zadane są macierze

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 2.40827208 & -0.36066254 & 0.80575445 & 0.46309511 & 1.20708553 \\ -0.36066254 & 1.14839502 & 0.02576113 & 0.02672584 & -1.03949556 \\ 0.80575445 & 0.02576113 & 2.45964907 & 0.13824088 & 0.0472749 \\ 0.46309511 & 0.02672584 & 0.13824088 & 2.05614464 & -0.9434493 \\ 1.20708553 & -1.03949556 & 0.0472749 & -0.9434493 & 1.92753926 \end{pmatrix}$$

oraz

$$\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 2.61370745 & -0.6334453 & 0.76061329 & 0.24938964 & 0.82783473 \\ -0.6334453 & 1.51060349 & 0.08570081 & 0.31048984 & -0.53591589 \\ 0.76061329 & 0.08570081 & 2.46956812 & 0.18519926 & 0.13060923 \\ 0.24938964 & 0.31048984 & 0.18519926 & 2.27845311 & -0.54893124 \\ 0.82783473 & -0.53591589 & 0.13060923 & -0.54893124 & 2.6276678 \end{pmatrix}.$$

Zdefiniujmy wektory $\mathbf{b} \equiv (5.40780228, 3.67008677, 3.12306266, -1.11187948, 0.54437218)^T$ oraz $\mathbf{b}' \equiv \mathbf{b} + (10^{-5}, 0, 0, 0, 0)^T$. Używając wybranego pakietu algebry komputerowej lub biblioteki numerycznej, rozwiąż równania $\mathbf{A}_i \mathbf{y}_i = \mathbf{b}$ oraz $\mathbf{A}_i \mathbf{y}'_i = \mathbf{b}'$ dla $i = 1, 2$. Wyznacz $\Delta_i \equiv \|\mathbf{y}_i - \mathbf{y}'_i\|_2$ oraz zinterpretuj różnicę wartości Δ_1 i Δ_2 .

Wprowadzenie

Program dla dwóch różnych macierzy rozwiązuje równania z dwoma różnymi wektorami: \vec{b} oraz \vec{b}' będącym wynikiem zaburzenia pierwszej składowej wektora \vec{b} przez błąd rzędu 10^{-5} . Następnie dla obu macierzy program oblicza Δ poprzez obliczenie normy euklidesowej z różnicy otrzymanych wektorów wynikowych \vec{y} oraz \vec{y}' .

Celem zadania jest sprawdzenie, że macierze mogą mieć różną podatność na błędy obliczeniowe.

Wynik

Wynik oblicza program [program.py](#), wykorzystując bibliotekę [numpy.linalg](#) do rozwiązywania równania z macierzą i wyliczenia normy wektora.

Dla macierzy A_1 otrzymane wyniki to:

$$\vec{y}_1 = (3.28716602, 3.8029998, 0.25146854, -1.57875474, -0.50410395)^T$$

$$\vec{y}'_1 = (16.74173332, -14.06233583, -2.70495914, -15.57494944, -25.34234556)^T$$

$$\Delta_1 = \mathbf{36.35612431941617}$$

Dla macierzy A_2 otrzymane wyniki to:

$$\vec{y}_2 = (3.18374857, 3.94032033, 0.27419287, -1.47117406, -0.31318674)^T$$

$$\vec{y}'_2 = (3.18375389, 3.94032237, 0.27419131, -1.47117514, -0.31318814)^T$$

$$\Delta_2 = \mathbf{0.000006166739465500467}$$

Dyskusja wyników

W celu ułatwienia weryfikacji wyników, napisałem program [kappa.py](#), który wykorzystując te same narzędzia, oblicza wartości własne oraz współczynnik κ dla obu macierzy. Współczynnik ten odpowiada podatności danej macierzy na błędy obliczeniowe.

Dla macierzy A_1 otrzymany współczynnik κ wynosi około **39 295 748**.

Dla macierzy A_2 , wynosi on około **4**.

Widać więc, że mimo minimalnego błędu wielkości 10^{-5} , którym obarczony jest wektor \vec{b}' , macierz A_1 jest bardzo mocno podatna na błędy obliczeniowe (κ wielkości 10^7), co w rezultacie daje deltę wielkości 10^1 .

Natomiast macierz A_2 nie jest podatna na błędy obliczeniowe (κ wielkości 10^0), co w rezultacie daje deltę wielkości 10^{-6} .

Więc widać, że otrzymany wynik zgadza się z oczekiwanym, w macierzy A_1 podatnej na błędy obliczeniowe błąd wielkości 10^{-5} skutkuje dużą różnicą wyników, podczas gdy dla macierzy A_2 nie podatnej na błędy obliczeniowe, różnica wyników jest minimalna.