

Frações e Números Fracionários

Igor Cortes Junqueira

$$\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} = \frac{N}{D}$$

Tipos de fração

- Frações Próprias ($N < D$)
Ex.: $\frac{3}{5}; \frac{1}{2}; \frac{9}{10}; \frac{1}{9}; \frac{27}{30}; \frac{11}{12};$
- Frações Impróprias ($N > D$)
Ex.: $\frac{7}{5}; \frac{3}{2}; \frac{11}{10}; \frac{10}{9}; \frac{35}{6}; \frac{12}{7};$
- Frações Aparentes ($N = kD, k \in \mathbb{Z}$)
Ex.: $\frac{10}{5}; \frac{6}{2}; -\frac{20}{10}; \frac{27}{9}; \frac{27}{3}; -\frac{12}{4};$
- Frações Equivalentes ($N1 = kN2, D1 = kD2, k \in \mathbb{R} \Rightarrow \frac{N1}{D1} = \frac{N2}{D2}$)
Ex.: $\frac{3}{5}$ e $\frac{9}{15}; \frac{4}{7}$ e $\frac{16}{28}; \frac{27}{3}$ e $\frac{18}{2};$
- Frações Mistas (Impróprias representadas como inteiro + própria)
Ex.: $3\frac{3}{5}; 2\frac{1}{2}; 1\frac{9}{10}; 2\frac{3}{4}; 5\frac{1}{5}; 7\frac{1}{3};$

Operações

- Adição

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \frac{b * x}{b * a} + \frac{a * y}{a * b} = \frac{b * x + a * y}{a * b}$$

Ex.:

$$1) \frac{3}{2} + \frac{2}{5} = \frac{5 * 3}{5 * 2} + \frac{2 * 2}{2 * 5} = \frac{15}{10} + \frac{4}{10} = \frac{19}{10}$$

$$2) \frac{3}{2} + \frac{10}{6} = \frac{6 * 3}{6 * 2} + \frac{2 * 10}{2 * 6} = \frac{18}{12} + \frac{20}{12} = \frac{38}{12}, \text{ ainda, } \frac{38}{12} = \frac{2 * 19}{2 * 2 * 3} = \frac{19}{6}$$

$$3) \frac{1}{3} + \frac{4}{6} = \frac{6 * 1}{6 * 3} + \frac{3 * 4}{3 * 6} = \frac{6}{18} + \frac{12}{18} = \frac{18}{18}, \text{ ainda, } \frac{18}{18} = 1$$

- Subtração

$$\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = \frac{b * x}{b * a} - \frac{a * y}{a * b} = \frac{b * x - a * y}{a * b}$$

Ex.:

$$1) \frac{3}{2} - \frac{2}{5} = \frac{5 * 3}{5 * 2} - \frac{2 * 2}{2 * 5} = \frac{15}{10} - \frac{4}{10} = \frac{11}{10}$$

$$2) \frac{3}{2} - \frac{10}{6} = \frac{6 * 3}{6 * 2} - \frac{2 * 10}{2 * 6} = \frac{18}{12} - \frac{20}{12} = \frac{-2}{12}, \text{ ainda, } \frac{-1}{12} = -\frac{2}{2 * 2 * 3} = -\frac{1}{6}$$

$$3) \frac{1}{3} - \frac{4}{6} = \frac{6 * 1}{6 * 3} - \frac{3 * 4}{3 * 6} = \frac{6}{18} - \frac{12}{18} = \frac{-6}{18}, \text{ ainda, } \frac{-1}{3} = -\frac{6}{2 * 3 * 3} = -\frac{1}{3}$$

- **Multiplicação**

$$\frac{x}{a} * \frac{y}{b} = \frac{x * y}{a * b}$$

Ex.:

$$\begin{aligned} 1) \frac{3}{2} * \frac{2}{5} &= \frac{3 * 2}{2 * 5} = \frac{6}{10}, \text{ ainda, } \frac{6}{10} = \frac{2 * 3}{2 * 5} = \frac{3}{5} \\ 2) \frac{3}{2} * \frac{10}{6} &= \frac{3 * 10}{2 * 6} = \frac{30}{12}, \text{ ainda, } \frac{30}{12} = \frac{2 * 3 * 5}{2 * 2 * 3} = \frac{5}{2} \\ 3) \frac{1}{3} * \frac{4}{6} &= \frac{1 * 4}{3 * 6} = \frac{4}{18}, \text{ ainda, } \frac{4}{18} = \frac{2 * 2}{2 * 3 * 3} = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

- **Divisão**

$$\frac{x}{a} \div \frac{y}{b} = \frac{x}{a} * \frac{b}{y} = \frac{b * x}{a * y}$$

Ex.:

$$\begin{aligned} 1) \frac{3}{2} \div \frac{2}{5} &= \frac{3}{2} * \frac{5}{2} = \frac{3 * 5}{2 * 2} = \frac{15}{4} \\ 2) \frac{3}{2} \div \frac{10}{6} &= \frac{3}{2} * \frac{6}{10} = \frac{3 * 6}{2 * 10} = \frac{18}{20}, \text{ ainda, } \frac{18}{20} = \frac{2 * 3 * 3}{2 * 2 * 5} = \frac{9}{10} \\ 3) \frac{1}{3} \div \frac{4}{6} &= \frac{1}{3} * \frac{6}{4} = \frac{1 * 6}{3 * 4} = \frac{6}{12}, \text{ ainda, } \frac{6}{12} = \frac{2 * 3}{2 * 2 * 3} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- **Potenciação**

$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a}{b} * \frac{a}{b} * \dots = \frac{a^x}{b^x}$$

Ex.:

$$\begin{aligned} 1) \left(\frac{3}{2}\right)^2 &= \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4} \\ 2) \left(\frac{10}{6}\right)^3 &= \frac{10^3}{6^3} = \frac{1000}{216}, \text{ ainda, } \frac{1000}{216} = \frac{2 * 2 * 2 * 5 * 5 * 5}{2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 3} = \frac{2^3 * 5^3}{2^3 * 3^3} = \frac{125}{27} \\ 3) \left(\frac{1}{3}\right)^2 &= \frac{1^2}{3^2} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

- **Radiciação**

$$\sqrt[x]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[x]{a}}{\sqrt[x]{b}}$$

Ex.:

$$\begin{aligned} 1) \sqrt{\frac{1}{9}} &= \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3} \\ 2) \sqrt{\frac{1}{3}} &= \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \text{ ainda, } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} * 1 = \frac{1}{\sqrt{3}} * \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{1 * \sqrt{3}}{\sqrt{3} * \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 3) \sqrt[3]{\frac{2}{8}} &= \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{2}, \text{ ainda, } \frac{\sqrt[3]{2}}{2} = \frac{2^{1 \setminus 3}}{2} = 2^{1 \setminus 3} * 2^{-1} = 2^{-2 \setminus 3} \text{ (ou } \frac{1}{2^{2 \setminus 3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2^2}}) \end{aligned}$$

Denominador Comum

Para se operar com frações, em especial quando se lida com várias delas, é prático igualar os denominadores, permitindo assim realização de todas as operações de maneira imediata. A maneira mais simples de conseguir um denominador comum, é com o produto de todos os denominadores. Porém, em alguns casos, isso pode gerar um denominador muito grande, dificultando operações. Por isso, é de praxe realizar a fatoração em números primos dos denominadores para se obter o MMC (Mínimo Múltiplo Comum).

Para se obter o MMC entre n números, basta pegar todos os fatores primos que aparecem em suas decomposições, sempre com o maior expoente. Por exemplo:

- $MMC(60, 18, 45) = MMC(2^2 * 3 * 5, 2 * 3^2, 2 * 5) = 2^2 * 3^2 * 5 = 180$
- $MMC(98, 12) = MMC(2 * 7^2, 2^2 * 3) = 2^2 * 3 * 7^2 = 588$

Redutibilidade

Frações podem ser reduzidas através da fatoração de seus componentes. Frações em estado reduzido são irredutíveis.

$$\frac{25}{15} = \frac{5 * 5}{3 * 5} = \frac{5}{3}, \text{ ou ainda, } \frac{5}{3} = \frac{3}{3} + \frac{2}{3} = 1\frac{2}{3}$$

Frações Geratrizes

Frações cuja divisão origina dízimas periódicas, onde um ou mais algarismos, chamados *período*, se repetem infinitamente.

$$\frac{4}{9} = 0,444444... = 0,\overline{4} \quad \frac{144}{99} = 1,454545... = 1,\overline{45}$$

Para determinar a fração geratriz de uma dízima periódica, seguimos os seguintes passos:

1. Igualar a dízima a uma variável, escrevendo uma equação do primeiro grau;
2. Multiplicar os termos da equação por um múltiplo de 10, de forma a igualar as partes decimais, 'trazendo' um período para a parte inteira;
3. Subtrair a equação inicial da obtida no passo anterior;
4. Isolar a incógnita;

Exemplo 1: $0,8888... = 0,\overline{8}$

I) $x = 0,8888...$

II) $10x = 8,8888...$

II - I) $9x = 8 \Rightarrow x = \frac{8}{9}$

Exemplo 2: $2,3616161... = 2,\overline{361}$

I) $x = 2,3616161...$

II) $10x = 23,616161...$

III) $1000x = 2361,616161...$

III - II) $990x = 2338 \Rightarrow x = \frac{2338}{990}$

Equações Simples

Equações envolvendo frações são solucionáveis fazendo-se uso das propriedades e operações com frações. Um caso clássico, onde se comparam duas frações, pode-se fazer *multiplicação cruzada*, onde:

$$\frac{a}{x} = \frac{b}{y} \Rightarrow \frac{y * a}{y * x} = \frac{x * b}{x * y} \Rightarrow \frac{ay}{xy} = \frac{bx}{xy} \Rightarrow ay = bx$$

Seguem alguns exemplos de equações.

- $\frac{x}{2} = 4$
 $x = 4 * 2$
 $x = 8$

- $\frac{3}{x} = \frac{4}{3}$

$$\frac{3 * 3}{3 * x} = \frac{x * 4}{x * 3}$$

$$\frac{9}{3x} = \frac{4x}{3x}$$

$$9 = 4x$$

$$x = \frac{9}{4}$$

- $\frac{3}{2} = \frac{5}{x} + \frac{1}{5}$

$$\frac{5x * 3}{5x * 2} = \frac{10 * 5}{10 * x} + \frac{2x * 1}{2x * 5}$$

$$\frac{15x}{10x} = \frac{50}{10x} + \frac{2x}{10x}$$

$$\frac{15x}{10x} = \frac{2x + 50}{10x}$$

$$15x = 2x + 50$$

$$13x = 50$$

$$x = \frac{50}{13}$$