



GUIDE PRATIQUE ILLUSTRÉ

SOS Lumbago

7 jours pour retrouver des repères

Des décisions simples, des options de mouvement et un carnet court pour traverser les premiers jours sans rester seul face au doute.

14 PAGES

8 ILLUSTRATIONS

FORMAT A4

LE RÉFLEXE DOS

ÉDITION COMPLÈTE 2.0 • VALIDATION SANTÉ REQUISE

Avant de commencer

Votre douleur mérite d'être prise au sérieux

La plupart des douleurs lombaires ne sont pas liées à une maladie grave. Ce guide ne peut cependant pas vérifier votre situation. Utilisez cette page avant toute proposition d'activité.



Aide urgente

- nouveau trouble urinaire ou intestinal
- perte de sensibilité du périnée
- faiblesse importante ou progressive d'une jambe
- traumatisme important, malaise ou symptôme inhabituel

En France 15 ou 112



Avis rapide

- fièvre ou altération de l'état général
- douleur qui s'aggrave régulièrement ou persiste au repos
- engourdissement ou faiblesse nouvelle
- perte de poids inexplicée ou antécédent médical important
- activités très limitées sans amélioration

Vous hésitez

Vous n'avez pas à décider seul. Un pharmacien, votre médecin, le 15 ou le 112 peuvent vous aider à choisir le bon niveau de recours selon la situation.

Un signe isolé ne suffit pas à conclure. Il mérite d'être évalué dans son contexte.

Les trente premières minutes

Réduire l'incertitude avant de chercher un exercice

1

Vérifier

Reprenez la page de sécurité et notez tout symptôme nouveau.

2

S'installer

Testez deux positions sûres. Gardez celle qui facilite le souffle.

3

Sécuriser

Dégagez le trajet vers les toilettes et gardez le téléphone près de vous.

4

Prévenir

Demandez une aide pour les charges, les enfants ou une tâche urgente.

MON PROCHAIN PETIT PAS

Aujourd'hui, l'action la plus utile est

La personne que je peux prévenir est


Votre objectif aujourd'hui

Retrouver un peu de contrôle sur la journée : une position de répit, un trajet sécurisé et une personne joignable suffisent.

Protéger sans s'immobiliser

Alternier repos bref et activité tolérable

Rester au lit toute la journée n'aide généralement pas une lombalgie commune. Cela ne veut pas dire ignorer la douleur. Cherchez un rythme que vous pouvez répéter.



Le repère du jour

VERT
Je continue

Le mouvement reste contrôlable et la récupération est prévisible.

ORANGE
Je réduis

La réponse devient nettement plus forte ou dure plus que prévu.

ROUGE
Je demande de l'aide

Un symptôme nouveau apparaît ou la situation devient inquiétante.

Le déplacement le plus facile

Le réglage que je garde demain

Se lever et s'habiller

Utiliser des appuis temporaires sans chercher la technique parfaite



1 Sortir du lit

Roulez sur le côté si cela vous aide, rapprochez les jambes du bord puis poussez avec les bras.

2 S'habiller assis

Rapprochez le vêtement ou la chaussure plutôt que de chercher une grande amplitude.

3 Accepter un appui

Utilisez un meuble stable ou l'aide d'un proche pendant quelques jours si nécessaire.

Si un geste bloque

Raccourcissez le mouvement, asseyez-vous ou acceptez un appui. Le but est de réaliser l'action utile sans chercher une technique parfaite.

Règle de sécurité Une canne ou des béquilles utilisées pour la première fois doivent être réglées et expliquées par un professionnel.

Retrouver un peu de mobilité

Quatre options courtes à choisir selon votre journée



● Souffler
Relâcher les
épaules



● S'appuyer
Transférer le
poids



● Marcher
Faire un trajet
court



● Observer
Noter la réponse

Routine courte

- 1 Choisissez une position confortable.
- 2 Réalisez un petit mouvement connu.
- 3 Marchez une à trois minutes dans un espace sûr.
- 4 Reposez-vous brièvement puis observez la réponse.

Vous choisissez

- ☐ Souffler
- ☐ S'appuyer
- ☐ Marcher
- ☐ Observer

Votre dose du jour

Choisissez une seule option, testez-la brièvement puis observez la réponse plus tard.
Une petite dose répétable est déjà une progression.

Reprendre une tâche utile

Mesurer votre capacité dans la vraie vie



La règle en quatre temps

- 1 Préparer les objets à hauteur accessible.
- 2 Réaliser une première partie.
- 3 Changer de position ou faire une pause.
- 4 Terminer, déléguer ou reporter sans culpabiliser.

Votre tâche du jour

La tâche choisie

La version plus courte

L'aide que j'accepte

Ce que j'ai réellement réussi

Mesurer autrement

Notez la tâche accomplie, même partiellement, ainsi que le réglage qui l'a rendue possible. La capacité compte autant que la douleur.

Sortir et se déplacer

Préparer le trajet avant de tester la distance



Au travail

Alternez assis et debout. Un changement de position peut durer moins de deux minutes.

En voiture

Asseyez-vous d'abord puis tournez les jambes ensemble si cette option vous convient.

En transport

Choisissez un horaire moins chargé et acceptez de vous asseoir.

AVANT DE PARTIR

☐ Point de retour

☐ Lieu de pause

☐ Charge réduite

☐ Personne prévenue

Préparer la reprise du travail

Décrire les contraintes avant de choisir une date

La reprise dépend de votre état, du trajet, des horaires et des tâches réelles. Des adaptations temporaires peuvent être discutées avec le médecin traitant et le médecin du travail.

Contrainte	Aujourd'hui	Adaptation possible
Trajet	Durée mode station debout	horaire calme pause télétravail
Position	assis debout conduite	alternance appui micro-pause
Charge	poids répétition hauteur	réduire rapprocher déléguer
Rythme	cadence imprévus pauses	fractionner changer de tâche

Ma demande claire

L'adaptation temporaire qui m'aiderait

La personne à contacter

La date de réévaluation

Formuler une demande

Décrivez une contrainte observable et proposez une adaptation temporaire : horaire, trajet, alternance des positions, charge ou rythme.

Préparer une consultation

Donner les informations qui changent la décision



À apporter

- ☐ date et circonstances
- ☐ zone et éventuelle douleur dans la jambe
- ☐ symptômes associés
- ☐ traitements et examens
- ☐ deux questions prioritaires

Ma synthèse en une minute

Ce qui a changé

Ce que je ne peux plus faire

Ce que je peux encore faire

Ma question prioritaire

Pendant le rendez-vous

Montrez cette synthèse, précisez ce qui a changé et demandez quel signe doit conduire à reconsulter. Notez la décision avec vos mots.

Faire le bilan et choisir la suite

Amélioration stagnation aggravation

ÇA S'AMÉLIORE

Conservez les activités tolérées. Augmentez un seul paramètre à la fois.

Je poursuis

ÇA STAGNE

Regardez les capacités autant que la douleur. Demandez un avis si les activités restent très limitées.

Je réévalue

ÇA S'AGGRAVE

Revenez à la page de sécurité. Un symptôme nouveau mérite une évaluation adaptée.

Je demande de l'aide

Ce qui a progressé

Ma décision pour la prochaine semaine

Quand les contraintes s'accumulent

Douleur organisation pression financière



Faites une liste courte des conséquences des sept prochains jours.

À faire aujourd'hui

À déléguer

À reporter

Démarches utiles

- regrouper ordonnances, arrêts, factures et justificatifs
- demander les conditions de prise en charge avant une dépense importante
- prévenir rapidement si un rendez-vous ou un paiement ne peut pas être tenu
- solliciter un service social si le logement, le revenu ou l'accès aux soins sont en difficulté

Ce guide ne fournit pas de conseil juridique ou financier personnalisé. Les droits dépendent de votre situation.

Votre semaine en un coup d'œil

Suivre les capacités sans surveiller chaque sensation

Jour	Action	Aide utile	Réponse	Décision
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Une journée plus difficile n'efface pas les capacités gagnées. Cherchez ce qui est devenu plus prévisible.

Repères et validation

Une version traçable et révisable

Sources institutionnelles consultées

Haute Autorité de santé

Prise en charge de la lombalgie commune
has-sante.fr - recommandation lombalgie

Assurance Maladie

Lombalgie ou mal de dos
ameli.fr - dossier lombalgie aiguë

Assurance Maladie

Le bon traitement est le mouvement
ameli.fr - traitement et prévention

Organisation mondiale de la Santé

Guide sur la lombalgie chronique primaire
who.int - ISBN 978-92-4-008178-9

AVANT COMMERCIALISATION

Ce support doit être relu par un médecin ou un kinésithérapeute. Les consignes, illustrations de mouvement et règles d'arrêt doivent être validées. Afficher ensuite le nom du relecteur, sa qualité, la date de validation et la prochaine date de révision.