# Definições — Exercícios



Farm. Mário Borges Rosa

- Paciente hospitalizado com desidratação
- É administrado soro fisiológico e aparecem sintomas de choque pirogênico
- Realizadas medidas de suporte

Reação Adversa ou Erro?

Evento adverso?

- Paciente utilizando antihipertensivo de 8 em 8h
- Troca do plantão da enfermagem: foi administrado as
  6:00h não foi assinalado na folha da enfermagem
- Administrado novamente às 8:00h
- Desenvolve hipotensão significativa

- Paciente admitido inconsciente no hospital sem nenhuma informação
- Existe indicação para a prescrição da penicilina cristalina, sendo prescrita e administrada
- Paciente desenvolve choque anafilático

Reação Adversa ou Erro?

Evento Adverso?

- Paciente oncológico recebendo um citostático adequado
- Paciente desenvolve alopécia

- Paciente oncológico com insuficiência renal moderada
- Existem 2 opções de tratamento com citostáticos:
  um de excreção renal e outro hepática
- Prescrito o citostático de excreção renal
- Paciente desenvolve insuficiência renal grave

- Criança com sífilis congênita
- Prescrito Penicilina G Benzatina
- É administrada a Penicilina G Benzatina endovenosa
- Paciente evolui para óbito Reação Adversa ou Erro? Evento Adverso?

- Paciente em uso de warfarina, utiliza ácido acetilsalicílico por sua conta
- Apresenta hemorragia
- ♦ Internado em CTI
- Recupera-se

- Paciente com dor articular, utiliza antiinflamatório não esteroidal sem prescrição de 12 em 12 horas
- Dor aumenta e ele passa para 4 em 4 horas excedendo a dose máxima
- Não acontece nada

- Paciente hospitalizado com prescrição de metoclopramida
- O medicamento é administrado 2 horas depois do horário prescrito
- Não acontece nada

- Paciente ambulatorial com prescrição de warfarina
- Paciente não utiliza o medicamento porque não tem dinheiro para comprar
- Paciente apresenta trombose

- Paciente internado com prescrição de fitomenadiona
- → O medicamento com prazo de validade expirado estava no posto de enfermagem, e é administrado
- Paciente apresenta hemorragia

- Paciente com infecção, prescrito vancomicina e a infusão é feita em 30 minutos (prescrição médica)
- Paciente apresenta vermelhidão de um lado do pescoço e peito.
- A próxima é administrada em 2 horas e nada acontece