


# *Quantique*

Cours de physique

**Version SC**

15 septembre 2026, Olivier Allard

PHY-41030



## Table des matières

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Principes fondamentaux</b>                   | <b>3</b>  |
| 1.1      | Polarisation d'un photon . . . . .              | 3         |
| 1.2      | Principes fondamentaux en physique quantique    | 6         |
| <b>2</b> | <b>Outils mathématiques</b>                     | <b>9</b>  |
| 2.1      | Notation de Dirac . . . . .                     | 9         |
| 2.2      | Transformation de Fourier . . . . .             | 10        |
| 2.3      | Produit tensoriel . . . . .                     | 12        |
| 2.4      | Inégalité de Heisenberg . . . . .               | 13        |
| <b>3</b> | <b>Méthodes d'approximation</b>                 | <b>16</b> |
| 3.1      | Méthode des perturbations . . . . .             | 16        |
| 3.2      | Méthode variationnelle . . . . .                | 21        |
| <b>4</b> | <b>Symétries en physique quantique</b>          | <b>23</b> |
| 4.1      | Invariance et commutation . . . . .             | 23        |
| 4.2      | Parité . . . . .                                | 25        |
| 4.3      | Translations . . . . .                          | 26        |
| 4.4      | Théorème de Bloch . . . . .                     | 29        |
| <b>5</b> | <b>Moment cinétique, théorie générale</b>       | <b>32</b> |
| 5.1      | Rotations et moment cinétique . . . . .         | 32        |
| 5.2      | Théorie générale du moment cinétique . . . . .  | 35        |
| 5.3      | Addition de moments cinétiques . . . . .        | 38        |
| <b>6</b> | <b>Moment cinétique orbital</b>                 | <b>43</b> |
| 6.1      | Définition . . . . .                            | 43        |
| 6.2      | Théorie générale du moment cinétique orbital .  | 43        |
| 6.3      | Rotation d'une molécule diatomique . . . . .    | 48        |
| <b>7</b> | <b>Moment cinétique intrinsèque</b>             | <b>51</b> |
| 7.1      | Construction des observables cartésiens du spin | 51        |

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2      | Mesure du spin selon un axe arbitraire . . . . .                   | 54        |
| 7.3      | Opérateur rotation du spin . . . . .                               | 55        |
| <b>8</b> | <b>L'atome d'hydrogène</b>                                         | <b>57</b> |
| 8.1      | Modèle de Bohr . . . . .                                           | 57        |
| 8.2      | Mouvement dans un potentiel central . . . . .                      | 58        |
| 8.3      | Interaction spin-orbite . . . . .                                  | 66        |
| 8.4      | Structure fine de l'atome d'hydrogène . . . . .                    | 68        |
| <b>9</b> | <b>Particules indiscernables</b>                                   | <b>71</b> |
| 9.1      | Postulat de symétrisation . . . . .                                | 72        |
| 9.2      | Cas de deux particules indiscernables indépen-<br>dantes . . . . . | 75        |
| 9.3      | Expérience de Hong-Ou-Mandel . . . . .                             | 77        |

# 1 PRINCIPES FONDAMENTAUX

## 1.1 POLARISATION D'UN PHOTON

Cette première partie a pour objectif de nous familiariser avec les postulats de la physique quantique, sous la forme d'un problème déjà abordé dans le cas classique.

On suppose que l'on dispose d'une source de photons uniques, ce qui permet d'aborder le problème de l'optique quantique sous l'angle de la polarisation d'un photon unique, seul degré de liberté du problème.

### 1.1.1 DESCRIPTION DE L'ÉTAT DE POLARISATION D'UN PHOTON UNIQUE

L'espace des états  $\mathcal{E}_H$  est un espace de Hilbert de dimension 2, de base orthonormée  $\{|\uparrow\rangle, |\leftrightarrow\rangle\}$  correspondant aux polarisations verticales et horizontales respectivement. On pourra écrire n'importe quel état de polarisation linéaire faisant un angle  $\theta$  par rapport à la verticale par le ket

$$|\theta\rangle = \cos(\theta)|\uparrow\rangle + \sin(\theta)|\leftrightarrow\rangle$$

Pour ce qui est des états de polarisation circulaire droite ou gauche, on superpose les deux états de base avec un déphasage relatif de  $\pm\frac{\pi}{2}$ , soit

$$|\pm\rangle = \frac{|\uparrow\rangle \pm i|\leftrightarrow\rangle}{\sqrt{2}}$$

On pourra, au choix, sélectionner comme base orthonormée de l'espace des états les bases  $\{|\uparrow\rangle, |\leftrightarrow\rangle\}$ ,  $\{|\theta\rangle, |\theta + \frac{\pi}{2}\rangle\}$  ou  $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ .

### 1.1.2 MESURE DE L'ÉTAT DE POLARISATION D'UN PHOTON UNIQUE

Considérons une mesure de polarisation par un **prisme de Rochon**, laissant les deux résultats possibles  $|\uparrow\rangle$  et  $|\leftrightarrow\rangle$  dans

le cas où celui-ci est orienté selon la verticale. Soit un état  $|\psi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\leftrightarrow\rangle$  défini par les nombres complexes  $\alpha$  et  $\beta$ . Les nombres  $|\alpha|^2$  et  $|\beta|^2$  correspondent alors aux probabilités associées aux deux états possible :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_\uparrow &= |\langle\uparrow|\psi\rangle|^2 = |\alpha|^2 \\ \mathcal{P}_\leftrightarrow &= |\langle\leftrightarrow|\psi\rangle|^2 = |\beta|^2\end{aligned}$$

Si l'on tourne le prisme de Rochon d'un angle  $\alpha$ , la base de mesure à considérer est désormais  $\{|\alpha\rangle, |\alpha + \frac{\pi}{2}\rangle\}$ , et dans le cas d'un photon dans l'état  $|\theta\rangle$ , on obtient les probabilités de mesure

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_\alpha &= |\langle\alpha|\theta\rangle|^2 = \cos^2(\theta - \alpha) \\ \mathcal{P}_{\alpha+\frac{\pi}{2}} &= \left|\left\langle\alpha + \frac{\pi}{2}\right|\theta\right\rangle\right|^2 = \sin^2(\theta - \alpha)\end{aligned}$$

Ces résultats sont bien en accord avec la loi de Malus, qui stipule que la transmission est égale au carré du cosinus de la différence entre l'angle de la polarisation incidente et celle du polarisateur.

### 1.1.3

#### PARAMÈTRES DE DESCRIPTION DE L'ÉTAT DE POLARISATION D'UN PHOTON

Cherchons le nombre minimal de paramètres nécessaires pour décrire entièrement l'état de polarisation d'un photon, par exemple dans la base  $\{|\uparrow\rangle, |\leftrightarrow\rangle\}$ ,  $|\psi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\leftrightarrow\rangle$ . *A priori*, il faut les données des parties réelles et imaginaires de  $\alpha$  et  $\beta$ . Toutefois, la normalisation du ket impose que  $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ , et donc par exemple que  $\alpha = e^{i\phi_\uparrow} \cos(\theta)$  et  $\beta = e^{i\phi_\leftrightarrow} \sin(\theta)$ . De plus, la phase globale n'étant pas pertinente dans la description de l'état physique, on peut supposer que  $\phi_\uparrow = 0$ , et donc écrire le ket sous la forme

$$|\psi\rangle = \cos(\theta)|\uparrow\rangle + e^{i\phi} \sin(\theta)|\leftrightarrow\rangle$$

où  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$  et  $\phi \in [0, 2\pi[$ .

### 1.1.4

#### ÉVOLUTION DE L'ÉTAT DE POLARISATION D'UN PHOTON UNIQUE

L'évolution temporelle de l'état de polarisation d'un photon unique fait intervenir un facteur de phase globale :

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{iEt}{\hbar}} |\psi(0)\rangle$$

Un tel préfacteur n'a aucune conséquence sur les mesures que l'on pourra réaliser, et l'on obtiendra toujours les mêmes résultats si l'on mesure selon un ket  $|\chi\rangle$  :

$$\mathcal{P}(t) = |\langle \chi | \psi(t) \rangle|^2 = |\langle \chi | \psi(0) \rangle|^2$$

On peut aussi considérer l'évolution spatiale de l'état de polarisation d'un photon traversant différents systèmes (lame à face parallèle, lame à retard, interféromètre, etc.). Dans le cas d'une lame à face parallèle, on a simplement

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = e^{ikL} |\psi_{\text{in}}\rangle$$

où  $L$  est l'épaisseur de la lame et  $k = \frac{n\omega}{c}$  est le vecteur d'onde dans le matériau. Le déphasage est global est donc le système physique n'est pas changé. Si on considère maintenant la traversée d'un matériau biréfringent, comme une lame à retard, on sait qu'un état incident  $|\uparrow\rangle$  deviendra  $e^{ik_0L} |\uparrow\rangle$  et qu'un état incident  $|\leftrightarrow\rangle$  deviendra  $e^{ik_eL} |\leftrightarrow\rangle$ . En notant  $\phi = (k_e - k_0)L$  le déphasage introduit par la lame à retard, on peut écrire (à une phase globale  $e^{ik_0L}$  près) que pour un état initial  $|\psi\rangle = \alpha |\uparrow\rangle + \beta |\leftrightarrow\rangle$ ,

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = \alpha |\uparrow\rangle + \beta e^{i\phi} |\leftrightarrow\rangle$$

Ces transformations permettent de retrouver l'impact d'une lame demi-onde ( $\phi = \pi$ ) ou demi-onde ( $\phi = \frac{\pi}{2}$ ) sur un état de polarisation linéaire et sur un état de polarisation circulaire :

$$\begin{aligned} |\theta\rangle &\xrightarrow{\phi=\pi} |-\theta\rangle \\ |\pm\rangle &\xrightarrow{\phi=\pi} |\mp\rangle \\ \left|\frac{\pi}{4}\right\rangle &\xrightarrow{\phi=\frac{\pi}{2}} |+\rangle \\ |+\rangle &\xrightarrow{\phi=\frac{\pi}{2}} \left|-\frac{\pi}{4}\right\rangle \end{aligned}$$

## 1.2

## PRINCIPES FONDAMENTAUX EN PHYSIQUE QUANTIQUE

## 1.2.1

## ESPACE DES ÉTATS

## 1.1

**Principe 1 —**

À chaque système physique est associé un espace de Hilbert complexe  $\mathcal{E}_H$ , l'état physique du système étant entièrement défini par un ket normé  $|\psi\rangle \in \mathcal{E}_H$ .

On s'intéresse dans ce cours uniquement à des espaces de Hilbert dits *séparables*, ce qui signifie qu'il admet au moins un ensemble dénombrable de kets  $|\psi_n\rangle$  constituant une base orthonormée de l'espace.

## 1.2.2

## MESURE

On se place premièrement dans le cas **non-dégénéré**.

## 1.2

**Principe 2 —**

- ( $p_1$ ) À toute grandeur physique  $A$  on associe un opérateur linéaire hermitien  $\hat{A}$  de  $\mathcal{E}_H$  appelé **observable**. On suppose ici que le spectre de  $\hat{A}$  est *discret* et *non-dégénéré*.
- ( $p_2$ ) Une mesure de  $A$  ne peut donner comme résultat qu'une valeur propre  $a_n$  de  $\hat{A}$ .
- ( $p_3$ ) Pour un système se trouvant dans l'état  $|\psi\rangle$ , la probabilité de mesurer  $a_n$  est

$$\mathbb{P}(a_n) := |\langle \psi_n | \psi \rangle|^2$$

où  $|\psi_n\rangle$  est le vecteur propre associé à la valeur propre  $a_n$ .

- ( $p_4$ ) Si la mesure de  $A$  donne  $a_n$ , alors le système est dans l'état  $|\psi_n\rangle$  après mesure.

Dans le cas général,

## 1.3

**Principe 2 –**

- ( $p_1$ ) À toute grandeur physique  $A$  on associe un opérateur linéaire hermitien  $\hat{A}$  de  $\mathcal{E}_H$  appelé **observable**. On suppose ici que le spectre de  $\hat{A}$  est de spectre discret.
- ( $p_2$ ) Une mesure de  $A$  ne peut donner comme résultat qu'une valeur propre  $a_n$  de  $\hat{A}$ .
- ( $p_3$ ) Pour un système se trouvant dans l'état  $|\psi\rangle$ , la probabilité de mesurer  $a_n$  est

$$\mathbb{P}(a_n) := \langle \psi | \hat{P}_n | \psi \rangle = \|\hat{P}_n | \psi \rangle\|^2$$

où  $\hat{P}_n$  est le projecteur sur le sous-espace propre associé à la valeur propre  $a_n$ .

- ( $p_4$ ) Si la mesure de  $A$  donne  $a_n$ , alors le système après mesure est dans l'état

$$|\psi'\rangle = \frac{\hat{P}_n | \psi \rangle}{\|\hat{P}_n | \psi \rangle\|}$$

## 1.2.3

**ÉVOLUTION TEMPORELLE**

## 1.4

**Principe 3 –**

L'évolution de l'état  $|\psi(t)\rangle$  du système est gouvernée par l'**équation de Schrödinger**

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle$$

où  $\hat{H}(t)$  est un observable appelé **Hamiltonien** et représentant l'énergie du système.

On peut écrire l'état du système  $|\psi(t)\rangle$  à l'instant  $t$  à partir de l'état  $|\psi(t_0)\rangle$  à l'instant  $t_0$  à l'aide d'un opérateur unitaire  $\hat{U}(t, t_0)$  appelé opérateur d'évolution selon l'expression

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle$$

L'opérateur d'évolution obéit alors à l'équation différentielle

$$i\hbar \frac{\partial \hat{U}(t, t_0)}{\partial t} = \hat{H}(t) \hat{U}(t, t_0)$$

Dans le cas d'un hamiltonien indépendant du temps, la solution de cette équation s'écrit simplement

$$\hat{U}(t, t_0) = \hat{U}(t - t_0) = \exp \left( -i \frac{\hat{H}(t - t_0)}{\hbar} \right)$$

ce qui donne la solution

$$|\psi(t)\rangle = \exp \left( -i \frac{\hat{H}}{\hbar} (t - t_0) \right) |\psi(t_0)\rangle$$

## 2

## OUTILS MATHÉMATIQUES

## 2.1

## NOTATION DE DIRAC

On se place dans l'espace de Hilbert des états  $\mathcal{E}_H$ . On désigne par **ket** et on note  $|\psi\rangle$  tout vecteur de  $\mathcal{E}_H$ . On désigne par **bra** et on note  $\langle\phi|$  tout vecteur de  $\mathcal{E}_H^*$  qui est l'unique fonctionnelle linéaire (d'après le théorème de représentation de Riesz) associée  $|\phi\rangle$ . :

$$\langle\phi| : |\psi\rangle \in \mathcal{E}_H \mapsto \langle\phi|\psi\rangle$$

## 2.1.1

## OPÉRATEURS LINÉAIRES

Un opérateur linéaire  $\hat{A} : \mathcal{E}_H \rightarrow \mathcal{E}_H$  est une fonction linéaire de  $\mathcal{E}_H$  dans lui-même. Si on considère une base  $\{|\psi_n\rangle\}$  de  $\mathcal{E}_H$ , on peut définir la matrice de l'opérateur dans cette base, qui aura pour coefficients

$$A_{m,n} = \langle\psi_m|\hat{A}|\psi_n\rangle$$

ce qui permet d'écrire directement l'opérateur sous la forme

$$\hat{A} = \sum_{m,n} A_{m,n} |\psi_m\rangle \langle\psi_n|$$

L'opérateur le plus commun est l'identité, qui peut s'écrire dans une base orthonormale de  $\mathcal{E}_H$  comme

$$\hat{I} = \sum_n \hat{P}_n := \sum_n |\psi_n\rangle \langle\psi_n|$$

où les  $\hat{P}_n$  sont les projecteurs sur l'espace  $|\psi_n\rangle$ , grâce à l'orthonormalité de la base. On appelle cette écriture la **relation de fermeture**.

## 2.5

**Définition** —

Un opérateur  $\hat{A}$  est dit **hermitien** ou **auto-adjoint** lorsque

## 2.6

$\hat{A} = \hat{A}^\dagger$  où  $\dagger$  est le symbole représentant l'opération de *trans-conjugaison*.

**Théorème spectral** –

Soit  $\hat{A}$  un opérateur hermitien. On suppose que son spectre est *discret*.

Alors  $\hat{A}$  est diagonalisable : il existe une base orthonormée  $\{|\psi_n\rangle\}$  constituée de vecteurs propres de  $\hat{A}$ , et

$$\hat{A} = \sum_n a_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n|$$

où les  $a_n \in \text{sp}(\hat{A})$  sont des réels.

## 2.2

**TRANSFORMATION DE FOURIER**

Considérons le cas d'une particule se déplaçant sur un axe qui décrit sa position. On sait que l'espace des états  $\mathcal{E}_H$  est homéomorphe à  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$  et on se place dans cette sous-section dans le formalisme de  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$ .

On considère la fonction d'onde  $\psi(x) = \langle x | \psi \rangle$  qui décrit l'état physique du système dans l'**espace direct** (associé à la position). On cherche l'expression de  $\tilde{\psi}(p) = \langle p | \psi \rangle$ , qui décrit l'état physique du système dans l'**espace de Fourier** (associé à l'impulsion).

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}(p) &= \langle p | \psi \rangle = \langle p | \hat{I} | \psi \rangle \\ &= \langle p | \left( \int |x\rangle \langle x| dx \right) | \psi \rangle \\ &= \int \psi(x) \langle p | x \rangle dx \end{aligned}$$

Pour exprimer le contenu de cette intégrale, il nous faut la valeur de  $\langle p | x \rangle$ . On sait que  $\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx}$ , donc

$$p \langle x | p \rangle = \langle x | \hat{p} | p \rangle$$

$$= \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \langle x | p \rangle$$

Par résolution de l'équation différentielle, on obtient  $\langle x | p \rangle = C(p) \exp\left(\frac{ipx}{\hbar}\right)$ , puis la normalisation implique que

$$\langle x | p \rangle = \frac{e^{\frac{ipx}{\hbar}}}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

Donc

$$\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(x) \exp\left(\frac{-ipx}{\hbar}\right) dx := \mathcal{F}[\psi](p)$$

où  $\mathcal{F}$  est la **transformation de Fourier**, qui nous envoie dans l'espace de Fourier.

Des calculs similaires nous donnent directement

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \tilde{\psi}(p) \exp\left(\frac{ipx}{\hbar}\right) dx := \tilde{\mathcal{F}}[\tilde{\psi}](x)$$

où  $\tilde{\mathcal{F}}$  est la **transformation de Fourier inverse**, qui nous permet de revenir dans l'espace direct.

### 2.2.1

### PROPRIÉTÉS

#### 2.7

#### **Théorème —**

Soient deux fonctions d'onde  $\psi_1(x)$  et  $\psi_2(x)$ .

$$\int \psi_1^*(x) \psi_2(x) dx = \int \tilde{\psi}_1^*(x) \tilde{\psi}_2(x) dx$$

**Démonstration —** Dans le cadre du formalisme de Dirac, on a directement, d'après les relations de fermeture,

$$\begin{aligned} \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle &= \int \langle \psi_1 | x \rangle \langle x | \psi_2 \rangle dx \\ &= \int \langle \psi_1 | p \rangle \langle p | \psi_2 \rangle dp \end{aligned}$$

■

2.8

**Proposition —**

Soit  $\psi(x)$  une fonction d'onde.

$$\mathcal{F}\left[\frac{d^n \psi}{dx^n}\right] = \left(\frac{ip}{\hbar}\right)^n \mathcal{F}[\psi]$$

$$\tilde{\mathcal{F}}\left[\frac{d^n \tilde{\psi}}{dp^n}\right] = \left(-\frac{ix}{\hbar}\right)^n \tilde{\mathcal{F}}[\tilde{\psi}]$$

**Preuve —** On dérive sous l'intégrale. ■

2.9

**Proposition —**

Soit  $\psi(x)$  une fonction d'onde.

$$\mathcal{F}[\psi(x - x_0)](p) = \tilde{\psi}(p) \exp\left(-\frac{ipx_0}{\hbar}\right)$$

$$\tilde{\mathcal{F}}[\tilde{\psi}(p - p_0)](x) = \psi(x) \exp\left(\frac{ip_0x}{\hbar}\right)$$

**Preuve —** Le facteur de phase apparaît dans la transformation de Fourier de la fonction translatée. ■

2.10

**Proposition —**

Soient deux fonctions d'onde  $\psi_1(x)$  et  $\psi_2(x)$ .

$$\mathcal{F}[\psi_1 \psi_2](p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} (\tilde{\psi}_1 \star \tilde{\psi}_2)(p)$$

$$\tilde{\mathcal{F}}[\tilde{\psi}_1 \tilde{\psi}_2](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} (\psi_1 \star \psi_2)(p)$$

2.3

## PRODUIT TENSORIEL

Soient  $\mathcal{E}_a$  et  $\mathcal{E}_b$  deux espaces de Hilbert associés aux sous-systèmes  $(a)$  et  $(b)$ , munis des bases hilbertiennes  $\{|\alpha_m\rangle\}$  et  $\{|\beta_n\rangle\}$ .

## 2.11

**Définition —**

Le **produit tensoriel** est un opérateur bilinéaire

$$\otimes : \mathcal{E}_a \times \mathcal{E}_b \rightarrow \mathcal{E}_a \otimes \mathcal{E}_b$$

où  $\mathcal{E}_H := \mathcal{E}_a \otimes \mathcal{E}_b$  est un espace vectoriel de Hilbert permettant de décrire l'état du système  $\{(a), (b)\}$  de base hilbertienne dite **base tensorielle**  $\{|\alpha_m\rangle \otimes |\beta_n\rangle\}$ .

La base tensorielle nous indique que  $\dim(\mathcal{E}_H) = \dim(\mathcal{E}_a) \times \dim(\mathcal{E}_b)$ , et la forme générale d'un élément de  $\mathcal{E}_H$  est donc

$$|\psi\rangle = \sum_{m,n} c_{m,n} |\alpha_m\rangle \otimes |\beta_n\rangle$$

On appellera alors **états factorisés** les  $|\phi\rangle \in \mathcal{E}_H$  qui s'écrivent sous la forme

$$|\phi\rangle = \left( \sum_m a_m |\alpha_m\rangle \right) \otimes \left( \sum_n b_n |\beta_n\rangle \right)$$

i.e. les états tels que  $c_{m,n} = a_m b_n$ . On parle dans le cas contraire d'**état intriqué**.

## 2.4

**INÉGALITÉ DE HEISENBERG**

Résultat fameux de la physique quantique, stipulant que l'on aura toujours  $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ , l'inégalité de Heisenberg peut être démontrée dans un cadre plus général pour deux observables quelconques  $\hat{A}$  et  $\hat{B}$ .

Commençons dans un premier temps par prouver l'**inégalité de Cauchy-Schwarz**.

## 2.12

**Proposition —**

Soit  $|\psi\rangle, |\psi'\rangle$  des éléments d'un espace de Hilbert  $\mathcal{E}_H$ .

$$|\langle \psi | \psi' \rangle| \leq \langle \psi | \psi \rangle \langle \psi' | \psi' \rangle$$

avec égalité dans le cas où il existe un scalaire  $\lambda \in \mathbb{C}$  tel que  $|\psi\rangle = \lambda |\psi'\rangle$ .

## 2.13

**Preuve —**

■

On considère désormais un système placé dans l'état  $|\psi\rangle$  ainsi que .

**Théorème —**

Soient  $|\psi\rangle \in \mathcal{E}_H$  et deux observables  $\hat{A}$  et  $\hat{B}$ .

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle \right|$$

avec saturation (égalité) lorsque, pour un certain scalaire  $\lambda \in \mathbf{R}$ ,

$$(\hat{B} - \langle B \rangle) |\psi\rangle = i\lambda (\hat{A} - \langle A \rangle) |\psi\rangle$$

**Démonstration —**

■

Dans le cas particulier des observables position  $\hat{x}$  et impulsion  $\hat{p}$ , sachant que leur commutateur est  $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{I}$ , on obtient

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Le cas de saturation s'obtient lorsque l'on a  $\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}$ . Considérons d'abord le cas particulier d'un paquet d'onde centré  $|\psi_0\rangle$  (i.e. tel que  $\langle x \rangle = \langle p \rangle = 0$ ). La saturation impose qu'il existe un nombre réel tel que  $\hat{p} |\psi_0\rangle = i\lambda \hat{x} |\psi_0\rangle$  soit, dans l'espace  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$ ,

$$\frac{\hbar}{i} \frac{d\psi_0}{dx}(x) = i\lambda x \psi_0(x)$$

Il s'agit de l'équation différentielle génératrice d'une gaussienne, qui admet la solution normalisée

$$\psi_0(x) = \frac{1}{(2\pi\Delta x^2)^{\frac{1}{4}}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\Delta x^2}\right)$$

Ramenons-nous désormais au cas général : on considère  $|\psi_1\rangle$  résultant d'une translation dans l'espace de Fourier d'une quantité  $p_0$  (i.e.  $\tilde{\psi}_1(p) = \tilde{\psi}_0(p - p_0)$ ). Cela revient à une multiplication

de phase dans l'espace direct :

$$\psi_1(x) = \psi_0(x) \exp\left(\frac{ip_0x}{\hbar}\right)$$

On effectue ensuite une translation dans l'espace direct pour obtenir un état centré sur une position  $x_0$  arbitraire. Finalement,

$$\psi(x) = \frac{e^{\frac{ip_0(x-x_0)}{\hbar}}}{(2\pi\Delta x^2)^{\frac{1}{4}}} \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{4\Delta x^2}\right)$$

Dans l'espace de Fourier, cette gaussienne prend la forme

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}(p) &= \frac{e^{-\frac{ipx_0}{\hbar}}}{\left(\frac{\pi\hbar^2}{2\Delta x^2}\right)^{\frac{1}{4}}} \exp\left(-\frac{(p-p_0)^2}{\frac{\hbar^2}{\Delta x^2}}\right) \\ &= \frac{e^{-\frac{ipx_0}{\hbar}}}{(2\pi\Delta p^2)^{\frac{1}{4}}} \exp\left(-\frac{(p-p_0)^2}{4\Delta p^2}\right) \end{aligned}$$

# 3

## MÉTHODES D'APPROXIMATION

Seuls certains problèmes de mécanique quantique (oscillateur harmonique, mouvement d'une particule chargée dans un potentiel coulombien) peuvent être résolus de façon exacte. Pour d'autres problèmes, on se ramène à des méthodes d'approximation.

### 3.1

### MÉTHODE DES PERTURBATIONS

#### 3.1.1

#### PRINCIPE

Cette méthode repose sur la recherche des valeurs et vecteurs propres d'un hamiltonien indépendant du temps, sachant que celui-ci peut s'écrire sous la forme  $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{W}$ , où  $\hat{H}_0$  représente l'hamiltonien principal tandis que  $\hat{W}$  est une perturbation supposée petite devant  $\hat{H}_0$ .

On suppose que les vecteurs et valeurs propres de  $\hat{H}_0$  sont connues, et on notera

$$\hat{H}_0 |n, r\rangle = E_n |n, r\rangle$$

où  $r \in \llbracket 1, g_n \rrbracket$  représente le niveau de dégénérescence du niveau d'énergie  $E_n$ . On posera  $\hat{W} = \lambda \hat{H}_1$  où  $\hat{H}_1$  est du même ordre de grandeur que  $\hat{H}_0$  tandis que  $\lambda \ll 1$ .

L'idée de base de la méthode consiste à considérer les vecteurs propres  $|\psi(\lambda)\rangle$  et les valeurs propres  $E(\lambda)$  de l'hamiltonien  $\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}_1$  et à effectuer un développement limité en fonction de  $\lambda$  lorsque  $\lambda \rightarrow 0$ . On a ainsi

$$|\psi(\lambda)\rangle = |\psi^{(0)}\rangle + \lambda |\psi^{(1)}\rangle + \dots$$

et

$$E(\lambda) = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \dots$$

L'équation aux valeurs propres s'écrit alors

$$\begin{pmatrix} \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}_1 \\ (|\psi^{(0)}\rangle + \lambda |\psi^{(1)}\rangle + \dots) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E(\lambda) \\ (E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \dots) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\psi(\lambda)\rangle \\ (|\psi^{(0)}\rangle + \lambda |\psi^{(1)}\rangle + \dots) \end{pmatrix}$$

En identifiant les coefficients d'ordre successifs dans les polynômes en  $\lambda$  figurant dans les deux membres de l'égalité ci-dessus, on obtient donc que

$$\begin{aligned}\hat{H}_0 \left| \psi^{(0)} \right\rangle &= E^{(0)} \left| \psi^{(0)} \right\rangle \\ \hat{H}_0 \left| \psi^{(1)} \right\rangle + \hat{H}_1 \left| \psi^{(0)} \right\rangle &= E^{(0)} \left| \psi^{(1)} \right\rangle + E^{(1)} \left| \psi^{(0)} \right\rangle \\ &\vdots\end{aligned}$$

La méthode consiste à résoudre successivement cette hiérarchie d'équations, en allant jusqu'à l'ordre d'approximation souhaité. On va ici se restreindre au second ordre, souvent largement suffisant.

### 3.1.2

#### CAS D'UN NIVEAU NON DÉGÉNÉRÉ

#### 3.14

##### *Méthode des perturbations (cas non dégénéré) –*

On considère un hamiltonien  $\hat{H}_0$  (d'états propres  $\{|n\rangle\}$  connus et non dégénérés tels que  $\hat{H}_0 |n\rangle = E_n |n\rangle$ ) auquel on ajoute une perturbation  $\hat{W}$  petite devant  $\hat{H}_0$ . On peut écrire l'énergie sous la forme du développement

$$E = E_n + \delta E_n^{(1)} + \delta E_n^{(2)} + \dots$$

où  $\delta E_n^{(k)}$  correspond au terme d'ordre  $k$  en  $\hat{W}$ . On obtient alors les expressions suivantes du déplacement de l'énergie au premier et second ordre :

$$\begin{aligned}\delta E_n^{(1)} &= \langle n | \hat{W} | n \rangle \\ \delta E_n^{(2)} &= \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m | \hat{W} | n \rangle|^2}{E_n - E_m}\end{aligned}$$

On peut aussi développer l'état propre perturbé de  $\hat{H}$  sous la forme

$$|\psi\rangle = |n\rangle + |\delta\psi_n^{(1)}\rangle + |\delta\psi_n^{(2)}\rangle + \dots$$

avec, au premier ordre,

$$|\delta\psi_n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | \hat{W} | n \rangle}{E_n - E_m} | m \rangle$$

**Preuve** — On considère le cas où  $E^{(0)}$  est non dégénéré. On pose  $E^{(0)} = E_n$  et  $|\psi^{(0)}\rangle = |n\rangle$  où  $E_n$  est l'une des valeurs propres de  $\hat{H}_0$ . On a alors le système d'équations (en se limitant au premier ordre)

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 | n \rangle &= E_n | n \rangle \\ \hat{H}_0 |\psi^{(1)}\rangle + \hat{H}_1 | n \rangle &= E_n |\psi^{(1)}\rangle + E^{(1)} | n \rangle \end{aligned}$$

En multipliant à gauche la deuxième équation par le bra  $\langle m |$ , vecteur propre de  $\hat{H}_0$  pour la valeur propre  $E_m$ , on obtient

$$\begin{aligned} \langle m | \hat{H}_0 |\psi^{(1)}\rangle + \langle m | \hat{H}_1 | n \rangle &= E_n \langle m | \psi^{(1)} \rangle + E^{(1)} \langle m | n \rangle \\ \langle m | \hat{H}_1 | n \rangle &\stackrel{\text{†}}{=} (E_n - E_m) \langle m | \psi^{(1)} \rangle + E^{(1)} \langle m | n \rangle \end{aligned}$$

En appliquant ce résultat au cas  $m = n$ , on obtient que

$$E^{(1)} = \langle n | \hat{H}_1 | n \rangle$$

Puis avec  $m \neq n$ , on obtient que

$$\langle m | \psi^{(1)} \rangle = \frac{\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle}{E_n - E_m}$$

Cette équation nous informe sur la valeur de  $\langle m | \psi^{(1)} \rangle$  pour tout  $m \neq n$  mais ne nous donne pas d'information sur  $\langle n | \psi^{(1)} \rangle$ . On peut déterminer sa valeur par un développement de  $|\psi(\lambda)\rangle$  au premier ordre en  $\lambda$  :

$$\begin{aligned} \langle \psi(\lambda) | \psi(\lambda) \rangle &= \left( \langle n | + \lambda \langle \psi^{(1)} | \right) \left( | n \rangle + \lambda | \psi^{(1)} \rangle \right) + O_{\lambda \rightarrow 0}(\lambda^2) \\ &= 1 + \lambda \left( \langle n | \psi^{(1)} \rangle + \langle \psi^{(1)} | n \rangle \right) + O_{\lambda \rightarrow 0}(\lambda^2) \end{aligned}$$

La condition de normalisation du ket  $|\psi(\lambda)\rangle$  implique que la partie réelle de  $\langle n | \psi^{(1)} \rangle$  soit nulle et donc  $\langle n | \psi^{(1)} \rangle = i\beta$ . Ainsi,

$$\begin{aligned} |\psi^{(1)}\rangle &= \sum_m |m\rangle \langle m | \psi^{(1)} \rangle \\ &= |n\rangle \langle n | \psi^{(1)} \rangle + \sum_{m \neq n} |m\rangle \langle m | \psi^{(1)} \rangle \\ &= i\beta |n\rangle + \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle}{E_n - E_m} |m\rangle \end{aligned}$$

Le paramètre  $\beta$  est libre, et peut prendre n'importe quelle valeur. Il est lié à la phase globale du vecteur d'état :

$$\begin{aligned} |\psi(\lambda)\rangle &= |\psi^{(0)}\rangle + |\psi^{(1)}\rangle + O_{\lambda \rightarrow 0}(\lambda^2) \\ &= (1 + i\lambda\beta) |n\rangle + \lambda \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle}{E_n - E_m} |m\rangle + O_{\lambda \rightarrow 0}(\lambda^2) \\ &= e^{i\lambda\beta} \left( |n\rangle + \lambda \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle}{E_n - E_m} |m\rangle \right) + O_{\lambda \rightarrow 0}(\lambda^2) \end{aligned}$$

La phase n'ayant pas d'impact sur l'état, on peut choisir  $\beta = 0$ , ce qui donne finalement

$$|\psi^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle}{E_n - E_m} |m\rangle$$

Pour l'ordre 2, considérons la troisième équation provenant de l'égalité initiale  $\hat{H}_\lambda |\psi(\lambda)\rangle = E(\lambda) |\psi(\lambda)\rangle$ ,

$$\hat{H}_0 |\psi^{(2)}\rangle + \hat{H}_1 |\psi^{(1)}\rangle = E^{(0)} |\psi^{(2)}\rangle + E^{(1)} |\psi^{(1)}\rangle + E^{(2)} |\psi^{(0)}\rangle$$

et projetons-la sur le bra  $\langle n |$ . Comme  $\langle n | \hat{H}_0 = E_n \langle n |$  et  $\langle n | \psi^{(1)} \rangle = 0$ , on obtient que

$$E^{(2)} = \langle n | \hat{H}_1 | \psi^{(1)} \rangle = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m | \hat{H}_1 | n \rangle|^2}{E_n - E_m}$$

■

Remarquons qu'avec le résultat de cette méthode, on peut interpréter l'énergie au premier ordre par la formule

$$E \approx E_n + \delta E_n^{(1)} = \langle n | \hat{H}_0 | n \rangle + \langle n | \hat{W} | n \rangle = \langle n | \hat{H} | n \rangle$$

L'énergie perturbée d'un niveau donné est donc à peu près égale à la valeur moyenne de l'hamiltonien total dans l'état non perturbé, ce qui constitue un résultat relativement intuitif.

### 3.1.3

#### CAS D'UN NIVEAU DÉGÉNÉRÉ

On considère le cas où  $E^{(0)} = E_n$  est dégénéré. On posera ainsi  $\hat{H}_0 |n, r\rangle = E_n |n, r\rangle$  où  $r \in \llbracket 1, g_n \rrbracket$  où  $g_n$  est la dimension du sous-espace propre associé. Reprenons alors l'étude du système d'équations

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 | \psi^{(0)} \rangle &= E^{(0)} | \psi^{(0)} \rangle \\ \hat{H}_0 | \psi^{(1)} \rangle + \hat{H}_1 | \psi^{(0)} \rangle &= E^{(0)} | \psi^{(1)} \rangle + E^{(1)} | \psi^{(0)} \rangle \\ \hat{H}_0 | \psi^{(2)} \rangle + \hat{H}_1 | \psi^{(1)} \rangle &= E^{(0)} | \psi^{(2)} \rangle + E^{(1)} | \psi^{(1)} \rangle + E^{(2)} | \psi^{(0)} \rangle \end{aligned}$$

On peut écrire le vecteur  $| \psi^{(0)} \rangle$  comme un élément du sous-espace propre soit

$$| \psi^{(0)} \rangle = \sum_{r=1}^{g_n} c_r | n, r \rangle$$

En projetant la seconde équation sur le bra  $\langle n, r |$ , sachant que  $\langle n, r | \hat{H}_0 = E_n \langle n, r |$ , on obtient

$$\langle n, r | \hat{H}_1 \sum_{r'=1}^{g_n} c_{r'} | n, r' \rangle = E^{(1)} c_r$$

qui, après multiplication par  $\lambda$  se réécrit

$$\sum_{r'=1}^{g_n} \langle n, r | \hat{W} | n, r' \rangle c_{r'} = \delta E^{(1)} c_r$$

On a alors un système de  $g_n$  équations linéaires pouvant s'écrire sous forme matricielle

$$\begin{bmatrix} \langle n, 1 | \hat{W} | n, 1 \rangle & \cdots & \langle n, 1 | \hat{W} | n, g_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle n, g_n | \hat{W} | n, 1 \rangle & \cdots & \langle n, g_n | \hat{W} | n, g_n \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \delta E^{(1)} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

## 3.2 MÉTHODE VARIATIONNELLE

### 3.2.1 MAJORATION DE L'ÉNERGIE DU NIVEAU FONDAMENTAL

Remarquons que pour tout état  $|\psi\rangle$  de l'espace de Hilbert considéré,

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \geq E_0$$

où  $E_0$  est l'énergie du niveau fondamental. Il y a égalité uniquement lorsque l'état  $|\psi\rangle$  appartient au sous-espace propre du niveau fondamental.

### 3.2.2 LA MÉTHODE VARIATIONNELLE

Le problème d'optimisation consistant à minimiser la grandeur  $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$  est équivalent à la recherche de l'énergie  $E_0$  du niveau fondamental et de l'état propre associé.

### 3.15

#### *Méthode variationnelle —*

La méthode variationnelle consiste à se donner un ensemble  $\{|\phi_\alpha\rangle\}$  de vecteurs d'essai appartenant à un sous-ensemble de l'espace de Hilbert et chercher le minimum de la grandeur

$$E(\alpha) = \frac{\langle \phi_\alpha | \hat{H} | \phi_\alpha \rangle}{\langle \phi_\alpha | \phi_\alpha \rangle}$$

On approximera ainsi  $E_0$  par  $E(\alpha_{\min})$  et l'état propre fondamental par  $\frac{|\phi_{\min}\rangle}{\|\phi_{\min}\|}$ .

La précision de la méthode dépend de la pertinence de l'espace des fonctions d'essais, souvent choisi par considérations physiques.

### 3.2.3 LA MÉTHODE VARIATIONNELLE LINÉAIRE

Le problème variationnel linéaire correspond au cas particulier où  $\mathcal{E}_{\text{essai}}$  est un sous-espace vectoriel de l'espace de Hilbert.

## 3.16

**Méthode variationnelle linéaire —**

La méthode variationnelle linéaire consiste à rechercher les extremums de la fonctionnelle

$$E(|\psi\rangle) = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}$$

où  $|\psi\rangle \in \mathcal{E}_{\text{essai}}$  qui est un sous-espace vectoriel de l'espace de Hilbert. Cette recherche s'effectue en diagonalisant la restriction de l'hamiltonien dans l'espace  $\mathcal{E}_{\text{essai}}$ . Les vecteurs propres et valeurs propres ainsi obtenus constituent des approximations des premiers vecteurs propres et valeurs propres de l'hamiltonien  $\hat{H}$ . De plus, les valeurs propres obtenues constituent des bornes supérieures des valeurs exactes.

## 4

## SYMÉTRIES EN PHYSIQUE QUANTIQUE

## 4.1

## INVARIANCE ET COMMUTATION

## 4.1.1

## LE GROUPE DE SYMÉTRIE

On considère le groupe des isométries de l'espace euclidien à trois dimensions (*i.e.* des transformations conservant le produit scalaire donc les distances et les angles) duquel on ne conserve seulement celles *laissant le système physique invariant*. On a ainsi un groupe dit **groupe de symétrie**, qui peut être discret (rotations  $n \times \frac{2\pi}{6}$  du benzène, translations d'un cristal) ou infini (translations d'un système homogène, rotations pour un système invariant par rotation).

## 4.17

***Théorème (de Noether) —***

À toute invariance du système on peut associer une quantité physique conservée.

Étudier les symétries d'un système physique est donc judicieux pour trouver des grandeurs conservées. Il est intéressant de remarquer que pour toute isométrie  $\hat{R}$  d'un espace de Hilbert  $\mathcal{E}_H$ , la contrainte  $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \hat{R}^\dagger \hat{R} | \psi_2 \rangle$  pour toutes fonctions d'ondes  $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in \mathcal{E}_H$  implique que

$$\hat{R}^\dagger \hat{R} = \hat{I}$$

Et étant donné qu'une isométrie est nécessairement inversible, on a directement

$$\hat{R} \hat{R}^\dagger = \hat{I}$$

donc  $\hat{R}$  est un *opérateur unitaire*.

## 4.1.2

 COMMUTATION AVEC  $\hat{H}$

#### 4.18

##### **Commutation de $\hat{R}$ et $\hat{H}$ —**

Pour tout système invariant par une isométrie  $\mathcal{R}$ , l'hamiltonien  $\hat{H}$  commute avec l'opérateur  $\hat{R}$  représentant cette isométrie dans l'espace de Hilbert, *i.e.*

$$[\hat{R}, \hat{H}(t)] = 0$$

**Preuve** — En effet, considérons un système dans l'état  $|\psi(t_0)\rangle$  à un instant initial  $t_0$ . À  $t_1$ , ce système aura pour état  $|\psi(t_1)\rangle = \hat{U}(t_1, t_0) |\psi(t_0)\rangle$ . Que l'on tranforme ce système avant ou après son évolution n'a pas d'impact par définition de l'invariance par l'isométrie. Ainsi,

$$\hat{R}\hat{U}(t_1, t_0) |\psi(t_0)\rangle = \hat{U}(t_1, t_0)\hat{R} |\psi(t_0)\rangle$$

Par validité pour tout état initial, on a donc

$$\hat{R}\hat{U}(t_1, t_0) = \hat{U}(t_1, t_0)\hat{R} \quad \text{i.e.} \quad [\hat{R}, \hat{U}(t_1, t_0)] = 0$$

puis en dérivant par rapport à  $t_1$ , et sachant que d'après l'équation de Schrödinger  $i\hbar \frac{\partial \hat{U}(t, t_0)}{\partial t} = \hat{H}(t)\hat{U}(t, t_0)$ , on obtient alors que

$$[\hat{R}, \hat{H}(t)] = 0$$

■

Ceci implique immédiatement, d'après le théorème d'Erhenfest, que la grandeur  $R$  se conserve au cours du temps.

Lorsque l'hamiltonien est indépendant du temps, la recherche de ses états propres sera en outre simplifiée par le fait que les opérateurs  $\hat{R}$  et  $\hat{H}$  peuvent être diagonalisés dans une même base.

#### 4.1.3

##### **GÉNÉRATEUR INFINITÉSIMAL**

On considère un groupe de symétrie continue, que l'on admettra qu'il peut être caractérisé par un paramètre  $a$ . On admet aussi que lorsque c'est un groupe de Lie, on peut différencier l'opérateur  $\hat{R}_a$  par rapport à  $a$ .

#### 4.19

##### **Générateur infinitésimal** –

Soit  $\hat{R}_a$  une isométrie dépendant d'un paramètre  $a$ . On appelle **générateur infinitésimal** l'opérateur  $\hat{G}$  défini par

$$\hat{R}_{da} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{G} da$$

Pour satisfaire l'unitarité de  $\hat{R}_{da}$ , il faut et il suffit que  $\hat{G} = \hat{G}^\dagger$ , i.e. que  $\hat{G}$  soit un opérateur *auto-adjoint* (*hermitien*). On peut donc lui associer une grandeur physique observable. Par définition de  $\hat{G}$ , on a

$$\hat{G} = i\hbar \frac{\partial \hat{R}_a}{\partial a} (a = 0)$$

et sachant que  $[\hat{R}_{da}, \hat{H}(t)] = 0$ , on trouve que

$$[\hat{G}, \hat{H}] = 0$$

La grandeur physique  $G$  associée à  $\hat{G}$  est donc une constante du mouvement : il s'agit de la version quantique du théorème de Noether.

Avec cette nouvelle définition, on peut réinterpréter les rôles de  $\hat{U}$  et  $\hat{H}$ . En effet, en étudiant l'évolution d'un ket entre  $t$  et  $t + dt$ , on a que

$$|\psi(t + dt)\rangle = \hat{U}(t + dt, t) |\psi(t)\rangle$$

Or on sait aussi, d'après l'équation de Schrödinger que

$$\begin{aligned} |\psi(t + dt)\rangle &= |\psi(t)\rangle + dt \frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} + O(dt^2) \\ &= \left[ \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{H}(t) dt \right] |\psi(t)\rangle + O(dt^2) \end{aligned}$$

$\hat{H}$  est donc le générateur infinitésimal de l'évolution temporelle, et on retrouve l'unitarité de  $\hat{U}$ .

#### 4.2

##### **PARITÉ**

On note  $\hat{\Pi}$  l'opérateur parité, dont l'action sur une fonction d'onde  $\psi(x)$  de  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$  est,

$$(\hat{\Pi}_x \psi)(x) = \psi(-x) \quad \text{i.e.} \quad \langle x | \hat{\Pi}_x | \psi \rangle = \langle -x | \psi \rangle$$

On a ainsi  $\langle x | \hat{\Pi}_x = \langle -x |$  et donc, par unitarité  $\hat{\Pi}_x | x \rangle = | -x \rangle$ , ce que l'on aurait pu prendre comme point de départ.

On peut aussi considéré l'opérateur parité dans  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$ , soit par la symétrie miroir par rapport à  $x = 0$  définie par

$$(\hat{\Pi}_x \psi)(x, y, z) = \psi(-x, y, z)$$

ou l'inversion définie par

$$(\hat{\Pi} \psi)(\vec{r}) = \psi(-\vec{r}) \quad \text{i.e.} \quad \hat{\Pi} | \vec{r} \rangle = | -\vec{r} \rangle$$

On remarque immédiatement que  $\hat{\Pi}^2 = \hat{I}$ , donc les valeurs propres de l'opérateur parité sont  $\pm 1$ . Les états propres associés à la valeur propre  $+1$  sont appelés états symétriques ou pairs, et obéissent à la relation  $\psi_S(-x) = \psi_S(x)$ , et les états associés à  $-1$ , appelés états antisymétriques ou impairs, obéissent à la relation  $\psi_A(-x) = -\psi_A(x)$ .

On peut donc chercher les états propres sous forme d'états pairs et impairs, puis diagonaliser l'hamiltonien dans cette base (étant donné que  $[\hat{\Pi}_x, \hat{H}]$ ).

## 4.3

### TRANSLATIONS

Considérons un système invariant par *toute translation*, quelle que soit sa direction où son amplitude. Un tel système est nécessairement homogène.

#### 4.3.1

#### TRANSLATION DANS L2R

On considère les translations de la forme  $x \mapsto x + a$ , i.e. les opérateurs de la forme

$$\hat{T}_a | x \rangle = | x + a \rangle$$

Son opérateur adjoint  $\hat{T}_a^\dagger$  est la translation inverse  $\hat{T}_{-a}$ .

En passant à l'adjoint dans l'égalité,  $\hat{T}_a^\dagger | x \rangle = | x - a \rangle$ , on obtient que  $\langle x | \hat{T}_a = \langle x - a |$  d'où

$$\langle x | \hat{T}_a | \psi \rangle = \langle x - a | \psi \rangle = \psi(x - a)$$

On peut considérer la translation infinitésimale  $\hat{T}_{da}$ . On a dans ce cas

$$\begin{aligned}\langle x | \hat{T}_{da} | \psi \rangle &= \psi(x - da) \\ &= \psi(x) - da \frac{\partial \psi}{\partial x} \\ &= \left( 1 - \frac{i}{\hbar} da \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) \\ &= \langle x | \left( \hat{I} - \frac{i}{\hbar} da \hat{p}_x \right) | \psi \rangle\end{aligned}$$

On en déduit que  $\hat{T}_{da} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} da \hat{p}_x$ , et que l'impulsion  $\hat{p}_x$  est le générateur infinitésimal du groupe des translations. En utilisant l'additivité des opérateurs translations ( $\hat{T}_{a+b} = \hat{T}_a \hat{T}_b$ ), on remarque que

$$\begin{aligned}\hat{T}_{a+da} &= \hat{T}_{da} \hat{T}_a \\ &= \hat{T}_a - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_x \hat{T}_a da\end{aligned}$$

c'est-à-dire que

$$\frac{d\hat{T}_a}{da} = -\frac{i}{\hbar} \hat{p}_x \hat{T}_a$$

On obtient une équation analogue à cette qui porte sur l'opérateur d'évolution, et la solution sera donc de la même forme :

$$\hat{T}_a = \exp\left(-\frac{i\hat{p}_x a}{\hbar}\right)$$

#### 4.3.2

#### TRANSLATION DANS L2R3

On généralise la procédure précédente en prenant un vecteur  $\vec{a}$ , et la translation  $\hat{T}_{\vec{a}}$  s'écrit comme composition des translations selon les trois axes.

$$\hat{T}_{\vec{a}} = \exp\left(-\frac{i\hat{p}_z a_z}{\hbar}\right) \exp\left(-\frac{i\hat{p}_y a_y}{\hbar}\right) \exp\left(-\frac{i\hat{p}_x a_x}{\hbar}\right)$$

par translations entre les opérateurs, on obtient

$$\hat{T}_{\vec{a}} = \exp\left(-\frac{i\hat{\vec{p}} \cdot \vec{a}}{\hbar}\right)$$

Si on redéveloppe au plus bas ordre dans le cas d'une transformation infinitésimale, on obtient que

$$\hat{T}_{d\vec{a}} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_x da_x - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_y da_y - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_z da_z$$

Les observables  $\hat{p}_{x,y,z}$  sont donc les générateurs infinitésimaux du groupe des translations.

#### 4.3.3

#### NOUVELLE DÉFINITION DE L'OBSERVABLE IMPULSION

Une nouvelle approche basée sur la définition de l'impulsion  $\hat{\vec{p}}$  est plus générale puisqu'elle s'applique à tout système physique.

#### 4.20

##### **Définition (observable impulsion) —**

On appelle observable impulsion  $\hat{\vec{p}}$  l'ensemble des trois opérateurs  $(\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z)$  définis comme les générateurs infinitésimaux du groupe des translations, de sorte qu'une translation infinitésimale soit représentée dans l'espace de Hilbert par l'opérateur

$$\hat{T}_{d\vec{a}} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_x da_x - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_y da_y - \frac{i}{\hbar} \hat{p}_z da_z$$

Le groupe des translations étant commutatif, on en déduit que les observables  $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$  commutent entre elles. Dans le cas particulier où  $\mathcal{E}_H = \mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$ , on peut chercher l'expression explicite de l'opérateur impulsion à partir de cette nouvelle définition sachant que

$$\begin{aligned} \langle \vec{r} | \hat{T}_{d\vec{a}} | \psi \rangle &= \psi(\vec{r} - d\vec{a}) \\ &= \psi(\vec{r}) - \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{a} \\ &= \psi(\vec{r}) - \frac{i}{\hbar} \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{a} \end{aligned}$$

ce qui nous donne bien la définition connue dans  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$

$$\hat{\vec{p}} = \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}$$

Mais la nouvelle définition a l'avantage d'être plus générale que cette dernière équation. Dans un système constitué de  $N$

particules, l'opérateur translation s'écrit dans l'espace produit tensoriel  $\mathcal{E}_H = \mathcal{E}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{E}_N$  sous la forme

$$\begin{aligned}\hat{T}_{\vec{d}a} &= \hat{T}_{\vec{d}a}^{(1)} \otimes \cdots \otimes \hat{T}_{\vec{d}a}^{(N)} = \left( \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{\vec{p}}_1 \cdot d\vec{a} \right) \cdots \left( \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{\vec{p}}_N \cdot d\vec{a} \right) \\ &= \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \sum_{j=1}^N \hat{\vec{p}}_j \cdot d\vec{a}\end{aligned}$$

L'opérateur impulsion global est donc, dans  $\mathcal{E}_H$ ,

$$\hat{\vec{P}} = \sum_{j=1}^N \hat{\vec{p}}_j$$

## 4.4

### THÉORÈME DE BLOCH

On se place dans le cadre d'un groupe de symétrie qui n'est plus continu mais discret, en l'occurrence le groupe des translations de pas  $m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$  où  $m, n, p \in \mathbb{Z}$  et où  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  sont linéairement indépendants. C'est le cas de cristaux réguliers en trois dimensions.

#### 4.4.1

##### À UNE DIMENSION

On considère une maille d'atomes linéaire qui s'étend à l'infini, sur un axe  $x$ . Ce système est invariant par la translation  $\hat{T}_a$  où  $a$  est la période du système. Les opérateurs  $\hat{H}$  et  $\hat{T}_a$  commutent, on peut les diagonaliser dans une base commune. Cherchons donc les vecteurs propres de l'opérateur  $\hat{T}_a$  pour ensuite diagonaliser  $\hat{H}$ .

Comme  $\hat{T}_a$  est un opérateur unitaire, ses valeurs propres sont des complexes de module égal à 1. On peut les chercher sous la forme  $\lambda = \exp(-ik_x a)$  où  $k_x$  est un nombre réel *a priori* compris dans l'intervalle  $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$ , ce qui permet à  $\lambda$  de décrire l'ensemble des nombres complexes de module 1.

#### 4.21

##### *Théorème de Bloch (version 1) —*

Les états propres  $|\psi\rangle$  d'un système associé à un potentiel périodique de période  $a$  peuvent être cherchés sous la forme

de fonctions propres de l'opérateur  $\hat{T}_a$ , soit

$$\hat{T}_a |\psi\rangle = \exp(-ik_x a) |\psi\rangle$$

où  $k_x$  est un paramètre assimilé au vecteur d'onde appartenant à l'intervalle  $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$ . Ainsi,

$$\psi(x - a) = \exp(-ik_x a) \psi(x)$$

Bien que  $k_x$  ne soit pas exactement le vecteur d'onde et  $\psi(x)$  pas une onde plane, on peut tout de même chercher cette fonction sous la forme du produit de l'onde plane  $\exp(ik_x x)$  par une enveloppe *a priori* arbitraire  $u(x)$  soit  $\psi(x) = \exp(ik_x x) u(x)$ . La fonction translatée est

$$\begin{aligned} \psi(x - a) &= \exp(ik_x(x - a)) u(x - a) \\ &= \exp(-ik_x a) \exp(ik_x x) u(x - a) \end{aligned}$$

Ainsi,  $\hat{T}_a |\psi\rangle = e^{-ik_x a} |\psi\rangle$  si et seulement si  $u(x - a) = u(x)$ , ce qui revient à dire que  $u$  est une fonction périodique de période  $a$ , ce qui nous permet d'obtenir une seconde formulation au théorème de Bloch.

#### 4.22

##### **Théorème de Bloch (version 2) —**

Les états propres  $|\psi\rangle$  d'un système associé à un potentiel périodique de période  $a$  peuvent être cherchés sous la forme du produit d'une onde plane par une fonction  $u$  périodique de période  $a$ , soit

$$\psi(x) = e^{ik_x x} u(x)$$

où  $k_x$  est un paramètre assimilé au vecteur d'onde et appartenant à l'intervalle  $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$ .

Cherchons désormais les états propres de l'hamiltonien, sous la forme  $\psi(x) = e^{ik_x x} u(x)$ , qui obéissent donc à l'équation  $\hat{H} |\psi\rangle = E |\psi\rangle$ . Comme  $\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m_0} + V(\hat{x})$ , calculons dans un premier temps l'effet de l'impulsion carrée sur la fonction d'onde

$\psi(x)$  :

$$\begin{aligned}\hat{p}_x \psi(x) &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} e^{ik_x x} u(x) \\ &= \frac{\hbar}{i} \left( ik_x e^{ik_x x} u(x) + e^{ik_x x} \frac{\partial u}{\partial x} \right) \\ &= e^{ik_x x} (\hbar k_x + \hat{p}_x) u(x) \\ \hat{p}_x^2 \psi(x) &= \hat{p}_x e^{ik_x x} (\hbar k_x + \hat{p}_x) u(x) \\ &= e^{ik_x x} (\hbar k_x + \hat{p}_x)^2 u(x)\end{aligned}$$

On veut donc que

$$e^{ik_x x} \frac{(\hbar k_x + \hat{p}_x)^2}{2m_0} u(x) + V(x) e^{ik_x x} u(x) = E e^{ik_x x} u(x)$$

ou encore, après simplification,

$$\left( \frac{(\hbar k_x + \hat{p}_x)^2}{2m_0} + V(x) \right) u(x) = E u(x)$$

On peut définir un hamiltonien spécifique  $\hat{H}_{k_x} = \frac{(\hbar k_x + \hat{p}_x)^2}{2m_0} + V(\hat{x})$  afin que l'on puisse réécrire cette équation sous la forme

$$\hat{H}_{k_x} |u\rangle = E |u\rangle$$

Cet hamiltonien agit dans l'espace de Hilbert  $\mathcal{E}_a$  des fonctions périodiques de période  $a$  muni du produit scalaire hermitien

$$\langle u | v \rangle = \int_{-a/2}^{a/2} u^*(x) v(x) dx$$

On peut donc travailler dans  $\mathcal{E}_a$ , plus petit que l'espace  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$  initial, ce qui simplifie la résolution du problème.

## 5

# MOMENT CINÉTIQUE, THÉORIE GÉNÉRALE

### 5.1

## ROTATIONS ET MOMENT CINÉTIQUE

On introduit l'opérateur rotation  $\hat{R}_{\vec{\alpha}}$  correspondant à l'effet dans l'espace de Hilbert à une rotation d'axe colinéaire au vecteur  $\vec{\alpha}$  et d'angle égal à la norme  $\|\vec{\alpha}\|$ . L'espace de Hilbert n'étant pas nécessairement  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$ , la définition d'une rotation n'est pas ici réduite aux rotations de l'espace.

#### 5.1.1

### DÉFINITION DU MOMENT CINÉTIQUE

De même que l'impulsion peut être définie comme le générateur infinitésimal du groupe des translations, on peut définir en toute généralité le moment cinétique comme le générateur infinitésimal du groupe des rotations.

#### 5.23

#### *Définition (moment cinétique) —*

Pour tout système physique, on appelle observable moment cinétique et on note  $\hat{\mathbf{J}}$  l'ensemble des trois opérateurs  $(\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z)$  définis comme les générateurs infinitésimaux du groupe des rotations, de sorte qu'une rotation infinitésimale du système associée au vecteur  $d\vec{\alpha}$  soit représentée dans l'espace de Hilbert par l'opérateur

$$\begin{aligned}\hat{R}_{d\vec{\alpha}} &= \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{J}_x d\alpha_x - \frac{i}{\hbar} \hat{J}_y d\alpha_y - \frac{i}{\hbar} \hat{J}_z d\alpha_z \\ &= \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{\mathbf{J}} \cdot d\vec{\alpha}\end{aligned}$$

Cette écriture infinitésimale nous donne l'équation différentielle

$$\frac{d\hat{R}_{\vec{\alpha}}}{d\vec{\alpha}} = \frac{\hat{R}_{\vec{\alpha}+d\vec{\alpha}} - \hat{R}_{\vec{\alpha}}}{d\vec{\alpha}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\hat{R}_{d\vec{\alpha}} \hat{R}_{\vec{\alpha}} - \hat{R}_{\vec{\alpha}}}{d\vec{\alpha}} \\
 &= -\frac{i}{\hbar} \frac{\hat{\vec{J}} \cdot d\vec{\alpha}}{d\vec{\alpha}} \hat{R}_{\vec{\alpha}}
 \end{aligned}$$

On peut donc exprimer l'opérateur rotation dans l'espace de Hilbert par l'expression générale

$$\hat{R}_{\vec{\alpha}} = \exp \left( -\frac{i}{\hbar} \hat{\vec{J}} \cdot d\vec{\alpha} \right)$$

### 5.1.2

#### RELATIONS DE COMMUTATION D'UN MOMENT CINÉTIQUE

Le groupe des rotations est non commutatif contrairement à celui des translations, ce qui nous permet d'établir des relations de commutation entre les opérateurs des composantes cartésiennes du moment cinétique.

### 5.24

#### *Proposition (relations de commutation) —*

$$\begin{aligned}
 [\hat{J}_x, \hat{J}_y] &= i\hbar \hat{J}_z \\
 [\hat{J}_y, \hat{J}_z] &= i\hbar \hat{J}_x \\
 [\hat{J}_z, \hat{J}_x] &= i\hbar \hat{J}_y
 \end{aligned}$$

*i.e.*

$$\hat{\vec{J}} \times \hat{\vec{J}} = i\hbar \hat{\vec{J}}$$

**Preuve** — Considérons une rotation d'angle  $\alpha$  autour du vecteur unitaire  $\vec{u} = (\cos(\phi), \sin(\phi), 0)$  placé dans le plan  $xy$ . Cette rotation peut s'exprimer comme la composition d'une rotation autour de l'axe  $z$  d'angle  $-\phi$  (ramenant le vecteur  $\vec{u}$  selon l'axe  $x$ ), suivie d'une rotation autour de  $x$  d'angle  $\alpha$ , puis d'une rotation autour de l'axe  $z$  d'angle  $+\phi$ . Ainsi,

$$\begin{aligned}
 \hat{R}_{\vec{u}, \alpha} &= \hat{R}_{z, \phi} \hat{R}_{x, \alpha} \hat{R}_{z, -\phi} \\
 \text{i.e. } e^{-i \frac{\alpha}{\hbar} \hat{\vec{J}} \cdot \vec{u}} &= e^{-i \frac{\phi}{\hbar} \hat{J}_z} e^{-i \frac{\alpha}{\hbar} \hat{J}_x} e^{i \frac{\phi}{\hbar} \hat{J}_z}
 \end{aligned}$$

En faisant tendre  $\alpha$  vers 0, et en développant au premier ordre, on obtient

$$\begin{aligned}\hat{I} - i\frac{\alpha}{\hbar}\hat{\mathbf{J}} \cdot \hat{\mathbf{u}} &= \hat{I} - i\frac{\alpha}{\hbar}e^{-i\frac{\phi}{\hbar}\hat{J}_z}\hat{J}_xe^{i\frac{\phi}{\hbar}\hat{J}_z} \\ \text{i.e. } \hat{\mathbf{J}} \cdot \hat{\mathbf{u}} &= e^{-i\frac{\phi}{\hbar}\hat{J}_z}\hat{J}_xe^{i\frac{\phi}{\hbar}\hat{J}_z}\end{aligned}$$

En faisant ensuite tendre  $\phi$  vers 0, et en développant au premier ordre pareil, on a

$$\begin{aligned}\hat{J}_x + \phi\hat{J}_y &= \hat{J}_x - i\frac{\phi}{\hbar}(\hat{J}_z\hat{J}_x - \hat{J}_x\hat{J}_z) \\ \text{i.e. } [\hat{J}_z, \hat{J}_x] &= i\hbar\hat{J}_y\end{aligned}$$

■

On pourrait aussi partir de ces relations de commutation pour nous assurer qu'une observable est un moment cinétique. En effet, les relations cycliques de commutation permettent à elles seules de définir un moment cinétique.

### 5.1.3

#### L'OBSERVABLE $\hat{J}^2$

On remarque que  $\hat{J}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2$  est un observable qui commute avec n'importe quelle composante du moment cinétique, puisque :

$$[\hat{J}_{x,y,z}, \hat{J}^2] = 0$$

En effet, pour le cas  $\hat{J}_z$  par exemple, on a

$$\begin{aligned}[\hat{J}_z, \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2] &= [\hat{J}_z, \hat{J}_x^2] + [\hat{J}_z, \hat{J}_y^2] \\ &= [\hat{J}_z, \hat{J}_x]\hat{J}_x + \hat{J}_x[\hat{J}_z, \hat{J}_x] + [\hat{J}_z, \hat{J}_y]\hat{J}_y + \hat{J}_y[\hat{J}_z, \hat{J}_y] \\ &= i\hbar\hat{J}_y\hat{J}_x + i\hbar\hat{J}_x\hat{J}_y - i\hbar\hat{J}_x\hat{J}_y - i\hbar\hat{J}_y\hat{J}_x \\ &= 0\end{aligned}$$

On va donc pouvoir construire une base propre commune aux opérateurs  $\hat{J}^2$  et  $\hat{J}_z$ .

## 5.1.4

## SYSTÈME INVARIANT PAR ROTATION

Si un système est invariant par rotation, son hamiltonien commute avec le générateur infinitésimal du groupe des rotations, donc

$$[\hat{H}, \hat{\mathbf{J}}] = \vec{0}$$

Ainsi, pour tout vecteur  $\vec{\alpha}$ , l'hamiltonien commutera avec  $\hat{\mathbf{J}} \cdot \vec{\alpha}$ , et donc avec  $\hat{R}_{\vec{\alpha}}$ . L'hamiltonien commutera également avec  $\hat{J}^2$ . On dispose donc de façon générale un ensemble de trois observables commutant entre eux ( $\hat{H}, \hat{J}_z, \hat{J}^2$ ), qui pourront donc être diagonalisés dans une base propre commune.

## 5.2

## THÉORIE GÉNÉRALE DU MOMENT CINÉTIQUE

## 5.25

**Proposition (co-diagonalisation de  $J^2$  et  $\hat{J}_z$ )** —

- Les valeurs propres de l'observable  $\hat{J}^2$  sont de la forme  $j(j+1)\hbar^2$  où  $j \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\}$ ;
- les valeurs propres de l'observable  $\hat{J}_z$  sont de la forme  $m\hbar$ , où  $m \in \{-j, \dots, j-1, j\}$ ;
- la dimension de l'espace propre commun  $\mathcal{E}_{j,m}$  est indépendante de  $m$ ;
- On peut construire une base propre commune aux observables  $J^2$  et  $\hat{J}_z$ , appelée base standard et notée  $\{|n, j, m\rangle\}$ , à l'aide des relations de récurrence

$$\hat{J}_{\pm} |n, j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}\hbar |n, j, m \pm 1\rangle$$

## 5.2.1

 INTRODUCTION DES PARAMÈTRES  $j$  &  $m$ 

Commençons par la recherche des valeurs et états propres de  $\hat{J}^2$ . La valeur moyenne de  $\hat{J}^2$  dans un état  $|\psi\rangle$  quelconque s'écrit

$$\langle \psi | \hat{J}^2 | \psi \rangle = \|\hat{J}_x | \psi \rangle\|^2 + \|\hat{J}_y | \psi \rangle\|^2 + \|\hat{J}_z | \psi \rangle\|^2 \geq 0$$

Ainsi  $\text{Sp}(\hat{J}^2) \subset \mathbf{R}^+$ . Comme la fonction  $j \mapsto j(j+1)$  est une bijection de  $\mathbf{R}_+$  dans  $\mathbf{R}_+$ , on peut chercher les valeurs propres sous

la forme  $\lambda = j(j+1)\hbar^2$ ,  $j \in \mathbf{R}_+$ . Les états propres  $|\psi\rangle$  cherchés étant communs à  $\hat{J}_z$  et  $\hat{J}^2$ , on introduira aussi le paramètre  $m \in \mathbf{R}$  tel que les valeurs propres de  $\hat{J}_z$  s'écrivent  $\lambda = m\hbar$ . Les espaces propres communs pour les valeurs propres  $j(j+1)\hbar^2$  et  $m\hbar$  seront notés  $\mathcal{E}_{j,m}$ .

### 5.2.2

#### LES OPÉRATEURS + & -

On introduit les opérateurs  $\hat{J}_+ = \hat{J}_x + i\hat{J}_y$  et son adjoint  $\hat{J}_- = \hat{J}_x - i\hat{J}_y$ , qui commutent avec  $\hat{J}^2$  :

$$[J^2, \hat{J}_\pm] = 0$$

Toutefois, ceux-ci ne commutent pas avec  $\hat{J}_z$ , puisque

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = [\hat{J}_z, \hat{J}_x] \pm i[\hat{J}_z, \hat{J}_y] = \pm\hbar\hat{J}_\pm$$

Le produit  $\hat{J}_\mp\hat{J}_\pm$  étant auto-adjoint, il est utile de le calculer explicitement :

$$\hat{J}_\mp\hat{J}_\pm = \hat{J}^2 - \hat{J}_z(\hat{J}_z \pm \hbar\hat{I})$$

Cela nous conduit à exprimer l'observable  $J^2$  en fonction des opérateurs  $\hat{J}_z$  et  $\hat{J}_\pm$  :

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_z^2 + \frac{1}{2}(\hat{J}_-\hat{J}_+ + \hat{J}_+\hat{J}_-)$$

Considérons désormais l'action de  $\hat{J}_\pm$  sur un ket  $|\psi\rangle$  de l'espace  $\mathcal{E}_{j,m}$ . Étant donné que  $\hat{J}_\pm$  commute avec  $J^2$ , le vecteur  $\hat{J}_\pm|\psi\rangle$  reste un vecteur propre de l'opérateur  $J^2$  pour la valeurs propre  $j(j+1)\hbar^2$ . Pour  $\hat{J}_z$ , on remarque que

$$\begin{aligned}\hat{J}_z\hat{J}_\pm|\psi\rangle &= (\hat{J}_\pm\hat{J}_z + [\hat{J}_z, \hat{J}_\pm])|\psi\rangle \\ &= (\hat{J}_\pm m\hbar + \hbar\hat{J}_\pm)|\psi\rangle \\ &= (m \pm 1)\hbar\hat{J}_\pm|\psi\rangle\end{aligned}$$

Ainsi,  $\hat{J}_\pm|\psi\rangle$  est soit un vecteur propre de l'espace commun  $\mathcal{E}_{j,m\pm 1}$ , soit le vecteur nul. Or sa norme vaut :

$$\|\hat{J}_\pm|\psi\rangle\|^2 = \langle\psi|\hat{J}_\mp\hat{J}_\pm|\psi\rangle$$

$$\begin{aligned}
 &= \langle \psi | J^2 - \hat{J}_z(\hat{J}_z \pm \hbar \hat{I}) | \psi \rangle \\
 &= (j(j+1) - m(m \pm 1)) \hbar^2 \\
 &\geq 0
 \end{aligned}$$

On déduit de la positivité de cette norme que, nécessairement,  $m(m \pm 1) \leq j(j+1)$ , ce qui implique la relation

$$-j \leq m \leq j$$

Les cas d'égalité  $\hat{J}_+ | \psi \rangle = \vec{0}$  et  $\hat{J}_- | \psi \rangle = \vec{0}$  seront respectivement atteints dans les cas où  $m = j$  et  $m = -j$ .

### 5.2.3

#### VALEURS AUTORISÉES POUR $j$ & $m$

Les résultats précédemment établis contraignent en réalité grandement les valeurs de  $j$ , et  $m$ , par application répétées des opérateurs  $\hat{J}_\pm$ . Considérons en effet  $| \psi \rangle \in \mathcal{E}_{j,m}$ , avec donc  $m \in [-j, j]$ . Par application répétée de  $\hat{J}_+$ , on obtiendrait à un moment  $m' > j$ , condition impossible. Il faut donc que l'un des vecteurs obtenus s'annule (et alors dans ce cas  $m' = j$ ), *i.e.* il existe un entier  $N$  tel que  $m + N = j$ . En appliquant plutôt  $\hat{J}_-$ , on trouve la condition symétrique, donc il existe un entier  $N'$  tel que  $m - N' = -j$ . Ainsi,  $2j = N + N'$ , *i.e.*

$$j \in \left\{ 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots \right\}$$

Cela implique par ailleurs que  $j - m = N$  soit un nombre entier, soit

$$m \in \{-j, \dots, j-1, j\}$$

Les nombres  $m$  et  $j$  sont par définition soit des entiers, soit des demi-entiers. On approche avec ces restrictions des espaces  $\mathcal{E}_{j,m}$ , qui dépendront cependant largement des problèmes considérés.

### 5.2.4

#### DIMENSION DES ESPACES $\mathcal{E}_{j,m}$

Sachant que notre espace de Hilbert est de dimension au moins 1, il existe au moins 1 vecteur propre commun à  $\hat{J}^2$  et  $J_z$ . Appelons  $j(j+1)\hbar^2$  et  $m_0\hbar$  ses valeurs propres (pour  $\hat{J}^2$  et  $J_z$  respectivement). En appliquant successivement  $\hat{J}_-$ , on peut construire des

éléments des espaces  $\mathcal{E}_{j,m}$  pour  $m \in \{m_0 - 1, \dots, -j\}$ . Construisons alors une base dénombrable de l'espace  $\mathcal{E}_{j,-j}$  et appelons-la  $\{|n, j, -j\rangle\}$ , où  $n \in \llbracket 1, \dim(\mathcal{E}_{j,-j}) \rrbracket$ . À partir de cette base, on peut construire les vecteurs  $|n, j, m\rangle$  où  $m \in \{-j, -j+1, \dots, j\}$  par la relation de récurrence

$$|n, j, m+1\rangle = \frac{\hat{J}_+ |n, j, m\rangle}{\sqrt{j(j+1) - m(m+1)}\hbar}$$

Montrons par récurrence que, pour  $j$  et  $m$  fixés,  $\{|n, j, m\rangle\}_n$  constitue une base dénombrable du sous-espace  $\mathcal{E}_{j,m}$ . Cela montrera alors que la dimension des espaces  $\mathcal{E}_{j,m}$  est indépendante de la valeur de  $m$ , et vaut  $\dim(\mathcal{E}_{j,-j})$ . Le cas  $m = -j$  est vrai. Supposons désormais que le cas  $m$  est vrai, et montrons que le cas  $m+1$  l'est aussi. Remarquons dans un premier temps que les vecteurs formés par la relation de récurrence sont orthonormaux :

$$\begin{aligned} \langle n, j, m+1 | n', j, m+1 \rangle &= \frac{\langle n, j, m | \hat{J}_- \hat{J}_+ | n', j, m \rangle}{(j(j+1) - m(m+1))\hbar^2} \\ &= \frac{(j(j+1) - m(m+1))\hbar^2 \langle n, j, m | n', j, m \rangle}{(j(j+1) - m(m+1))\hbar^2} \\ &= \delta_{n,n'} \end{aligned}$$

Montrons maintenant que ces vecteurs linéairement indépendants engendrent bien la totalité de  $\mathcal{E}_{j,m+1}$ . Soit  $|\psi\rangle \in \mathcal{E}_{j,m+1}$ .  $\hat{J}_- |\psi\rangle \in \mathcal{E}_{j,m}$  donc peut s'écrire sous la forme  $\hat{J}_- |\psi\rangle = \sum_n c_n |n, j, m\rangle$ . Ainsi,

$$\hat{J}_+ \hat{J}_- |\psi\rangle = \sum_n \sqrt{j(j+1) - m(m+1)}\hbar c_n |n, j, m+1\rangle$$

Or on sait que  $\hat{J}_+ \hat{J}_- |\psi\rangle = (j(j+1) - m(m+1))\hbar^2 |\psi\rangle$ . On a donc finalement

$$|\psi\rangle = \sum_n \frac{c_n}{\sqrt{j(j+1) - m(m+1)}\hbar} |n, j, m+1\rangle$$

Cela conclut la démonstration par récurrence.

### 5.3

### ADDITION DE MOMENTS CINÉTIQUES

## 5.3.1

**PRINCIPE À  $N$  PARTICULES**

Considérons un système composite constitué de  $N$  sous-systèmes, chacun décrits par l'espace de Hilbert  $\mathcal{E}^{(n)}$ . Dans l'espace tensoriel, l'opérateur associé à une rotation  $\vec{\alpha}$  s'obtient en écrivant la composition des rotations sur chaque sous-système  $n$ , soit

$$\hat{R}_{\vec{\alpha}} = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{J}_1 \cdot \vec{\alpha}} \dots e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{J}_N \cdot \vec{\alpha}} = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{J} \cdot \vec{\alpha}}$$

où l'on a utilisé le fait que  $\hat{J}_{n \neq m}$  commute avec  $\hat{J}_m$  car ils agissent dans des espaces différents et on a posé

$$\hat{J} = \sum_{n=1}^N \hat{J}_n$$

Dans le cas où le système est invariant par rotation, on pourra diagonaliser dans une même base les observables  $\hat{H}$ ,  $\hat{J}^2$  et  $\hat{J}_z$ . Ce sont donc les états propres du moment cinétique total qui vont nous intéresser. L'**addition des moments cinétiques** est la méthode consistant à déterminer les valeurs propres admissibles du moment cinétique total à partir de celles de ses constituants individuels.

## 5.3.2

**ADDITION DE DEUX SPINS 1/2**

Considérons l'état de spin de deux particules ( $a$ ) et ( $b$ ) dans l'espace  $\mathcal{E}_H = \mathcal{E}_{\text{spin}}^{(a)} \otimes \mathcal{E}_{\text{spin}}^{(b)}$  de dimension 4. On appelle  $\hat{S}_a$  et  $\hat{S}_b$  les observables associées au spin de chacune des deux particules et on décrit le système dans la base  $\{|\pm \pm\rangle\}$  construite à partir des valeurs propres des observables  $\hat{S}_{az}$  et  $\hat{S}_{bz}$ . Le moment cinétique total est

$$\hat{S} = \hat{S}_a + \hat{S}_b$$

## 5.26

**Addition de deux spins 1/2 —**

Les valeurs propres de l'observable  $\hat{S}^2$  sont de la forme  $s(s+1)\hbar^2$  avec  $s \in \llbracket 0, 1 \rrbracket$ . On appelle **base couplée** l'ensemble des vecteurs propres communs de  $\hat{S}^2$  et  $\hat{S}_z$ , qui s'écrivent

dans la base tensorielle selon les expressions :

$$\begin{aligned} |0, 0\rangle &= \frac{|+-\rangle - |-+\rangle}{\sqrt{2}} \\ |1, 1\rangle &= |++\rangle \\ |1, 0\rangle &= \frac{|+-\rangle + |-+\rangle}{\sqrt{2}} \\ |1, -1\rangle &= |--\rangle \end{aligned}$$

L'état  $|0, 0\rangle$  est appelé **état singulet**, tandis que les états correspondant à  $s = 1$  sont appelés **états triplets**.

**Démonstration** — Les valeurs propres associées à cet observable de type moment cinétique ( $\hat{S} \times \hat{S} = i\hbar\hat{S}$ ) sont de la forme  $s(s+1)\hbar^2$  pour  $\hat{S}^2$  et de la forme  $m\hbar$  pour  $\hat{S}_z$ , avec  $s$  et  $m$  entiers ou demi-entiers. La base tensorielle étant une base propre de  $\hat{S}_z$ , on peut directement trouver  $m$  :

$$\begin{aligned} \hat{S}_z |++\rangle &= \frac{\hbar}{2} |++\rangle + \frac{\hbar}{2} |++\rangle = \hbar |++\rangle \\ \hat{S}_z |+-\rangle &= \frac{\hbar}{2} |+-\rangle - \frac{\hbar}{2} |+-\rangle = 0 \\ \hat{S}_z |-+\rangle &= 0 \\ \hat{S}_z |--\rangle &= -\frac{\hbar}{2} |--\rangle - \frac{\hbar}{2} |--\rangle = -\hbar |--\rangle \end{aligned}$$

Ainsi,  $m \in \llbracket -1, 1 \rrbracket$  est un entier, ce qui sera par conséquent le cas de  $s$ , qui peut prendre les valeurs 0 ou 1. Étant donné que l'espace  $\mathcal{E}_{1,1}$  est non dégénéré (engendré par  $|++\rangle$ ), il est de dimension 1. Il en va donc de même pour  $\mathcal{E}_{1,0}$  et  $\mathcal{E}_{1,-1}$  puisque la dimension des espaces  $\mathcal{E}_{s,m}$  ne dépend que de  $s$ . Comme notre espace est de dimension quatre,  $\mathcal{E}_{0,0}$  est nécessairement de dimension 1 aussi.

Construisons explicitement les quatre vecteurs propres communs aux deux observables  $\hat{S}^2$  et  $\hat{S}_z$ . On utilise pour cela la relation

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_- \hat{S}_+ + \hat{S}_z^2 + \hbar \hat{S}_z$$

Cela donne

$$\hat{S}^2 |++\rangle = 2\hbar^2 |++\rangle$$

$|++\rangle$  est donc bien vecteur propre commun aux deux observables, et on peut le noter  $|s=1, m=1\rangle$ . On trouve similairement que  $|--\rangle = |1, -1\rangle$ . Pour trouver  $|1, 0\rangle$ , on peut appliquer  $\hat{S}_-$  :

$$\begin{aligned}\hat{S}_- |s, m\rangle &= \sqrt{s(s+1) - m(m-1)}\hbar |s, m-1\rangle \\ |1, 0\rangle &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\sqrt{2}\hbar} \hat{S}_- |1, 1\rangle \\ &= \frac{|+-\rangle + |-+\rangle}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

Enfin, le vecteur  $|0, 0\rangle$  est orthogonal aux trois autres, et nous pouvons facilement intuiter sa forme

$$|0, 0\rangle = \frac{|+-\rangle - |-+\rangle}{\sqrt{2}}$$

■

### 5.3.3

#### ADDITION DE DEUX MOMENTS CINÉTIQUES QUELCONQUES

On peut répéter la démarche précédente dans le cas général : on se munit de deux moments cinétiques  $\hat{J}_1$  et  $\hat{J}_2$  agissant dans les espaces  $\mathcal{E}^{(1)}$  et  $\mathcal{E}^{(2)}$ . Les opérateurs  $\hat{J}_1^2$ ,  $\hat{J}_{1z}$ ,  $\hat{J}_2^2$  et  $\hat{J}_{2z}$  commutant entre eux, on peut construire une base tensorielle  $\{|n_1, j_1, m_1\rangle \otimes |n_2, j_2, m_2\rangle\}$  de l'espace  $\mathcal{E}_H = \mathcal{E}^{(1)} \otimes \mathcal{E}^{(2)}$  associée aux valeurs propres  $j_i(j_i+1)\hbar$  et  $m_i\hbar$  pour les quatre opérateurs. Ces derniers ne constituant pas obligatoirement un ECOC, les nombres  $n_1$  et  $n_2$  sont a priori nécessaires.

### 5.27

#### Valeurs propres de $\hat{J}^2$ et $\hat{J}_z$ —

Pour des valeurs données des nombres  $j_1$  et  $j_2$ ,

$$\begin{aligned}j &\in [|j_1 - j_2|, j_1 + j_2] \\ m &\in [-j, j]\end{aligned}$$



*Quantique*

*Moment cinétique, théorie générale*

**Preuve à faire —**



## 6

## MOMENT CINÉTIQUE ORBITAL

### 6.1

### DÉFINITION

On considère une particule ponctuelle sans spin dans l'espace euclidien à trois dimensions. L'espace de Hilbert associé est constitué dans ce cas de l'ensemble des fonctions de carré sommable  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$ . Le moment cinétique orbital sera le moment cinétique de ce système. Cela signifie qu'une rotation infinitésimale  $\hat{R}_{d\vec{\alpha}}$  dans  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$  s'écrira

$$\hat{R}_{d\vec{\alpha}} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{\vec{L}} \cdot d\vec{\alpha}$$

Cette définition comme générateur infinitésimal revient à poser :

### 6.28

**Définition (moment cinétique orbital) —**

On appelle **moment cinétique orbital** et on note  $\hat{\vec{L}}$  la quantité

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}}$$

Cette définition nous donne bien les relations de commutation attendues pour un moment cinétique, à savoir

$$\hat{\vec{L}} \times \hat{\vec{L}} = i\hbar \hat{\vec{L}}$$

On pourra donc appliquer au moment cinétique orbital les résultats établis plus haut en matière générale pour tout observable de type moment cinétique.

### 6.2

### THÉORIE GÉNÉRALE DU MOMENT CINÉTIQUE ORBITAL

#### 6.2.1

#### EXPRESSION DES OPÉRATEURS EN COORDONNÉES SPHÉRIQUES

6.29

**Opérateurs différentiels associés à  $\hat{L}$  en coordonnées sphériques —**

$$\begin{aligned}\hat{L}_x &= i\hbar \left( \sin(\varphi) \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos(\varphi)}{\tan(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\ \hat{L}_y &= i\hbar \left( -\cos(\varphi) \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\sin(\varphi)}{\tan(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\ \hat{L}_z &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \hat{L}_{\pm} &= \hbar e^{\pm i\varphi} \left( \pm \frac{\partial}{\partial \theta} + i \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\ \hat{L}^2 &= -\hbar^2 \left( \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right)\end{aligned}$$

**Preuve —** On déduit les expressions des opérateurs en coordonnées sphériques de celles en coordonnées cartésiennes :

$$\begin{aligned}L_x &= \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y = \frac{\hbar}{i} \left( y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ L_y &= \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i} \left( z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \\ L_z &= \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i} \left( x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)\end{aligned}$$

La transformation sphérique  $(x, y, z) \rightarrow (r, \theta, \varphi)$  passe par les relations

$$\begin{aligned}x &= r \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ y &= r \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ z &= r \cos(\theta)\end{aligned}$$

On veut exprimer l'action de l'opérateur moment cinétique sur la fonction d'onde  $\psi(r, \theta, \varphi)$ , en utilisant le fait que le moment cinétique est le générateur infinitésimal du groupe des rotations.

Commençons par une rotation simple d'angle  $d\alpha$  autour de l'axe  $z$ , qui voit  $r$  et  $\theta$  inchangés :

$$\begin{aligned}\hat{R}_{z,d\alpha}\psi(r, \theta, \varphi) &= \psi(r, \theta, \varphi - d\alpha) \\ &= \psi(r, \theta, \varphi) - \frac{\partial\psi}{\partial\varphi}d\alpha\end{aligned}$$

Sachant que par définition,  $\hat{R}_{z,d\alpha} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar}\hat{L}_z d\alpha$ , on en déduit que

$$\hat{L}_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial\varphi}$$

On constate une parfaite analogie avec l'opérateur  $\hat{p}_z$ , associé à une translation le long de l'axe  $z$ , puisqu'une rotation le long de l'axe  $z$  correspond à une translation dans l'espace des  $\varphi$ . On obtient de façon similaire les autres résultats. ■

## 6.2.2

### RECHERCHE DES FONCTIONS PROPRES COMMUNES DE $\hat{L}^2$ ET $\hat{L}_z$ – LES HARMONIQUES SPHÉRIQUES

Dans le cadre du moment cinétique orbital, on notera respectivement les paramètres des valeurs propres par  $\ell$  (pour les valeurs propres  $\ell(\ell + 1)\hbar^2$  de  $\hat{L}^2$ ) et  $m$  (pour les valeurs propres  $m\hbar$  de  $\hat{L}_z$ ) qui sont des entiers ou demi-entiers.

## 6.30

#### Propriétés des harmoniques sphériques –

- $\hat{L}^2 Y_{\ell,m}(\theta, \varphi) = \ell(\ell + 1)\hbar^2 Y_{\ell,m}(\theta, \varphi)$  où  $\ell \in \mathbb{N}$ ;
- $\hat{L}_z Y_{\ell,m}(\theta, \varphi) = m\hbar Y_{\ell,m}(\theta, \varphi)$  où  $m \in \llbracket -\ell, \ell \rrbracket$  peut prendre  $2\ell + 1$  valeurs différentes;
- $Y_{\ell,m}(\theta, \varphi) = F_{\ell,m}(\theta)e^{im\varphi}$  où  $F_{\ell,m}(\theta)$  est une fonction réelle qui s'annule  $\ell - |m|$  fois dans l'intervalle  $]0, \pi[$ .
- *Conjugaison*

$$Y_{\ell,m}^*(\theta, \varphi) = (-1)^m Y_{\ell,-m}(\theta, \varphi)$$

- *Parité*

$$Y_{\ell,m}(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^\ell Y_{\ell,m}(\theta, \varphi)$$

- L'ensemble des harmoniques sphériques constitue une

base orthonormée de l'espace des fonctions de carré sommable qui associent à un couple  $(\theta, \varphi)$  la grandeur complexe  $Y(\theta, \varphi)$ . Pour toute fonction, on pourra écrire

$$Y(\theta, \varphi) = \sum_{\ell, m} c_{\ell, m} Y_{\ell, m}(\theta, \varphi)$$

où les coefficients  $c_{\ell, m}$  sont déterminés par les produits scalaires hermitiens

$$c_{\ell, m} = \int \int Y_{\ell, m}^*(\theta, \varphi) Y(\theta, \varphi) \sin(\theta) d\theta d\varphi$$

E — n coordonnées sphériques, les fonctions propres recherchées  $\psi(r, \theta, \varphi)$  obéissent donc aux deux équations aux valeurs propres :

$$\begin{aligned} - \left( \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) \psi(r, \theta, \varphi) &= \ell(\ell + 1) \psi(r, \theta, \varphi) \\ -i \frac{\partial}{\partial \varphi} \psi(r, \theta, \varphi) &= m \psi(r, \theta, \varphi) \end{aligned}$$

La variable  $r$  n'intervenant pas dans ces expressions, la résolution simultanée des deux équations nous donnera une fonction ne dépendant que de  $\theta$  et de  $\varphi$ , que l'on notera  $Y(\theta, \varphi)$ , appelée **partie angulaire** de la fonction d'onde. La **partie radiale** sera notée  $R(r)$ . Ces deux fonctions sont normalisées selon les relations

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} |R(r)|^2 r^2 dr &= 1 \\ \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |Y(\theta, \varphi)|^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi &= 1 \end{aligned}$$

ce qui assure que la fonction d'onde totale est bien normalisée. La seconde équation aux valeurs propres se réécrit alors

$$\frac{\partial Y}{\partial \varphi} = imY$$

de solution normalisée

$$Y(\theta, \varphi) = F(\theta)e^{im\varphi}$$

La continuité de  $Y$  en  $\varphi = 0$  implique que  $\exp(im2\pi) = 1$ , i.e. que  $m$  soit un entier. Il en va ainsi de même pour  $\ell$ .

Pour déterminer la forme de la fonction  $F(\theta)$ , il faudrait résoudre la première équation du système considéré, avec  $\ell \in \mathbb{N}$ , mais celle-ci est du second ordre. On préférera donc utiliser la méthode de construction de la base standard à l'aide de l'opérateur différentiel du premier ordre  $\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y$ , en commençant par le cas  $m = -\ell$ . Étant donné qu'il s'agit de la plus petite valeur de  $m$  acceptable, on sait que  $\hat{L}_- Y(\theta, \varphi) = 0$ . En utilisant la forme de  $L_-$ , on obtient donc

$$\left( -\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cotan(\theta) \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) F(\theta) e^{-i\ell\varphi} = 0$$

$$\frac{dF}{d\theta} \stackrel{!}{=} \ell \cotan(\theta) F(\theta)$$

$$\frac{dF}{F} \stackrel{!}{=} \ell \cotan(\theta) d\theta$$

En intégrant, on obtient  $F_{\ell, -\ell}(\theta) = c_\ell \sin^\ell(\theta)$ . La condition de normalisation de  $Y_{\ell, -\ell}$  implique que

$$F_{\ell, -\ell}(\theta) = \frac{1}{2^\ell \ell!} \sqrt{\frac{(2\ell + 1)!}{4\pi}} \sin^\ell(\theta)$$

On pourra ensuite former les autres fonctions propres uniques appelées **harmoniques sphériques**  $Y_{\ell, m}$  pour  $m \in \llbracket -\ell - 1, \ell \rrbracket$ , en appliquant l'opérateur  $\hat{L}_+$  selon la formule

$$\hat{L}_+ Y_{\ell, m}(\theta, \varphi) = \sqrt{\ell(\ell + 1) - m(m + 1)} \hbar Y_{\ell, m+1}(\theta, \varphi)$$

On obtient avec la formule de  $\hat{L}_+$  que

$$F_{\ell, m+1}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{\ell(\ell + 1) - m(m + 1)}} \left( \frac{d}{d\theta} - \frac{m}{\tan(\theta)} \right) F_{\ell, m}(\theta)$$

On déduit de ces formules que les  $F_{\ell,m}(\theta)$  sont des fonctions réelles, et leur proximité avec les polynômes de Legendre permet d'établir des propriétés très utiles de celles-ci, comme le fait que  $F_{\ell,m}(\theta)$  s'annule exactement  $\ell - |m|$  fois dans l'intervalle ouvert  $]0, \pi[$ . On a aussi  $F_{\ell,-m} = (-1)^m F_{\ell,m}(\theta)$ , ce qui n'est pas étonnant étant donné que la transformation  $m \mapsto -m$  revient à changer le sens de l'axe  $z$ . On retiendra aussi que  $|F_{\ell,m}(\pi - \theta)| = |F_{\ell,m}(\theta)|$ . ■

À l'instar des fonctions de Hermite dans  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$  ou des séries de Fourier dans un espace de fonctions périodiques, les harmoniques sphériques permettront ainsi de décomposer toute fonction  $Y(\theta, \varphi)$  de deux variables angulaires à l'aide de la somme discrète des états  $Y_{\ell,m}$ .

### 6.2.3

#### PREMIÈRES HARMONIQUES SPHÉRIQUES

- **Cas  $\ell = 0$  :**  $Y_{0,0}(\theta, \varphi) = F_{0,0}(\theta) = c_0$ . La normalisation implique que

$$Y_{0,0}(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

- **Cas  $\ell = 1$  :** Avec la formule trouvée précédemment,

$$Y_{1,-1}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{-\varphi} \sin(\theta)$$

En appliquant  $\hat{L}_+$  à  $Y_{1,-1}(\theta, \varphi)$ , on trouve

$$Y_{1,0}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos(\theta)$$

La relation de conjugaison nous donne

## 6.3

### ROTATION D'UNE MOLÉCULE DIATOMIQUE

Étudions le problème à deux corps invariant par rotation d'une molécule diatomique en rotation.

#### 6.3.1

#### MODÈLE DU ROTATEUR RIGIDE & TRAITEMENT CLASSIQUE

Ce modèle simplifie l'étude du problème, à partir de quelques postulats :

- Le mouvement du centre de masse n'est pas considéré ;
- Le mouvement des électrons n'est pas pris en compte (on considère qu'il est déjà pris en compte dans la liaison chimique entre les deux atomes) ;
- Le mouvement de vibration (variation de la longueur de la liaison entre les deux atomes), associé à des énergies bien supérieures.

On appelle  $\vec{r}_1$  et  $\vec{r}_2$  les positions des deux atomes de masses  $m_1$  et  $m_2$ , et on pose  $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$  le vecteur séparant les deux atomes, de longueur  $r$  constante dans le cadre du modèle du **rotateur rigide**. Le centre de masse étant placé à l'origine, on a que  $m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = \vec{0}$ , i.e., avec la masse réduite  $\mu$  du système,

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= -\frac{\mu}{m_1} \vec{r} \\ \vec{r}_2 &= \frac{\mu}{m_2} \vec{r}\end{aligned}$$

En dérivant par rapport au temps, on a de même

$$\begin{aligned}\vec{v}_1 &= -\frac{\mu}{m_1} \vec{v} \\ \vec{v}_2 &= \frac{\mu}{m_2} \vec{v}\end{aligned}$$

L'invariance par rotation nous dit que le moment cinétique est une constante du mouvement. Or son expression est

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{r}_1 \times m_1 \vec{v}_1 + \vec{r}_2 \times m_2 \vec{v}_2 \\ &= \frac{\mu^2}{m_1} \vec{r} \times \vec{v} + \frac{\mu^2}{m_2} \vec{r} \times \vec{v} \\ &= \vec{r} \times \mu \vec{v} \\ &\perp \vec{r}\end{aligned}$$

Ce moment cinétique est égal à celui d'une particule de masse  $\mu$ . La distance  $r$  étant constante,  $\vec{r} \perp \vec{v}$  et donc  $L = \|\vec{L}\| = \mu r v$ .

Évaluons désormais l'énergie  $H$  du système. Il n'y a pas de potentiel ici associé à la molécule, donc

$$H = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \mu v^2 \\
 &= \frac{L^2}{2I} \quad \text{avec} \quad I = \mu r^2
 \end{aligned}$$

Cette énergie correspond à nouveau à celle d'une particule de masse  $\mu$ , avec un moment d'inertie par rapport à l'axe de la liaison passant par le centre de masse  $I = \mu r^2$ .

### 6.3.2

#### TRAITEMENT QUANTIQUE

On définit désormais l'état de notre rotateur rigide par une fonction d'onde  $Y(\theta, \varphi)$  normalisée, afin que  $|Y(\theta, \varphi)| \sin(\theta) d\theta d\varphi$  représente la probabilité que la molécule soit orientée selon les angles sphériques  $\theta$  et  $\varphi$ , à l'intérieur d'un angle solide infinitésimal  $\sin(\theta) d\theta d\varphi$ . L'espace de Hilbert  $\mathcal{E}_H$  associé au problème est engendré par les harmoniques sphériques comme discuté précédemment, donc le système peut être défini par les coefficients  $c_{\ell, m}$ .

On sait par invariance par rotation que  $\hat{H}$ ,  $\hat{L}^2$  et  $\hat{L}_z$  commutent deux à deux, et donc sont diagonalisables dans une base commune. Or nous avons montré que la base propre commune à  $\hat{L}^2$  et  $\hat{L}_z$  est unique dans  $\mathcal{E}_H$ . Ainsi, on pourra nécessairement diagonaliser  $\hat{H}$  dans cette base, i.e.  $Y_{\ell, m}(\theta, \varphi)$  sont des fonctions propres de  $\hat{H}$ . Ce résultat est en fait clair dans le cadre de la molécule diatomique car

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$$

On a de plus les valeurs propres qui sont de la forme

$$E_\ell = \ell(\ell + 1) \frac{\hbar^2}{2I}$$

et qui sont dégénérées  $2\ell + 1$  fois car l'énergie est indépendante de la valeur de  $m$ .

7

## MOMENT CINÉTIQUE INTRINSÈQUE

On a jusqu'ici pensé que l'état d'une particule ponctuelle comme l'électron peut être entièrement décrit à l'aide de l'espace de Hilbert  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$ , ce qui revient à supposer que les degrés de liberté de la particule sont entièrement décrits par sa position dans l'espace. Or l'expérience de Stern et Gerlach a montré que cela n'était pas suffisant, et qu'il fallait introduire un nouveau degré de liberté, appelé **spin** ou **moment cinétique intrinsèque**.

Les résultats de l'expérience sur l'atome d'hydrogène amènent à postuler que la composante du spin selon l'axe  $z$ , notée  $\hat{S}_z$ , peut prendre les valeurs  $\pm \frac{\hbar}{2}$ . On peut donc se placer dans un espace des états de dimension 2.

7.1

### CONSTRUCTION DES OBSERVABLES CARTÉSIENS DU SPIN

7.31

#### *Observables cartésiens du spin —*

La forme matricielle des observables cartésiens du spin est

$$\hat{S}_\alpha = \frac{\hbar}{2} \sigma_\alpha$$

où  $\sigma_\alpha$  sont les **matrices de Pauli** définies par

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ \sigma_y &= \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \\ \sigma_z &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

O — n se place dans un espace des états de dimension 2, et appelons  $|+\rangle_z$  et  $|-\rangle_z$  les vecteurs propres de l'observable  $\hat{S}_z$

pour les valeurs propres  $\pm \frac{\hbar}{2}$  (mises en évidence par l'expérience de Stern & Gerlach). La matrice de l'observable s'écrit donc dans cette base selon l'expression

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Considérons l'observable  $\hat{S}_x$ , correspondant à la valeur du spin selon l'axe  $x$ . Ses valeurs sont aussi  $\pm \frac{\hbar}{2}$  puisque le choix de l'axe est arbitraire. Ces axes étant orthogonaux, on sait qu'un système dans l'état  $|\pm\rangle_z$  donnera aléatoirement une valeur  $\pm \frac{\hbar}{2}$  du spin selon  $x$ . Ainsi,

$$\begin{aligned} {}_z\langle + | \hat{S}_x | + \rangle_z &= 0 \\ {}_z\langle - | \hat{S}_x | - \rangle_z &= 0 \end{aligned}$$

On en déduit que la matrice hermitienne représentant  $\hat{S}_x$  dans la base  $\{| \pm \rangle_z\}$  est de la forme

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & e^{-i\phi_x} \\ e^{i\phi_x} & 0 \end{bmatrix}$$

Pour que les coefficients de la matrice soient réels, il suffit de se placer dans la nouvelle base  $\{| + \rangle_z, | - \rangle'_z\}$  où  $| - \rangle'_z = e^{i\phi_x} | - \rangle_z$ , que l'on notera  $\{| \pm \rangle_z\}$  (écrasant donc les premières valeurs arbitraires choisies pour cette base). Ainsi, dans cette base,

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Les vecteurs propres de l'opérateur  $\hat{S}_x$  se déduisent aisément de sa forme :

$$\begin{aligned} | + \rangle_x &= \frac{| + \rangle_z + | - \rangle_z}{\sqrt{2}} \\ | - \rangle_x &= \frac{| + \rangle_z - | - \rangle_z}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Un raisonnement similaire appliqué à l'observable  $\hat{S}_y$  nous permet de l'écrire sous la forme

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & e^{-i\phi_y} \\ e^{i\phi_y} & 0 \end{bmatrix}$$

La base  $\{|\pm\rangle_z\}$  étant déjà conventionnée pour que les coefficients de la matrice associés à  $\hat{S}_x$  soient réels, on ne peut pas en faire de même pour  $\hat{S}_y$ . Toutefois, on peut déterminer la valeur de  $\phi_y$  fixée par la convention. On sait que  ${}_x\langle + | \hat{S}_y | + \rangle_x = 0$ , ce qui donne après calcul que  $\frac{\hbar}{2} \cos(\phi_y) = 0$ . On admettra alors que  $\phi_y = \frac{\pi}{2}$  est la valeur confirmée expérimentalement. On a alors la matrice associée à l'opérateur  $\hat{S}_y$

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

et les vecteurs propres de  $\hat{S}_y$

$$|+\rangle_y = \frac{|+\rangle_z + i|-\rangle_z}{\sqrt{2}}$$

$$|-\rangle_y = \frac{|+\rangle_z - i|-\rangle_z}{\sqrt{2}}$$

■

Avec les formules matricielles de ces opérateurs, on détermine facilement la valeur de leurs commutateurs :

### 7.32

#### *Relations de commutation des observateurs du spin —*

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z$$

$$[\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar\hat{S}_x$$

$$[\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar\hat{S}_y$$

soit

$$\hat{S} \times \hat{S} = i\hbar \hat{S}$$

Ces observables ne commutent pas entre elles, il est impossible de construire une base propre commune à celles-ci, *i.e.* les grandeurs physiques correspondantes ne peuvent être mesurées simultanément.

## 7.2

### MESURE DU SPIN SELON UN AXE ARBITRAIRE

Après avoir établi la forme cartésienne des observables de spin, intéressons-nous à la projection de spin selon un vecteur unitaire  $\vec{u}$  arbitraire

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad \text{avec} \quad \|\vec{u}\| = 1$$

avec  $\theta \in [0, \pi[$  et  $\varphi \in [0, 2\pi[$ . La projection du spin  $\hat{S} = \hat{S}_x \vec{u}_x + \hat{S}_y \vec{u}_y + \hat{S}_z \vec{u}_z$  selon le vecteur  $\vec{u}$  est donc, dans la base  $\{|\pm\rangle_z\}$ ,

$$\hat{S} \cdot \vec{u} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & e^{-i\varphi} \sin(\theta) \\ e^{i\varphi} \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{bmatrix}$$

Cherchons les vecteurs propres  $|\pm\rangle_u$  associés aux valeurs propres  $\pm \frac{\hbar}{2}$  pour cette matrice. Pour simplifier l'expression de cette matrice, de la même façon que lorsque l'on a cherché la forme de  $\hat{S}_x$ , on peut procéder à un changement de variable. En considérant la nouvelle base formée des vecteurs  $|\pm\rangle'_z = \exp(\mp i \frac{\varphi}{2}) |\pm\rangle_z$ , on arrive à la formule

$$\hat{S} \cdot \vec{u} = \frac{\hbar}{2} \hat{M} \quad \text{avec} \quad \hat{M} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{bmatrix}$$

On se ramène ainsi à l'étude d'une matrice orthogonale associée à une symétrie par rapport à une droite dans le plan euclidien (d'axe  $\frac{\theta}{2}$ ). Le vecteur propre associé à la valeur propre  $+\frac{\hbar}{2}$  est donc celui aligné avec l'axe, soit

$$|+\rangle_u = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |+\rangle'_z + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |-\rangle'_z$$

De même, le vecteur propre associé à la valeur propre  $-\frac{\hbar}{2}$  est le vecteur orthogonal à l'axe

$$|+\rangle_u = -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|+\rangle'_z + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|-\rangle'_z$$

En se ramenant dans la base initiale, on obtient

$$\begin{aligned} |+\rangle_u &= e^{-i\frac{\varphi}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|+\rangle_z + e^{i\frac{\varphi}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|-\rangle_z \\ |-\rangle_u &= -e^{-i\frac{\varphi}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|+\rangle_z + e^{i\frac{\varphi}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|-\rangle_z \end{aligned}$$

## 7.3

### OPÉRATEUR ROTATION DU SPIN

#### 7.3.1

##### DÉFINITION

On peut définir un opérateur dans l'espace de Hilbert à deux dimensions  $\mathcal{E}_{\text{spin}}$ , qui correspond à une rotation d'angle  $\alpha$  autour de l'axe  $z$  dans la sphère de Bloch. Il faut faire attention à ne pas confondre cette rotation avec une rotation dans l'espace réel  $\mathbf{R}^3$ , même si certaines de ses propriétés y seront très analogues. Pour un état  $|\psi\rangle$  défini par sa longitude  $\varphi$  et sa colatitude  $\theta$ , on s'attend à ce que la transformation par  $\hat{R}_\alpha$  corresponde à  $\varphi \mapsto \varphi + \alpha$ , soit

$$\hat{R}_\alpha |\psi\rangle = e^{-i\frac{\varphi}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{-i\frac{\alpha}{2}} |+\rangle + e^{i\frac{\varphi}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\alpha}{2}} |-\rangle$$

La forme matricielle de cette rotation est

$$\hat{R}_\alpha = \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\alpha}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\alpha}{2}} \end{bmatrix} = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \alpha \hat{S}_z\right)$$

On peut de façon plus générale définir la rotation d'un vecteur  $\vec{\alpha}$ , caractérisant son axe par sa direction et son angle par sa norme :

$$\hat{R}_{\vec{\alpha}} = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \vec{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{S}}\right)$$

## 7.3.2

## LIEN AVEC LE SPIN

Si le spin porte le nom de moment cinétique intrinsèque, c'est qu'il peut *a priori* être affilié à un moment cinétique. Nous avons vu dans le chapitre portant sur la théorie générale des moments cinétiques que ceux-ci étaient les générateurs infinitésimaux des groupes de rotation. La définition de l'opérateur rotation dans la sphère de Bloch nous permet ainsi d'écrire que

$$\hat{R}_{d\vec{\alpha}} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \hat{\vec{S}} \cdot d\vec{\alpha}$$

Cela nous confirme bien que le spin  $\hat{\vec{S}}$  est un moment cinétique. En reprenant la théorie générale du moment cinétique, on peut calculer  $\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2$ , ce qui nous donne

$$\hat{S}^2 = \frac{1}{2} \frac{3}{2} \hbar^2 \hat{I}$$

Ces résultats nous apprennent donc que la seule valeur valable pour  $j$  est  $\frac{1}{2}$ , qui est bien un demi-entier. Les valeurs de  $m$  possibles sont donc  $\pm \frac{1}{2}$ . Les écritures  $|\pm\rangle$  cachent donc que

$$\begin{aligned} |+\rangle &= \left| j = \frac{1}{2}, m = \frac{1}{2} \right\rangle \\ |-\rangle &= \left| j = \frac{1}{2}, m = -\frac{1}{2} \right\rangle \end{aligned}$$

## 8

## L'ATOME D'HYDROGÈNE

## 8.1

## MODÈLE DE BOHR

Ce modèle, bien que faux, utilise la théorie classique pour donner les valeurs exactes des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, et possède une importance historique notable.

**Modèle :** L'électron a une trajectoire circulaire autour d'un proton fixe qui sert d'origine, on considère des interactions coulombiennes.

Dans ce cadre, d'après le PFD,

$$m_e \frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{r^2} \quad \text{avec} \quad e^2 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}$$

En postulant que la quantification du moment cinétique  $L_z = n\hbar$ , on doit avoir

$$\begin{aligned} L_z &= r m_e v = n\hbar \\ \Rightarrow v_n &= \frac{e^2}{n\hbar} = \alpha \frac{c}{n} \\ \Rightarrow r_n &= \frac{n^2}{a_1} \\ \Rightarrow E_n &= \frac{1}{2} m_e v_n^2 - \frac{e^2}{r_n} = -\frac{E_I}{n^2} \end{aligned}$$

Les constantes apparaissant ici sont :

- $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137}$ , la **constante de structure fine**.
- $a_1 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} \approx 53\text{pm}$ , le **rayon de Bohr**.
- $E_I = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \approx 13.6\text{ev}$ , l'**énergie d'ionisation** de l'atome d'hydrogène.

Ce résultat établi par Bohr explicite bien la quantification des niveaux d'énergie, dont les fréquences de transition sont

$$h\nu = E_{n_2} - E_{n_1} = E_I \left( \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

Ces résultats conformes aux attentes expérimentales sont toutefois loin d'être convenables, étant donné qu'un problème à une échelle si petite doit absolument être traité de façon quantique.

## 8.2

## MOUVEMENT DANS UN POTENTIEL CENTRAL

### 8.2.1

#### CAS GÉNÉRAL

Considérons désormais le problème dans le cadre de la mécanique quantique : deux particules de masses  $m_1$  et  $m_2$  interagissent entre elles selon un potentiel dépendant uniquement de la distance  $r = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|$  entre les deux particules. Le système est alors invariant par translation et par rotation. On choisira aussi l'origine des énergies afin que  $V(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$ . L'hamiltonien du système est alors

$$\hat{H}_{\text{tot}} = \frac{\hat{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m_2} + V(r)$$

### 8.33

#### *Simplification* —

On peut se ramener à l'étude de deux systèmes indépendants, correspondant d'une part au mouvement libre du centre de masse, de masse  $M = m_1 + m_2$ , et d'autre part au mouvement d'une particule fictive plongée dans le potentiel  $V(r)$  de masse réduite  $\mu$ .

**Démonstration** — On effectue un changement de variable en posant

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M}$$

qui correspond à la position du centre de masse. Ce changement de variable nous permet de réinterpréter  $\vec{r}_1$  et  $\vec{r}_2$  comme

$$\vec{r}_1 = \vec{R} - \frac{\mu}{M} \vec{r}$$

$$\vec{r}_2 = \vec{R} + \frac{\mu}{M} \vec{r}$$

où  $\mu$  est la masse réduite définie par

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$$

On peut alors introduire une nouvelle fonction d'onde de la forme

$$\Phi(\vec{R}, \vec{r}) = \eta \Psi \left( \vec{R} - \frac{\mu}{M} \vec{r}, \vec{R} + \frac{\mu}{M} \vec{r} \right)$$

où  $\eta$  est une constante de normalisation de la nouvelle fonction d'onde. On se place ainsi dans un nouvel espace de Hilbert  $\mathcal{E}_H = \mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3) \otimes \mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$  où le premier espace correspond à la position  $\vec{R}$  du centre de masse et le second à la position  $\vec{r}$  de la particule fictive de masse  $\mu$ . Identifions désormais les observables impulsion  $\hat{\vec{P}}$  et  $\hat{\vec{p}}$  associées à ces deux nouvelles variables, en utilisant la définition de l'impulsion comme générateur infinitésimal du groupe des translations :

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{R} - d\vec{a}, \vec{r}) &= \Phi(\vec{R}, \vec{r}) - \eta \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}_1} \cdot d\vec{a} - \eta \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}_2} \cdot d\vec{a} \\ &= \left( 1 - \frac{i}{\hbar} (\hat{\vec{p}}_1 + \hat{\vec{p}}_2) \cdot d\vec{a} \right) \Phi(\vec{R}, \vec{r}) \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\hat{\vec{P}} = \hat{\vec{p}}_1 + \hat{\vec{p}}_2$$

De la même façon,

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{R}, \vec{r} - d\vec{a}) &= \Phi(\vec{R}, \vec{r}) + \eta \frac{\mu}{m_1} \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}_1} \cdot d\vec{a} - \eta \frac{\mu}{m_2} \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}_2} \cdot d\vec{a} \\ &= \left( 1 - \frac{i}{\hbar} \mu \left[ \frac{\hat{\vec{p}}_2}{m_2} - \frac{\hat{\vec{p}}_1}{m_1} \right] \cdot d\vec{a} \right) \Phi(\vec{R}, \vec{r}) \end{aligned}$$

L'impulsion associée à la variable spatiale  $\vec{r}$  est donc

$$\begin{aligned}\hat{\vec{p}} &= \mu \left[ \frac{\hat{\vec{p}}_2}{m_2} - \frac{\hat{\vec{p}}_1}{m_1} \right] \\ &= \frac{m_1 \hat{\vec{p}}_2 - m_2 \hat{\vec{p}}_1}{M}\end{aligned}$$

On peut ainsi réexprimer les impulsions des deux particules en fonction des nouvelles observables :

$$\begin{aligned}\hat{\vec{p}}_1 &= \frac{m_1}{M} \hat{\vec{P}} - \hat{\vec{p}} \\ \hat{\vec{p}}_2 &= \frac{m_2}{M} \hat{\vec{P}} + \hat{\vec{p}}\end{aligned}$$

En particulier, cela permet de réexprimer l'énergie cinétique totale du système puisque

$$\frac{\hat{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m_2} = \frac{\hat{P}^2}{2M} + \frac{\hat{p}^2}{2\mu}$$

L'hamiltonien du système devient alors

$$\hat{H}_{\text{tot}} = \hat{H}_{\text{cm}} + \hat{H}$$

où  $\hat{H}_{\text{cm}} = \frac{\hat{P}^2}{2M}$  est l'hamiltonien correspondant au centre de masse et  $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(\hat{r})$  est l'hamiltonien correspondant à la particule fictive placée dans le potentiel central  $V(r)$ . Ces hamiltoniens commutent car ils agissent dans deux espaces différents, donc la diagonalisation de  $\hat{H}_{\text{tot}}$  peut se faire dans une base propre commune des opérateurs  $\hat{H}_{\text{cm}}$  et  $\hat{H}$ .

En utilisant les états propres  $|\vec{P}\rangle$  de l'opérateur impulsion totale, on peut écrire les fonctions propres de l'hamiltonien total sous la forme

$$\Phi(\vec{R}, \vec{r}) = \frac{e^{i\frac{\vec{P}\cdot\vec{R}}{\hbar}}}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \psi(\vec{r})$$

où  $\psi(\vec{r})$  est une fonction propre de  $\hat{H}$  associée à la valeur propre  $E$ . L'énergie totale sera alors égale à  $\frac{p^2}{2M} + E$ . ■

On peut donc, pour l'étude du système, écrire l'hamiltonien du système sous la forme

$$\hat{H}_{\text{tot}} = \frac{\hat{P}^2}{2M} + \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(\hat{r})$$

où  $\hat{P} = \hat{p}_1 + \hat{p}_2$  est l'impulsion totale du système et  $\hat{p} = \frac{m_1\hat{p}_2 - m_2\hat{p}_1}{M}$  est l'impulsion de la particule fictive. Le mouvement du centre de masse étant plus aisé à étudier, on s'intéresse surtout au mouvement de la particule fictive dans  $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}^3)$  associé à l'hamiltonien

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(\hat{r})$$

Le problème à deux corps se ramène donc de façon général à celui d'un seul corps dans un potentiel central. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, il suffit donc de remplacer la masse de l'électron  $m_e$  par la masse réduite  $\mu$ . Compte tenu des ordres de grandeurs ( $\frac{m_p}{m_e} \approx 2000$ ), on peut considérer en première approximation directement la masse de l'électron, et supposer que le proton est fixe à l'origine.

Cherchons donc les fonctions propres  $\psi(r, \theta, \varphi)$  de l'hamiltonien  $\hat{H}$  de la particule fictive. D'après l'équation de Schrödinger indépendante du temps  $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ ,

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta + V(r)\right)\psi(r, \theta, \varphi) = E\psi(r, \theta, \varphi)$$

où le laplacien s'écrit en coordonnées sphériques selon la relation

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{1}{r^2} \left( \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}\end{aligned}$$

où  $\hat{L}^2$  est l'opérateur carré associé au moment cinétique orbital de la particule. On peut finalement réécrire l'équation de Schrödinger comme

$$\left( \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2\mu r}}_{E_{c,trans}} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + V(r) - \underbrace{\frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2}}_{E_{c,rot}} \right) \psi(r, \theta, \varphi) = E \psi(r, \theta, \varphi)$$

On peut vérifier explicitement que l'hamiltonien commute avec le moment cinétique, comme prévu par l'invariance par rotation. Cherchons maintenant une base propre commune aux trois observables  $\hat{H}$ ,  $\hat{L}^2$  et  $\hat{L}_z$ . Nous avons déjà vu que cette base propre correspond à une partie radiale et une harmoniques sphérique, de la forme

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_{\ell, m}(\theta, \varphi)$$

où la partie radiale reste à déterminer. On sait déjà que

$$\hat{L}^2 \psi(r, \theta, \varphi) = \ell(\ell + 1) \hbar^2 \psi(r, \theta, \varphi)$$

Sachant qu'il n'y a plus d'opérateur portant sur la partie angulaire dans l'équation de Schrödinger, on peut simplifier l'équation par  $Y_{\ell, m}(\theta, \varphi)$ , et en multipliant par  $r$ , on obtient

$$\left( -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\ell(\ell + 1) \hbar^2}{2\mu r^2} + V(r) \right) u(r) = E u(r)$$

où  $u(r) = rR(r)$ . Finalement, on a réussi à se ramener à une équation de Schrödinger indépendante du temps à une dimension

$$\left( -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} + V_{\text{eff}, \ell}(r) \right) u(r) = E u(r)$$

correspondant au mouvement d'une particule de masse  $\mu$  dans le potentiel

$$V_{\text{eff}, \ell}(r) = \underbrace{V(r)}_{\text{potentiel central}} + \underbrace{\frac{\ell(\ell + 1) \hbar^2}{2\mu r^2}}_{E_{c,rot}}$$

La fonction  $u(r)$  sur laquelle porte l'équation est telle que  $|u(r)|^2 dr$  est la probabilité que la particule se trouve entre deux sphères concentriques de rayons  $r$  et  $r + dr$ .

## 8.2.2

## CAS DU POTENTIEL COULOMBIEN

Appliquons la démarche exposée dans un cadre général à l'atome d'hydrogène, cas correspondant au potentiel coulombien  $V(r) = \frac{-e^2}{r}$ . On doit donc résoudre l'équation aux valeurs propres  $\hat{H}_\ell |u\rangle = E |u\rangle$ , où

$$\hat{H}_\ell = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} - \frac{e^2}{r} + \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2\mu r^2}$$

où  $\mu \approx m_e$ .

## 8.34

**États liés de l'atome d'hydrogène —**

- Les niveaux d'énergie sont repérés par un entier positif  $n$  et ont pour valeur

$$E_n = -\frac{E_I}{n^2}$$

où  $E_I = \frac{e^2}{2a_1} = \frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \approx 13,6 \text{ eV}$  est l'énergie d'ionisation de l'hydrogène et où  $a_1 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} \approx 0,053 \text{ nm}$  est le rayon de Bohr.

- Le niveau  $E_n$  est dégénéré  $n^2$  fois.
- Les états propres  $|n, \ell, m\rangle$  sont associés aux fonctions d'onde

$$\psi_{n,\ell,m}(r, \theta, \varphi) = R_{n,\ell}(r) Y_{\ell,m}(\theta, \varphi)$$

où  $Y_{\ell,m}(\theta, \varphi)$  est une harmonique sphérique et où  $R_{n,\ell}(r) = \frac{u_{n,\ell}(r)}{r}$  correspond au produit d'un polynôme de degré  $n'$  par  $r^\ell \exp\left(-\frac{r}{na_1}\right)$  l'entier  $n' = n - \ell - 1$  est appelé le nombre quantique radial.

- Les zéros du polynôme de degré  $n'$  étant tous strictement positifs, la fonction  $R_{n,\ell}(r)$  s'annule exactement  $n'$  fois dans l'intervalle  $]0, \infty[$ , conformément au théorème de Sturm-Liouville.
- La fonction d'onde de l'état fondamental s'écrit

$$\psi_{1,0,0}(\vec{r}) = \frac{e^{-\frac{r}{a_1}}}{\sqrt{\pi a_1^3}}$$

**Résolution** — On utilisera comme unité de longueur le rayon de Bohr  $a_1$  et comme unité d'énergie  $E_I$ . On introduit donc les variables sans dimension  $\rho = \frac{r}{a_1}$  et  $\varepsilon = \frac{E}{E_I}$ , ce qui nous donne l'équation de Schrödinger

$$\hat{h}_\ell u(\rho) = \left( -\frac{d^2}{d\rho^2} + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} - \frac{2}{\rho} \right) u(\rho) = \varepsilon u(\rho)$$

On introduit l'opérateur différentiel  $\hat{a}_\ell$  et son adjoint  $\hat{a}_\ell^\dagger$

$$\begin{aligned}\hat{a}_\ell &= \frac{1}{\ell+1} - \frac{\ell+1}{\rho} - \frac{d}{d\rho} \\ \hat{a}_\ell^\dagger &= \frac{1}{\ell+1} - \frac{\ell+1}{\rho} + \frac{d}{d\rho}\end{aligned}$$

L'effet de l'opération  $\dagger$  sur  $\hat{a}_\ell$  peut se comprendre par le fait que  $\hat{p}$  est une observable donc auto-adjoint, ce qui nous donne que  $-i\frac{d}{d\rho}$  est auto-adjoint, d'où  $\frac{d}{d\rho}^\dagger = -\frac{d}{d\rho}$ . Après calculs, on remarque que

$$\begin{aligned}\hat{a}_\ell \hat{a}_\ell^\dagger &= \hat{h}_\ell + \frac{1}{(\ell+1)^2} \\ \hat{a}_\ell^\dagger \hat{a}_\ell &= \hat{h}_{\ell+1} + \frac{1}{(\ell+1)^2}\end{aligned}$$

On peut ainsi réécrire l'équation aux états propres par

$$\left( \hat{a}_\ell \hat{a}_\ell^\dagger - \frac{1}{(\ell+1)^2} \right) |u\rangle = \varepsilon |u\rangle$$

On peut faire agir l'opérateur  $\hat{a}_\ell^\dagger$  sur cette équation, ce qui donne

$$\left( \hat{a}_\ell^\dagger \hat{a}_\ell - \frac{1}{(\ell+1)^2} \right) \hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle = \varepsilon \hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle$$

soit  $\hat{h}_{\ell+1} \hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle = \varepsilon \hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle$ . Le vecteur  $\hat{a}_\ell^\dagger |u\rangle$  est donc soit nul soit vecteur propre de  $\hat{h}_{\ell+1}$  pour la même valeur propre  $\varepsilon$ . De

même, en faisant agir l'opérateur  $\hat{a}_{\ell-1}$  sur cette équation, on obtient

$$\left(\hat{a}_{\ell-1}\hat{a}_{\ell-1}^\dagger - \frac{1}{\ell^2}\right)\hat{a}_{\ell-1}|u\rangle = \varepsilon\hat{a}_{\ell-1}|u\rangle$$

soit  $\hat{h}_{\ell-1}\hat{a}_{\ell-1}|u\rangle = \varepsilon\hat{a}_{\ell-1}|u\rangle$ . Le vecteur  $\hat{a}_{\ell-1}|u\rangle$  est donc soit nul soit vecteur propre de  $\hat{h}_{\ell-1}$  pour la même valeur propre  $\varepsilon$ . Par ailleurs, le carré de la norme de  $\hat{a}_\ell^\dagger|u\rangle$  s'écrit

$$\begin{aligned}\|\hat{a}_\ell^\dagger|u\rangle\|^2 &= \langle u|\hat{a}_\ell\hat{a}_\ell^\dagger|u\rangle \\ &= \langle u|\left(\hat{h}_\ell + \frac{1}{(\ell+1)^2}\right)|u\rangle \\ &= \varepsilon + \frac{1}{(\ell+1)^2} \geq 0\end{aligned}$$

On a donc la condition

$$\varepsilon \geq -\frac{1}{(\ell+1)^2}$$

Employons désormais un raisonnement similaire à celui utilisé par Dirac pour l'oscillateur harmonique ou par Cartan pour le moment cinétique : pour une valeur donnée de  $\varepsilon < 0$ , on peut appliquer successivement  $\hat{a}_\ell^\dagger, \hat{a}_{\ell+1}^\dagger$ , etc. jusqu'à ce que l'inégalité du dessus ne soit plus vérifiée. Ceci étant physiquement impossible, il existe  $\ell_{\max}$  tel que  $|u\rangle$  soit vecteur propre de  $\hat{h}_{\ell_{\max}}$  pour la valeur propre  $\varepsilon$  mais que  $\hat{a}_{\ell_{\max}}^\dagger|u\rangle$  soit le vecteur nul. En considérant la norme de ce vecteur et en posant  $n = \ell_{\max} + 1$ , on obtient donc que

$$\varepsilon = \varepsilon_n = -\frac{1}{n^2}$$

Dans le cas où  $\ell = \ell_{\max} = n - 1$ , on peut écrire  $\hat{a}_{n-1}^\dagger|u\rangle = 0$  d'où

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{n} - \frac{n}{\rho} + \frac{d}{d\rho}\right)u(\rho) &= 0 \\ \text{i.e. } \frac{du}{u} &= -\left(\frac{1}{n} + \frac{n}{\rho}\right)d\rho\end{aligned}$$

Cette équation différentielle, une fois intégrée, donne que

$$u_{n,n-1}(\rho) \propto \rho^n \exp\left(-\frac{\rho}{n}\right)$$

Pour trouver les autres fonctions radiales, on utilise la relation

$$|u_{n,\ell-1}\rangle = \frac{\hat{a}_{\ell-1} |u_{n,\ell}\rangle}{\|\hat{a}_{\ell-1} |u_{n,\ell}\rangle\|}$$

le dénominateur étant non nul car  $\ell < n$  et  $\|\hat{a}_{\ell-1} |u_{n,\ell}\rangle\|^2 = \frac{1}{\ell^2} - \frac{1}{n^2}$ .

Le résultat montré sur le degré du polynôme se montre par récurrence, sachant que  $u_{n,n-1}(\rho)$  est constitué d'un polynôme de degré  $n' = n - \ell - 1 = 0$  et que l'action de  $\hat{a}_{\ell-1} = \left(\frac{1}{\ell} - \frac{\ell}{\rho} - \frac{d}{d\rho}\right)$  sur  $u_{n,\ell}(\rho) = P(\rho)\rho^{\ell+1} \exp\left(-\frac{\rho}{n}\right)$  donne un polynôme de degré supérieur  $n' + 1 = n - (\ell - 1) - 1$ . ■

Un des résultats remarquables est l'apparition de l'entier  $n$  strictement positif, appelé **nombre quantique principal**, qui détermine entièrement la valeur de l'énergie  $E_n$ . À énergie constante, on peut trouver différentes valeurs diverses du moment cinétique puisque  $\ell \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ . La dégénérescence du niveau  $E_n$  est donc égale à

$$g_n = \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2$$

La projection du moment cinétique sur l'axe  $z$  prendra enfin la valeur  $m\hbar$  où  $m \in \llbracket -\ell, \ell \rrbracket$ , ce qui montre que le moment cinétique ne pourra jamais atteindre la valeur  $n\hbar$  utilisée pour établir le résultat du modèle de Bohr.

### 8.3

#### INTERACTION SPIN-ORBITE

Lors de l'étude précédente des états liés de l'atome d'hydrogène, nous n'avons pas tenu compte du degré de liberté de spin de l'électron. La conséquence de son introduction est *a priori* de multiplier par deux la dégénérescence de tous les niveaux d'énergie identifiés, les portant à  $2n^2$  pour le niveau d'énergie  $E_n$ . On

aurait ainsi

$$\hat{H}_0 |n, \ell, m\rangle \otimes |\pm\rangle = E_n |n, \ell, m\rangle \otimes |\pm\rangle$$

Toutefois, l'hamiltonien  $\hat{H}_0$  ne décrit pas parfaitement l'état du système complet et il faut y ajouter un terme supplémentaire faisant intervenir explicitement le spin de l'électron en raison d'effets relativistes. On admet que le terme correctif, dit d'**interaction spin-orbite**, à apporter est :

$$\hat{W}_{\text{SO}} = \frac{1}{2m_e^2 c^2} \frac{1}{\hat{r}} \frac{dV}{dr}(\hat{r}) \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}}_e$$

En ordre de grandeurs, on remarque que

$$\frac{W_{\text{SO}}}{E_I} \approx \frac{e^4}{\hbar^2 c^2} = \alpha^2 \approx 10^{-4}$$

où  $\alpha$  est la constante de structure fine, ce qui signifie que l'on peut traiter cette variation par la méthode des perturbations. Il est notable que la présence de ce terme  $\hat{W}_{\text{SO}}$  implique que le moment cinétique orbital  $\hat{\vec{L}}$  ne commute plus avec  $\hat{H}$ . Il faut maintenant considérer le moment cinétique total  $\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{L}} + \hat{\vec{S}}_e$  qui correspond au véritable générateur infinitésimal des rotations du système complet. On peut vérifier que

$$\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}}_e = \frac{1}{2} (\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}_e^2)$$

Cette expression montre explicitement que  $\hat{W}_{\text{SO}}$  commute avec  $\hat{\vec{J}}$ , è. Compte tenu des résultats sur l'addition des moments cinétiques, on sait que les valeurs propres de  $\hat{J}^2$  seront de la forme  $j(j+1)\hbar^2$  avec  $j = \ell \pm \frac{1}{2}$ .

Dans le cas de l'atome d'hydrogène, le niveau fondamental  $1s$  de l'hamiltonien  $\hat{H}_0$  est doublement dégénéré, et une base de celui-ci peut s'écrire  $\{|1, 0, 0\rangle \otimes |\pm\rangle\}$ . Ces deux états correspondant à  $\ell = 0$  sont vecteurs propres de  $\hat{L}_x$ ,  $\hat{L}_y$  et  $\hat{L}_z$  pour la valeur propre 0, donc  $\hat{W}_0 |1, 0, 0\rangle \otimes |\pm\rangle = 0$ . L'interaction spin-orbite est sans effet sur ces états. Il faudrait de plus considérer le couplage avec

le spin du noyau pour observer une levée de dégénérescence, phénomène que l'on appelle **structure hyperfine**.

## 8.4

### STRUCTURE FINE DE L'ATOME D'HYDROGÈNE

Dans le cas de l'atome d'hydrogène, le noyau est un proton, de spin  $1/2$ . Ce degré de liberté supplémentaire, une fois considéré, fait apparaître une interaction entre les dipôles magnétiques du proton et de l'électron :

$$W_{HF} = \frac{\mu_0}{3\pi r^3} \left( \vec{\mu}_e \cdot \vec{\mu}_p - 3(\vec{\mu}_e \cdot \vec{u})(\vec{\mu}_p \cdot \vec{u}) \right) - \frac{2\mu_0}{3} \vec{\mu}_e \cdot \vec{\mu}_p \delta(\vec{r})$$

où  $\mu_0$  est la perméabilité magnétique du vide, tandis que  $\vec{\mu}_e$  et  $\vec{\mu}_p$  sont les moments magnétiques de l'électron et du proton.  $\vec{u}$  est un vecteur unitaire porté par le vecteur  $\vec{r}$  séparant les deux dipôles. Le **terme de contact** proportionnelle à la fonction de Dirac  $\delta(\vec{r})$  est essentiel car la probabilité que l'électron et le proton soient au même point est non nulle. En ordres de grandeur,  $\frac{W_{HF}}{E_I} \approx 10^{-6}$  donc on peut tout à fait traiter ce problème par méthode des perturbations.

Considérons le cas du niveau fondamental de l'atome d'hydrogène, d'énergie  $E_1 = -E_I$ , et correspondant aux états de la forme  $|1, 0, 0\rangle \otimes |e : \pm\rangle \otimes |p : \pm\rangle$ .

## 8.35

#### Opérateur $\hat{H}_1$ dans l'état fondamental —

La restriction de l'opérateur  $\hat{W}_{HF}$  sur l'espace des spins  $\{|e : \pm, p : \pm\rangle\}$  est

$$\hat{H}_1 = A \left( \frac{1}{2} \frac{\hat{S}^2}{\hbar^2} - \frac{3}{4} \hat{I} \right)$$

où  $A \approx 5.87 \mu\text{eV}$ .

**Preuve** — Rappelons l'expression de  $\hat{W}_{HF}$ , que l'on notera ici

$$\hat{W} := \frac{\mu_0}{4\pi} \left( \frac{\hat{\vec{\mu}}_e \cdot \hat{\vec{\mu}}_p}{\hat{r}^3} - 3 \frac{(\hat{\vec{\mu}}_e \cdot \hat{\vec{r}})(\hat{\vec{\mu}}_p \cdot \hat{\vec{r}})}{\hat{r}^5} \right) - \frac{2\mu_0}{3} \hat{\vec{\mu}}_e \cdot \hat{\vec{\mu}}_p \delta(\vec{r})$$

Les opérateurs  $\hat{\mu}_{e,p}$  agissent sur les spins, alors que l'opérateur  $\hat{r}$  agit sur la partie spatiale. On définit l'opérateur  $\hat{H}_1$ , qui agit sur l'espace des spins, par ses éléments matriciels :

$$\langle 1, 0, 0, \sigma_e, \sigma_p | \hat{W} | 1, 0, 0, \sigma'_e, \sigma'_p \rangle = \langle \sigma_e, \sigma_p | \hat{H}_1 | \sigma'_e, \sigma'_p \rangle$$

Autrement dit, pour définir  $\hat{H}_1$ , on prend  $\hat{W}$ , puis on « intègre » sur sa partie spatiale en moyennant sur les états orbitaux  $|1, 0, 0\rangle$  :

$$\hat{H}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \left( \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle \hat{\mu}_e \cdot \hat{\mu}_p - 3 \left\langle \frac{(\hat{\mu}_e \cdot \vec{r})(\hat{\mu}_p \cdot \vec{r})}{r^5} \right\rangle \right) - \frac{2\mu_0}{3} \hat{\mu}_e \cdot \hat{\mu}_p \langle \delta(\vec{r}) \rangle$$

Calculons les moyennes intervenant dans cette formule. Par symétrie, on sait que les produits associés à deux composantes cartésiennes différentes (comme  $\langle xy \rangle$ ) sont nuls. De même, par symétrie,  $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \langle z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle r^2 \rangle$ . Ainsi,

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{(\hat{\mu}_e \cdot \vec{r})(\hat{\mu}_p \cdot \vec{r})}{r^5} \right\rangle &= \hat{\mu}_{ex} \hat{\mu}_{px} \left\langle \frac{x^2}{r^5} \right\rangle + \hat{\mu}_{ey} \hat{\mu}_{py} \left\langle \frac{y^2}{r^5} \right\rangle + \hat{\mu}_{ez} \hat{\mu}_{pz} \left\langle \frac{z^2}{r^5} \right\rangle \\ &= \frac{1}{3} \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle \hat{\mu}_e \cdot \hat{\mu}_p \end{aligned}$$

Cette moyenne s'annule donc avec l'autre membre de la parenthèse, et il ne reste qu'à calculer

$$\langle \delta(\vec{r}) \rangle = \iiint |\psi_{1s}(\vec{r})|^2 \delta(\vec{r}) d^3r = |\psi_{1s}(0)|^2$$

Sachant que l'expression de la partie radiale de la fonction d'onde du niveau fondamental s'écrit  $\psi_{1s}(\vec{r}) = \sqrt{\frac{1}{\pi a_1^3}} \exp\left(-\frac{r}{a_1}\right)$ , on obtient finalement

$$\hat{H}_1 = -\frac{2\mu_0}{3\pi a_1^3} \hat{\mu}_e \cdot \hat{\mu}_p$$

On conclut en utilisant que  $\hat{\mu}_{e,p} = \gamma_{e,p} \hat{S}_{e,p}$ .

Or on a que  $\hat{S}^2 = \hat{S}_e^2 + \hat{S}_p^2 + 2\hat{S}_e \cdot \hat{S}_p$ , ce qui nous permet d'écrire que

$$\hat{S}_e \cdot \hat{S}_p = \frac{1}{2} (\hat{S}^2 - \hat{S}_e^2 - \hat{S}_p^2)$$

Les particules  $e$  et  $p$  étant de spin  $1/2$ ,  $\hat{S}_e^2 = \hat{S}_p^2 = \frac{3}{4}\hbar^2\hat{I}$  et donc

$$\hat{H}_1 = A \left( \frac{1}{2} \frac{\hat{S}^2}{\hbar^2} - \frac{3}{4} \hat{I} \right)$$

■

L'hamiltonien de structure hyperfine s'exprime donc directement en fonction de l'observable  $\hat{S}^2$ . Le cas de l'addition de deux spins  $1/2$  ayant déjà été traité dans ce poly, la base couplée constituant une base propre de l'hamiltonien, on peut écrire directement que

$$\hat{H}_1 |s, m\rangle = A \left( \frac{s(s+1)}{2} - \frac{3}{4} \right) |s, m\rangle$$

On a donc  $\hat{H}_1 |1, m\rangle = \frac{A}{4} |1, m\rangle$  et  $\hat{H}_1 |0, 0\rangle = -\frac{3A}{4} |0, 0\rangle$ . Le niveau fondamental de l'atome d'hydrogène est ainsi clivé en deux sous-niveaux. Un sous-niveau singulet, non dégénéré, qui devient le véritable état fondamental du système, ainsi qu'un sous-niveau triplet, dégénéré trois fois. L'amplitude du clivage est de l'ordre de  $A \approx 5.87 \mu\text{eV}$ , ce qui correspond à une fréquence de  $\nu \approx 1.42 \text{ GHz}$  et une longueur d'onde de  $\lambda \approx 21 \text{ cm}$

9

## PARTICULES INDISCERNABLES

En physique classique, si deux objets sont rigoureusement identiques, on pourra toujours marquer l'un d'entre eux sans modifier ses propriétés physiques ou même suivre son évolution sans perturbation. En physique quantique, il n'est ni possible de marquer une particule, ni possible de faire une mesure permettant d'avoir une information (par exemple sur la position) au long de son évolution, sans modifier son comportement. On dira donc que deux particules identiques sont **indiscernables**.

Prenons pour exemple le système physique constitué de deux particules indiscernables de spin  $1/2$  (où le spin est le seul degré de liberté considéré) dans les états de spin  $|+\rangle_z$  et  $|-\rangle_z$ . Pour décrire l'état  $|\Psi\rangle$  du système physique, on pourrait écrire  $|\Psi\rangle = |+\rangle_z \otimes |-\rangle_z := |+-\rangle$ . Mais l'état  $| - + \rangle$  est tout aussi légitime, ainsi que toute combinaison linéaire de ces deux derniers états comme  $|0, 0\rangle = \frac{|+-\rangle - |-+\rangle}{\sqrt{2}}$  et  $|1, 0\rangle = \frac{|+-\rangle + |-+\rangle}{\sqrt{2}}$ . L'ensemble des vecteurs *a priori* acceptables est alors un espace vectoriel de dimension 2 ; on parle de **dégénérescence d'échange**.

Le problème de cette dégénérescence est qu'elle ne donne pas lieu aux mêmes prédictions physiques : considérons l'observable  $\hat{S}_x$  correspondant au moment cinétique total selon l'axe  $x$ , et mesurons la probabilité de trouver la valeur propre  $\hbar$  associée au vecteur propre

$$\begin{aligned} |+\rangle_x \otimes |+\rangle_x &= \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{|++\rangle + |+-\rangle + |-+\rangle + |--\rangle}{2} \end{aligned}$$

On trouve ainsi

$$\begin{aligned} |(x\langle + | x\langle + |) |+-\rangle| &= |(x\langle + | x\langle + |) |-+\rangle| = \frac{1}{4} \\ |(x\langle + | x\langle + |) |1, 0\rangle| &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$| (x \langle + | x \langle + | ) | 0, 0 \rangle | = 0$$

Il faut donc introduire un nouveau postulat de physique quantique permettant de différencier ces systèmes.

## 9.1 POSTULAT DE SYMÉTRISATION

### 9.1.1 OPÉRATEUR D'ÉCHANGE

Considérons deux particules indiscernables appelées 1 et 2 et plaçons-nous dans l'espace produit  $\mathcal{E}_H = \mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2$ . On introduit l'**opérateur d'échange**  $\hat{P}_{12}$  qui échange l'état des deux particules.

On a évidemment que cet opérateur est involutif :  $\hat{P}_{12} = \hat{I}$ , et qu'il est auto-adjoint. Il est par conséquent unitaire, de valeurs propres  $\pm 1$ , respectivement associées aux **états symétriques** et aux **états antisymétriques**.

### 9.1.2 OPÉRATEURS DE SYMÉTRISATION

On considère les projecteurs sur les deux sous-espaces propres de l'opérateur d'échange, respectivement les opérateurs **symétrisation**  $\hat{\mathcal{S}}$  et **antisymétrisation**  $\hat{\mathcal{A}}$ , définis par les relations

$$\hat{\mathcal{S}} = \frac{\hat{I} + \hat{P}_{12}}{2}$$

$$\hat{\mathcal{A}} = \frac{\hat{I} - \hat{P}_{12}}{2}$$

### 9.1.3 INVARIANCE DE L'HAMILTONIEN

Pour deux particules indiscernables, l'énergie du système doit rester inchangée leur de leur échange par  $\hat{P}_{12}$ . On peut voir l'action d'échange comme un invariant du système, ce qui nous donne la commutation entre l'opérateur d'échange et l'hamiltonien :

$$[\hat{H}, \hat{P}_{12}] = 0$$

### 9.1.4 ÉNONCÉ

9.36

**Postulat de symétrisation —**

Les particules appartiennent toutes à l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :

- Les **bosons** (particules de *spin entier* comme les photons), pour lesquels le vecteur d'état est symétrique par échange de deux particules identiques :

$$\hat{P}_{12} | \Psi \rangle = | \Psi \rangle$$

- Les **fermions** (particules de *spin demi-entier* comme les électrons, protons, quarks), pour lesquels le vecteur d'état est antisymétrique par échange de deux particules identiques :

$$\hat{P}_{12} | \Psi \rangle = - | \Psi \rangle$$

**Idée —** Pour qu'un vecteur d'état  $| \Psi \rangle$  soit physiquement acceptable, il faut que  $| \Psi \rangle$  et  $\hat{P}_{12} | \Psi \rangle$  correspondent à un même état physique, *i.e.* soient égaux à une phase près :

$$\hat{P}_{12} | \Psi \rangle = e^{i\theta} | \Psi \rangle$$

Cela signifie aussi que  $| \Psi \rangle$  est un vecteur propre pour l'opérateur d'échange  $\hat{P}_{12}$ , et donc que  $\theta = 0$  ou  $\theta = \pi$ . La condition est donc en réalité

$$\hat{P}_{12} | \Psi \rangle = \pm | \Psi \rangle$$

Dans l'exemple donné en introduction, les deux seuls états convenables sont donc  $| 0, 0 \rangle$  (antisymétrique) et  $| 1, 0 \rangle$  (symétrique). Mais cette condition seule est insuffisante, puisque le principe de superposition imposerait qu'on puisse mettre le système dans toute combinaison linéaire des états précédemment cités, ce qui nous redonnerait l'espace de dégénérescence de dimension 2 qui, on l'a vu, contient des états non acceptables. Nous admettrons donc que pour un type de particule donnée, un seul type d'état (symétrique ou antisymétrique) est acceptable. ■

9.1.5

**CAS DES PARTICULES COMPOSITES**

Le postulat s'applique aussi aux particules dites **composites** comme les nucléons ou les atomes. En effet, dans des situations

physique où les énergies impliquées sont faibles devant les énergies d'excitation de la particule composite, on peut la considérer comme une particule élémentaire dans son état fondamental. Les données pertinentes pour la décrire sont alors les coordonnées de son centre de masse et son état de spin. On peut dans ces situations (comme les atomes d'une vapeur atomique à température ambiante) se demander si une particule composite peut être considérée comme un boson ou un fermion.

9.37

**Symétrisation d'une particule composite —**

Lorsqu'un ensemble de particules en interaction mutuelle reste dans son état interne fondamental, cet ensemble peut être considéré comme une particule composite. Cette particule composite peut être globalement considérée comme un fermion si elle comporte un nombre impair de fermions, tandis qu'elle peut être considérée comme un boson dans le cas contraire.

**Raisonnement —** Le spin total d'une particule composite est la somme des spins des particules la constituant, donc

$$\hat{S} = \sum_{n=1}^N \hat{S}_n$$

$$\hat{S}_z = \sum_{n=1}^N \hat{S}_{nz}$$

Si l'on mesure  $S_z$ , on obtiendra donc un résultat égal à la somme des  $S_{nz}$ , soit  $m\hbar$  où  $m$  est la somme des  $N_f$  nombres demi-entiers des spins des fermions et  $N_b$  nombre entiers des spins des bosons. Ainsi,  $m$  est demi-entier si  $N_f$  est impaire, entier sinon.

On peut aussi voir le problème à partir de l'opérateur d'échange de deux particules composites indiscernable

$$\hat{P}_{ab} = \hat{P}_{a_1 b_1} \cdots \hat{P}_{a_N b_N}$$

où  $N = N_f + N_b$ . Si  $|\Psi\rangle$  est l'état du système constitué de ces deux particules composites, on a alors

$$\hat{P}_{ab} |\Psi\rangle = (-1)^{N_f} |\Psi\rangle$$

## 9.2

### CAS DE DEUX PARTICULES INDISCERNABLES INDÉPENDANTES

On considère un système constitué de deux particules indiscernables indépendantes, ce qui signifie que son hamiltonien pourra s'écrire comme la somme de deux opérateurs agissant respectivement dans  $\mathcal{E}^{(1)}$  et  $\mathcal{E}^{(2)}$  :

$$\hat{H} = \hat{h}^{(1)} \otimes \hat{I}^{(2)} + \hat{I}^{(1)} \otimes \hat{h}^{(2)}$$

Les particules étant indiscernables,  $\hat{h}^{(1)} = \hat{h}^{(2)}$ . Cet hamiltonien  $\hat{h}$  admet des valeurs propres notées  $|\psi_n\rangle$  associées aux valeurs propres  $E_n$ , donc la base tensorielle  $\{|\psi_n, \psi_m\rangle\}$  est une base propre de  $\hat{H}$  pour les valeurs propres  $E_n + E_m$ .

#### 9.2.1

##### SYSTÈME DE DEUX BOSONS

On considère un système constitué de deux bosons identiques et de spin nul. On suppose que les valeurs propres de l'hamiltonien à une particule sont non dégénérées, l'état fondamental étant associé à l'énergie  $E_1$ . L'énergie du système dans l'état  $|\Psi\rangle = |\psi_1, \psi_1\rangle$  est donc  $2E_1$ .

Cherchons maintenant le premier état excité du système. On serait tentés de proposer les états  $|\psi_1, \psi_2\rangle$  ou  $|\psi_2, \psi_1\rangle$ , mais pour satisfaire au postulat de symétrisation dans le cas des bosons, il faut choisir l'état symétrique (à une phase près)

$$|\Psi\rangle = \frac{|\psi_1, \psi_2\rangle + |\psi_2, \psi_1\rangle}{\sqrt{2}}$$

La valeur propre  $E_1 + E_2$  est donc en réalité non dégénérée et correspond à un seul état physique. Une méthode générale pour trouver l'état décrivant le système est d'appliquer l'opérateur de symétrisation (pour les bosons) à un des états du sous-espace propre mathématique associé à la valeur propre  $E_1 + E_2$  *a priori* :

$$\hat{\mathcal{S}} |\psi_1, \psi_2\rangle = \frac{\hat{I} + \hat{P}_{12}}{2} |\psi_1, \psi_2\rangle$$

$$= \frac{|\psi_1, \psi_2\rangle + |\psi_2, \psi_1\rangle}{2}$$

Il faut ensuite normaliser l'état obtenu.

### 9.2.2

#### SYSTÈME DE DEUX FERMIONS

Considérons désormais un système de deux fermions, lesquels ne peuvent pas être dans le même état puisque l'état  $|\alpha, \alpha\rangle$  est symétrique par échange des particules : c'est le **principe d'exclusion de Pauli**. En considérant deux états différents  $|\alpha\rangle$  et  $|\beta\rangle$ , on peut cependant construire un état physiquement acceptable (après normalisation) par application de l'opérateur antisymétrisation :

$$\hat{\mathcal{A}} |\alpha, \beta\rangle = \frac{|\alpha, \beta\rangle - |\beta, \alpha\rangle}{2}$$

Si ces deux états sont orthogonaux, l'état correspondant est  $\frac{|\alpha, \beta\rangle - |\beta, \alpha\rangle}{\sqrt{2}}$ . Décrivons désormais explicitement le degré de liberté de spin de nos deux fermions (que nous supposons à spin demi-entier). L'espace de Hilbert s'écrit

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_H &= \mathcal{E}_{\text{externe}}^{(1)} \otimes \mathcal{E}_{\text{spin}}^{(1)} \otimes \mathcal{E}_{\text{externe}}^{(2)} \otimes \mathcal{E}_{\text{spin}}^{(2)} \\ &= \left( \mathcal{E}_{\text{externe}}^{(1)} \otimes \mathcal{E}_{\text{externe}}^{(2)} \right) \otimes \left( \mathcal{E}_{\text{spin}}^{(1)} \otimes \mathcal{E}_{\text{spin}}^{(2)} \right) \end{aligned}$$

On suppose que que l'hamiltonien à une particule n'agisse que sur les degrés de libertés externes de la particule, ce qui implique que les valeurs propres  $E_n$  de  $\hat{h}$  sont deux fois dégénérées :

$$\hat{h} |\psi_n\rangle \otimes |\pm\rangle = E_n |\psi_n\rangle \otimes |\pm\rangle$$

Cherchons l'état fondamental du système. La forme la plus générale d'écriture des deux particules dans l'état d'énergie  $E_1$  est

$$|\Psi\rangle = |\psi_1, \psi_1\rangle \otimes \sum_{i,j=\pm} c_{i,j} |ij\rangle$$

Le postulat de symétrisation impose que  $\hat{P}_{12} |\Psi\rangle = -|\Psi\rangle$ , soit  $c_{++} = c_{--} = 0$  et  $c_{+-} = -c_{-+}$ , soit après normalisation

$$|\Psi\rangle = |\psi_1, \psi_1\rangle \otimes \frac{|+-\rangle - |-+\rangle}{\sqrt{2}}$$

La représentation de cet état fondamental se fait donc à l'aide de deux flèches en sens contraires, signifiant que le système est dans un état antisymétrique.

### 9.3

### EXPÉRIENCE DE HONG-OU-MANDEL