

Médicaments des Urgences

Dr.KHERBA_N

Sommaire

Adrénaline

Aspegic

Atarax

Atropine

Atrovent

Cordarone

Depakine

Dexamethasone

Dobutrex

Dopamine

Ephedrine

Flagyl

Flumazenil

Gardenal

Héparine rapide

Hydrocortisone

Isuprel

Lasilix

Lenitral

Loxen

Mg

Mopral

Morphine

Noradrénaline

Perfalgan

Phenergan

Primperan

Propranolol

Salbutamol

Solumedrol

Spasfon

Tamgésic

Terbutaline

Valium

Venofer

Ventoline

Vitamine K

Zovirax

Adrénaline

■ **Epinéphrine**=> Vasoconstricteur (alpha),
Vasodilatateur (beta)

■ Amp 1_0.5_0.25mg/1ml

■ Dilution dans SSI

■ 0.01mg/kg, Max :

■ 0.5mg pour un adulte

■ 0.3mg pour un enfant

■ À renouveler chaque 10min

■ Intrabronchique: 100ug/kg

■ IVD: 10ug/kg

■ Sc: 10_15ug/kg

■ Perfusion: 0.025_1ug/kg/min



Indications:

- Arrêt cardiaque:
- 1mg/3mn en IVD
- 3mg/10ml en intratrachéal
- Enfant: 10_30ug en intratrachéale chaque 3_5min
- État de choc: 0.01ug/kg/mn en IV
- Anaphylactique: 0.1_0.2mg en IVL
- 1mg dans 10ml de SSI
- Hypovolémique: 0.05_0.5u/kg/mn
- Asthme aigu grave:
- 0.01_1ug/kg/mn en IV



Contre indications:

- TDR ventriculaire
- Cardiomyopathies obstructives
- Insuffisance coronaire

Aspegic

- Adulte: 0.5_1g en IV
- Antiagrégant plaquettaire 250mg en IV
- Enfant: 10_25mg/kg/j en 6inj
- Dilution dans le SG ou SSI



Indications

- Antipyrétique, antalgique
- Antiagrégant plaquettaire (IDM)
- Anti-inflammatoire



Contre indications:

- UGD
- Virose
- Allergie à l'aspirine
- Risque hémorragique
- 3ème trimestre de grossesse

Atarax

Hydroxyzine

- 50_100mg en IM ou IVL dilué dans 10ml de SSI en 5mn

Indications :

- Tranquillisant (anxiété, agitation)
- Antihistaminique H1 (allergie)

Contre indications :

- Glaucome
- Adénome de prostate
- Grossesse 1^{er} trimestre

Atropine

- Antagoniste compétitif de l'Ach
 - Effet: tachycardisant, mydriatique, antispasmodique, antisécrétoire (salivaire, bronchique, gastrique, sudoripare)
 - 0.25mg 1mg/1ml
 - 10_15u/kg en IVL 0.5min
- ✓ Indications:
- BAV
 - Bradycardie sinusale: 0.5_1mg en IVD
 - Douleur aiguë spasmodique (colique néphrétique, biliaire, digestive)
 - Intoxication par les anticholinestérasiques organophosphorés: 1_2mg/5mn en IVD

Contre indications:

- Glaucome à angle fermé
- Hypertrophie prostatique
- Iléus paralytique
- Tachycardie
- IC

Atrovent

■ Unidose :

- Adulte et Enfant >5ans : 0.5mg/2ml ou 2cc=> 1 récipient/5ml Aérosol
- Enfant <5ans : 0.25mg/2ml ou 2cc=> 1 récipient/4ml Aérosol
- Autorisé chez les cardiopathes

Indications :

- Crise d'asthme sévère
- Décompensation BPCO
- État de mal asmathique

Cordarone

■ **Amiodarone** => antiarythmique

■ Amp 150mg/3ml

■ Dose de charge : 5mg/kg en IVL sur 15_30min

Puis relais au PSE 1amp sur 8h

■ Dose d'entretien : 10mg/kg/24h

■ Seulement le SG5%, jamais inj rapide



Indications :

■ TDR ventriculaire et supraventriculaire



Contre indications :

■ BAV

■ Bradycardie

■ Grossesse

- Dysthyroïdies
- Allergie à l'iode
- Hypotension artérielle
- Troubles de conduction
- Collapsus cardio-vasculaire
- Insuffisance cardiaque sévère

Depakine

Valproate de sodium

- Bolus 15mg/kg en IVL sur 3min puis relais au PSE à 1mg/kg/h
- Dilution dans sérum physiologique

Indications :

- État de mal épileptique

Contre indications :

- Affections hépatiques

Dexamethasone

- 1 amp de 4mg

● Inj : 0.5mg/kg/j en IM max : 12mg

Cp/inj

- Adulte : 0.5_9mg/kg/j

- Ou 0.6mg/kg en IM

Échec après 1h : 0.4mg/kg

- Laryngite : Nébulisation=> 1 amp + 1cc

Adrénaline + 4cc SSI

Dobutrex

■ Dobutamine

- Amp 250mg/10ml ; 2.5_20ug/kg/mn
- Ne pas arrêter brutalement la perfusion
- Dilution que dans le SG5% ou SSI
- Dilution : $\text{poids} \times 3 = \text{dose en mg à diluer dans 50ml}$

1ml/h = 1ug/kg/mn

Indications :

- État de choc cardiogénique
- Choc septique à la phase hypokinétique

Contre indications :

- Cardiomyopathies obstructives
- Valvulopathies aortique
- Tamponnade

Dopamine

● Amp 200mg/5ml, 50mg/10ml

▪ Action: dose dépendante

✓ Indications:

▪ État de choc

Ephedrine

- Amp 30mg/1ml

 Indications :

- Collapsus vasculaire 3_9mg en IVD

Flagyl

- 30mg/kg/j

- Durée : 7j

- 3/j

- Sirop : 125mg (Nrs)/ 200mg (Enfant)

- 1cam 3/j

- Cp : 1cp 3/j

- 250mg : >13ans

- 500mg : Adulte

- Flacon : 500mg/8h pour un adulte

Enfant : 20mg/kg/j

Flumazenil

■ Anexate

- Amp 0.5mg/5ml et 1mg/1ml

0.2_0.3/min en IV jusqu'à au réveil, max : 2mg

- Relais au PSE 0.1_0.4mg/h



Indications :

- Antidote dans les surdosages aux BZD



Contre indications :

- Épilepsie
- Intoxication polymédicamenteuse

Gardenal

■ Phénobarbital

⇒ Anticonvulsivant, sédatif, hypnotique

■ Solution inj : 40mg/2ml en IM ou IVL sur 15min

■ Dilution dans 500 de SG ou SSI

■ Posologie :

■ Adulte : 10mg/kg/j

■ Enfant : 20_40mg/j

■ Nourrisson : 10_20mg/j

 Indications :

■ Épilepsie généralisée ou partielle

■ État de mal convulsif

Contre indications :

- Porphyries
- Insuffisance respiratoire sévère
- Hypersensibilité aux Barbituriques

Heparine rapide

- Flacon 5ml
- 400_600 ui/kg/24h au PSE
- Posologie en fonction des résultats de l'hémostase

Indications :

- La nécessité d'anticoagulants efficaces :
- Phlébite
- Embolie
- Infarctus

Contre indications :

- ATCD de Thrombopénie sous Héparine
- Lésions susceptible de saigner

 Effets secondaires :

- Thrombopénie
- Hémorragie

Hydrocortisone HHC

- Adulte : 100_200mg en IV
- Enfant : 5mg/kg
- Dilution dans 2cc de SG5% ou SSI



Indications :

- Laryngite
- Œdème laryngé
- Œdème de Quincke
- Asthme aigu grave
- Toux sèche gênante

Isuprel

- **Isoprenaline** amp 0.2mg/ml
- 0.01_0.1u/kg/min
- 5amp (1mg) dans 250ml de SG5%



Indications :

- Bradycardie par BAV
- Torsade de pointe
- BAV 3^{ème} degré



Contre indications :

- Insuffisance coronarienne aiguë

Lasilix

■ **Furosémide**=> Diurétique de HA, inhibe la réabsorption du Na et Cl

■ Amp 20mg/2ml 40mg

■ En IM ou IV, jamais dilué

■ 20_80mg en IVD

■ 0.5_2mg/kg/j



Indications:

■ IR

■ OAP

■ HTA pulmonaire

■ Poussée hypertensive

■ Insuffisance cardiaque

■ Rétention hydrosodée

■ Hypercalcémie aiguë

- Hyperkalémie
- Néphropathie

Contre indications:

- Encéphalopathie hépatique
- Hypersensibilité aux sulfamides
- Troubles hydro électrolytiques non corrigés
- Oligo anurie sur obstacle des voies urinaires

Effets secondaires:

- Troubles hydroélectriques: hypoNa, hypoK
- Hypovolémie, hypoTA
- Déshydratation
- Troubles métaboliques (Glycémie)

Lenitral

Lenitral/Nitrocine (Trinitrines)

- Dérivé nitré=> Vasodilatateur, antiangineux
- Amp 3mg/2ml et 15mg/10ml
- 1_3mg/h en PSE
- OAP hypertensif : dose de charge 1_3mg en IVD à renouveler après 10mn
- Dilution dans le SG5% ou sérum physiologique



Indications :

- IDM
- OAP
- Angor instable
- HTA systolique



Contre indications :

- Hypotension sévère
- ICD aigue

Loxen

- **Nicardipine**=> antihypertenseur, Inhibiteur calcique, Vasodilatateur artériel
- Amp 10mg/10ml 5mg/5ml
- Strictement en IV dilué ou en perfusion
- 1cc dilué dans SG5% chaque 1h, max: 10mg
- 2.5mg en IV en 5min, à renouveler chaque 5min, max: 10mg
- Relais au PSE 2_4mg/h à adapter par palier 0.5mg/h
- Dilution dans le SG
- Dose de charge: 1mg en IVL/3min
- Dose d'entretien: 1_6mg/h en PSE
- Enfant: 0.5_3mg/kg/24h

 Indications:

- Dissection aortique
- Urgences hypertensives
- Menace d'accouchement prématuré
- Prééclampsie

Mg

- En IVL dilué dans le SG

Indications :

- Pic HTA
- DNV/Convulsion
- HypoMg/Hypokalémie
- Éclampsie/Prééclampsie
- Palpitations/Tachycardie
- Arythmie digitalique
- Anxiété/Agitation
- Torsade de pointe
- Crise d'asthme
- Troubles de rythme

Contre indications :

- Myasthénie
- Hypotension sévère

Mopral

Omeprazole

- 40mg, en perfusion IV
- Si hémorragie active surtout d'origine ulcéreuse: bolus 80mg en IV
puis 200mg/24h à la SAP
- 5amp (200mg) ramenées jusqu'à 50cc SG5% en PSE

Débit: 2cc/h (8mg/h)

- Enfant => 1-2mg/kg/j diluée dans 250cc de SG5% ou SSI9%
- Adulte: 1amp
- Enfant: 1/2 amp

✓ Indications :

- RGO
- UGD
- Hémorragie digestive

Morphine

- Amp 10mg/1ml
- 0.1mg/kg S/c ou IV
- Si insuffisant à compléter par bolus de 1mg/5 à 10mn jusqu'à l'amélioration



Indications :

- Douleur résistante aux autres antalgiques



Contre indications :

- TC grave en l'absence de ventilation contrôlée
- IHC sévère

Noradrénaline

- Amp 8mg/4ml
- 0.5_3u/kg/min
- Dilution dans le SG

 Indications :

- États de choc

Perfalgan

- En IV 500mg : Enfant 1g : Adulte
- Enfant : 15mg/kg/j Soit 1.5ml/kg
- Max 3g/j
- 1.5cc/kg
- 250/500mg

Poids + 1/2Poids = ?cc

- <10kg : $7.5\text{mg} \times \text{poids}/6\text{h}$ perf IV 0.75cc/kg
- >10kg : $15\text{mg} \times \text{poids}/6\text{h}$ perf IV 1.5cc/kg

Phenergan

- **Prométazine**=> AH sédatif
- IM ou IV diluée

Indications :

- DNV
- Urticaire
- Agitation
- Troubles de sommeil

Primperan

- Max 5j 1_3/j

- Sirop : >1ans 1ddp 1_3/j

- 15_19kg : 2mg

- 20_29kg : 2.5mg

- 30_60kg : 5mg

- >60kg : 10mg

- Cp : 10mg >18ans 1cp 1_3/j

- Inj : en IM ou IV diluée dans 2cc de SG ou SSI

- ✓ Indications :

- DNV

- Crise de panique

- Nausées/vomissements

- ⊖ Contre indications :

- Occlusion intestinale

Propranolol

Alvocardyl

- Amp 5mg/5ml
- 0.5_1mg en IVD chaque 2min jusqu'à effet, max : 10mg
- Dilution dans SG ou physiologique
- Injection trop rapide risque de bradycardie

- Indications :
- TDR supraventriculaire

Contre indications :

- IC
- BAV
- Asthme
- Maladie de l'oreillette
- En association avec le Cordarone

Salbutamol

- Bronchodilatateur, Utéro_relaxation
- 0.5mg/1ml 5mg/5ml
- Nourrisson : 0.03cc/kg max : 1cc + 2cc de SSI



Indications :

- Bronchospasme
- Crise d'asthme sévère
- État de mal asmathique
- Menace d'accouchement prématuré



Contre indications :

- IDM aigue
- Angor instable
- Insuffisance coronarienne

 Effets secondaires :

- Hypotension artérielle
- Tachycardie
- Agitation
- Vertiges
- Nausées

Solumedrol

- **Méthylprédnisolone** (Anti_inflammatoire)
- 20mg 40mg 80mg 120mg en IM ou IVD
- 1_2mg/kg en IVL sur 5_10min
- Dilution dans SG ou SSI
- Traumatisme médullaire : 30mg/kg/45min puis 5,4mg/kg/h pdt les 23h restantes

Indications :

- Crise d'asthme
- Piqûre d'insecte
- Réaction allergique
- Œdème de Quincke
- Traumatisme du rachis
- Réactions inflammatoires
- Œdème laryngé, laryngite, épiglottite

Effets secondaires :

- HTA
- UGD
- Allergie
- Hémorragie digestive
- Arythmie si IV trop rapide

Spasfon

● Inj : 80mg déjà diluée en IM ou IVD

0.5mg/kg/6h max 3amp/j

■ 5ans<.. <12 ans : $\frac{1}{2}$ amp

■ >12 ans : 1amp

● Lyoc 80mg/160mg

■ >8 ans : 1lyoc 2/j

■ Adulte : 2lyoc 80mg ou 1lyoc 160mg au moment de crise, à renouveler en cas des spasmes importants sans dépasser 6lyocs de 80mg ou 3 de 160mg

● Suppo : 150mg Adulte 1suppo à la demande
1_3/j

 Indications :

- Dysménorrhées
- Colique hépatique
- Colique néphrétique
- Intoxication alimentaire
- Colopathies fonctionnelles

Tamgésic

- 1amp Sc IM IV Ou 1cp en sublingual
- Enfant: 1/3amp ou 0.002_0.006mg/kg/6_8h

Ex: 20kg=> 0.04_0.12mg/6_8h en Sc

Indications :

- Antalgique morphinique

Contre indications :

- Âgé <15ans
- Intoxication éthylique
- Insuffisance respiratoire
- Insuffisance hépato cellulaire

Terbutaline

- **Bricanyl**=> Bronchodilatateur,
Utéro_relaxation
- Amp 0.5mg/1ml dosette 5mg/2ml
- Nébulisation : Asthme aigu grave
- Aérosol : Nébulisation avec 6_8l d'O2 de
5_10min de Ventoline 5_10mg (1_2ml) ou
Bricanyl 5_10mg (2_4ml) + Atrovent 0.5mg/2ml
uniquement à la 1^{ère} Nébulisation
- IVL : ½_1amp/60kg dans 5min puis relais au
PSE 0.1_1ug/kg/mn
- S/c :
- Adulte : ½_1amp chaque 6h
- Enfant : 10u/kg (1/4amp pour 15kg)

 Indications :

- Hyperkalémie
- Crise d'asthme
- Dyspnée spastique en cas d'insuffisance respiratoire chronique

 Contre indications :

- Affection coronarienne aiguë

Valium

- **Diazépam**=> antianxiolytique, anticonvulsivant, myorelaxant, sédatif
- Solution inj 10mg/2ml, dans SG ou SSI
- Adulte : 0.1_0.2mg/kg en IM ou IVL
10_20mg 1mg/mn
- Enfant : 0.5mg/kg en IR à renouveler si besoin
0.1ml de solution par Kg, max : 10mg (1amp)
- Par exemple : 12kg=> $12/2 = 6\text{mg}$
30kg=> 10mg puisque c'est la dose max
0.3mg/kg en IVL

Indications :

- Urgences neuropsychiatriques : Épilepsie, crise d'angoisse, agitation, crise convulsive
- Intoxication aux chloroquines
- Tétanos

Contre indications :

- Insuffisance respiratoire et hépatique sévère
- Hypersensibilité aux Benzodiazépines
- Myasthénie

Effets secondaires :

- Somnolence
- Dépendance
- Sensation ébrieuse
- Syndrome de sevrage

Vénofer

Indications :

- Intolérance au fer oral
- Troubles d'absorption intestinale
- Non observance du traitement oral
- Inefficacité du fer oral après 2_4sem
- Refus ou contre indication à la transfusion
- Anémie modérée à sévère mal tolérée (Hb < 10g/dL)
- Besoins rapides en fer (chirurgie, grossesse à terme, hémorragie)

 1amp de 100mg de fer dans 5ml à diluer dans 100ml de NaCl 0.09% en 1h

Éviter le SG5% (incompatibilité chimique possible)

- FNS de contrôle après 15j

Ventoline

- Bronchodilatateur
- 1_2 bouffées 1_2/j

Indications :

- Crise d'asthme sévère
- BPCO

Contre indications :

- Allergie

Vitamine K1 Konakion

- Amp 10mg/1ml
- 10mg en IVL
- Dilution dans le SG ou SSI

Indications :

- Surdosage aux AVK

Contre indications :

- Allergie à la Vitamine K

Zovirax

- 30mg/kg/24h en 3 perfusions (1h dilution de 50_100ml)
- A adapter la posologie an cas d'IR

Indications :

- Méningite herpétique

