

COLLECTION

1 50

Ordonnances types

2017-2018



Boutelís BÍlal
Interne en Médecine

AVANT PROPOS

C'est juste une collection des ordonnances types correspondant à des situations cliniques les plus courantes, rédigées de façon précise, avec les posologies ..

Elles constituent un aide-mémoire précieux pour les internes, les jeunes médecins et tous ceux qui sont amenés à prescrire, pour leur offrir une aide pratique immédiate ..

Sommaire

A

Abcès péri-anal*	07
Abcès collecté*	08
Adénome de la prostate	09
Allergie	10
Angine bactérienne (IDEM Rhinopharyngite)	11
Angine virale	12
Anite	13
Anthrax	14
Appendicite*	15
Asthénie	16
Asthme (IDEM Bronchiolite)	17

B

Balanite	18
Blépharite	19
Bouchon de cérumen	20
Bouffée de chaleur chez une femme ménopausée*	21
Bronchite aiguë*	22
Bronchite aiguë	23
Bronchite aiguë	24
Brûlure*	25

C

Candidose cutanée*	27
Candidose	28
Cellulite	29
Chalazion	30
Cholécystite	31
Cocktail antalgique	32
Colique néphrétique*	33
Colique_néphrétique*	34
Colopathie*	35
Colopathie fonctionnelle*	36
Conjonctivite bactérienne*	37
Conjonctivite bactérienne	38
Conjonctivite virale	39
Conjonctivite allergique (Sécrétions claires avec prurit)	40
Constipation*	41
Coqueluche	42
Cors	43
Crise hémorroïdaire*	44
Crise d'asthme modérée*	45

Crise ulcéro-hémorragique*	46
Crise ulcéreuse hyperalgique*	47
Cystite*	48
D	
Dermite de siège	49
Diarrhée aiguë (Shigellose)*	50
Diarrhée aqueuse d'origine virale*	51
Diarrhée glairo-sanglante d'origine bactérienne*	52
Diarrhée parasitaire (Amibiase)*	53
Diarrhée sanglante*	54
Douleur abdominale*	55
Douleur cancéreuse*	56
Douleur lombosciatique (Lombosciatalgie)*	57
Douleur thoracique*	58
Dysménorrhée chez une jeune fille*	59
Dystonie neurovégétative (DNV)*	60
E	
Eczéma atopique	61
Embolie pulmonaire	62
Entorse	63
Enurésie	64
Epistaxis*	65
Eruption	66
Erysipèle	67
Erythème fessier, Engelure, Gerçure, Crevasse des seins	68
F	
Furoncle	69
Folliculite	70
G	
Gale	71
GNA	72
Grippe	73
H	
Hématurie*	74
Hémorroïdes*	75
Hémorroïdes externes*	76
Hémorroïdes + Constipation*	77
Herpes	78
Hypercholestérolémie	79
Hyperglycémie avec acétonurie	80
Hyper Tension Artérielle (HTA)	81
Hypertrophie Bénigne de la Prostate (HBP)*	82
Hypotension orthostatique*	83

<i>I</i>	
Impétigo	84
Ingestion d'un caustique	85
Infection broncho-pulmonaire	86
Infection génitale chez la femme	87
Infection urinaire*	89
Insomnie	90
Insomnie occasionnelle	91
Intertrigo inter-orteil	92
Intertrigo à Candida Albicans	93
Intoxication alimentaire*	94
<i>K</i>	
Kératodermie	95
<i>L</i>	
Laryngite	96
Leishmaniose	97
Leucorrhée blanchâtre = Mycosique*	98
Leucorrhée jaunâtre + écoulement urinaire (Gonocoque / Chlamydia / Germes banaux)*	99
Leucorrhée verdâtre nauséabonde = Trichomonas Vaginalis*	100
Lombago aigue*	101
<i>M</i>	
Maladies thromboemboliques des MI	102
Migraine*	103
Migraine	104
Migraine*	105
Migraine ou douleur dentaire atroce*	106
MIU (Mort In Utéro)	107
Morsure	108
Muguet	109
<i>N</i>	
Néuralgie	110
<i>O</i>	
OAP (Œdème Aigue du Poumon)	111
Orchiépididymite*	112
Oreillon	113
Orgelet	114
Orgelet	115
Otites	116
Otite Moyenne Aigue (OMI)*	117
<i>P</i>	
Paralysie faciale périphérique*	118
Péri onyxis à Candida Albicans	119
Perlèche	120
Pédiculose ou Phtiriasis	121

Pédiculose de cuir chevelu « poux de tête »*	122
Phlébite	123
Piqûre d'insecte	124
Plaie par arme blanche*	125
Plaie infecté*	126
Plaie surinfectée	127
Prostatite*	128
Prurit	129
PNA*	130
PNA (IDEM Prostatite)	131
R	
RGO*	132
RGO*	133
Rhinite aigue	134
Rhinite allergique saisonnière	135
Rhume	136
Rougeole	137
S	
Scarlatine	138
Sciatique*	139
Sinusite maxillaire aigue*	140
Suite de couche*	141
Surinfection bactérienne d'une bronchite aigue virale	142
T	
Teigne du cuir chevelu*	143
Torticolis spasmodiques	144
Toux	145
Trachome	146
Traumatisme thoracique*	147
U	
Ulcère*	148
Ulcère Gastroduodénal (UGD)*	149
Ulcère Gastroduodénal (UGD)*	150
Urétrite	151
Urticaire	152
V	
Varicocèle*	153
Varicelle*	154
Verrues	155
Vers dans les selles	156
Vertige	157
Vomissement	158

Abcès péri-anal*

- Flagyl cp 500mgQSP 10j
01cp x 03/j
- Oxacilline gel 500mgQSP 10j
02gel x 02/j
- Voltarene cp 75Lp01Bte
01gel /j
- Lomac gel 20mg01Bte
01gel /j
- Permanganate de K+01Bte
- 01L d'eau tiède après chaque selle

Abcès collecté*

- Drainage chirurgicale :
 - Perfusion de 1000cc de SSI 9%
 - Oxacilline 01g x 4/j en IVD
 - Flagyl inj 0.5 x 3/j en IVL
 - Genta 80 mg inj x 2/j en IM
- (Claforan)

Adénome de la prostate

-Cardular cp 02mg QSP 03moi
1/2 cp /j la 1^{ère} sem
1/2 cp x 02/j la 2^{ème} sem
01cp x 02/j à partir de la 3^{ème} sem

Allergie

-HHC 05mg/kg/j (urgence)

-Clarityne srp 01flc

01CM/j (< 30kg)

01CM/j (> 30kg)

Ou:

-Polaramine srp 01flc

01 càc x 02/j

Angine bactérienne

(IDEM Rhinopharyngite)

-Amoxil gel 500mg / srp 125/250mg QSP10j
02gel x 02/j / 50mg/kg/j

-Maxilase srp 01flc
01CM x 03/j

-Paracétamol cp 500mg/srp/supp 01Bte / 01flc
01cp x 03/j / 30mg/kg/j

Ou:

Aspégic st 500/250/100mg 01Bte
01st x 03/j / 50mg/kg/j

-Denoral srp..... 01flc
01-03 càc /j

Ou:

Rhinathiol srp..... 01flc
01-03 càc /j

-Soufrane (rhinorrhée claire) sol 01flc
01 pulv/N x 03/j

Ou:

Souframycine (rhinorrhée verte) sol 01flc
01 pulv/N x 03/j

Angine virale

- Paracétamol cp 500mg/srp/supp 01Bte / 01flc
01cp x 03/j / 30mg/kg/j
- Physiol sol 01flc
02Gttes/N x 04/j

Anite

- Fungizone sol 500mg QSP 10j
01CM x 03/j
- Nystatine cp 500.000UI/sol 100.000 QSP 10j
03cp x 03/j / 02MUI/j
- Eau oxygénée sol 01flc
01app x 02/j

Anthrax

- Bristopen amp inj 01g N°10
01inj /j en IM
- Bristopen gel 500mg QSP 10j
01gel x 02/j
- Hexomedine sol 01flc
01app x 02/j

Appendicite*

FNS + Echo

Admission + AVS + BPO + Cefacidal 01g x 04/j .. 100mg//kg

+ Gentamycine 03mg/kg + Flagyl 30/40mg/kg

+ Perfelgan 15mg/kg x 04 en IV 01g x 04/j

1000cc SGI 05% enfant - 1500cc adulte

Dans chaque 500cc: 03g Nacl + 02g Kcl + 01g Mg + 0.5g Ca

Cefacidal 01g x 03/j

Flagyl 500mg x 03/j

Gentamycine 80mg x 02/j

Perforation : Azantac 150mg x 03/j en IVD

Occlusion : Sonde gastrique

O2

Lavement rectale

Correction des troubles ioniques

Colique hépatique : En urgence => Spasfon en IV

Si vésicule palpable => Ampic + Genta

A la sortie : Spasfon cp 80 mg 01Bte

02cp x 02-3/j

Nalgésic cp 500mg 01Bte

01cp x 02/j

Asthénie

-Sargenor amp 01Bte

01amp x 02/j

Ou:

-Sargenor à la Vit-C amp..... 01Bte

01amp x 02/j

Ou:

-Gelpore amp 01Bte

01amp x 02/j

Ou:

-Gelée royale amp 01Bte

01amp x 02/j

Ou:

-Tonic amp 01Bte

02amp A+B x 02/j / 02amp A+B /j

Ou:

-Alvityl srp 01flc

01càc x 02/j / 01càs x 02/j

Asthme (IDEM Bronchiolite)

Crise légère :

-02bouffées de Salbutamol / Bricanyl toutes les 20mn

Ou: Salbutamol 0.03cc/kg/04cc de SSI

/ Bricanyl 0.04cc/kg/04cc de SSI

Ou: Salbutamol 07ug/kg en S/C / Bricanyl 0.56UI/kg en S/C

Crise modérée :

-02bouffées de Salbutamol / Bricanyl toutes les 20mn

Ou: Salbutamol 0.03cc/kg/04cc de SSI

/ Bricanyl 0.04cc/kg/04cc de SSI

Ou: Salbutamol 07ug/kg en S/C / Bricanyl 0.56UI/kg en S/C

-HHC 05ug/kg/j

Crise sévère :

-Oxygénothérapie

-Salbutamol toutes les 20mn

-Bricanyl en S/C toutes les 4 heures

-Théophylline 05mg/kg/04heures

A LA SORTIE (pour les trois types de crise):

-Salbutamol srp/cp 02mg 01flc/01Bte
01cp x 3/j / 0.2mg/kg/j

-Celestene sol 01flc
10Gttes/kg/j / 5j

Balanite

-Bleu de méthylène sol 01flc
01app x 02/j

-Pevaryl crème 01Tbe
01app x 02/j

Blépharite

- Tobrex collyre 01flc
01 gtte x 04/j
- Fucithalmic gel 01Tbe
01app x 02/j

Bouchon de cérumen

-Cerulyse sol 01flc
01lavage d'oreille x 03/j

Bouffée de chaleur chez une femme ménopausée*

-Abufene cp 400 QSP 10j
01cp x 02/j

-Doliprane cp 01g 02Bte
01cp x 03/j

Bronchite aigue*

-Augmentin sachet 01g QSP 10j
01sachet x 02/j

-Rhinathiol sirop 01flc
01càc x 03/j

-Solupred cp 20 QSP 05j
02cp /j le matin

-Codoliprane cp 02Bte
02cp x 03/j

Bronchite aigue

- Amoxil gel 500mg/srp 125/250mg QSP 10j
01gel x 02/j / 50mg/kg/j
- Fluimicil st 01Bte
01st x 03/j
- Paracétamol cp 500mg/srp/supp 01Bte / 01flc
01cp x 03/j / 30mg/kg/j

Bronchite aigue

- Augmentin cp 500mg/srp 125/250mg QSP 10j
01cp x 02/j / 50mg/kg/j
- Fluimicil st 01Bte
01st x 03/j
- Becotide spray 01Bte
01pulv x 02/j
- Théophylline LP cp 01Bte
01cp x 02/j

Brulure*

- Péni V (Orapen) QSP 10j
01cp x 03/j
- Flammazine pmd 01Tube
01app x 03/j (*anti bact + anti staph local*)
- Paracétamol cp 01g 01Bte
01cp x 03/j

-Si 02^{ème} ou 03^{ème} degré => Réa

-Si 01^{ère} degré et S >10% :

- Péni M (Oxacilline) inj 01g N°10
01inj /j en IM
- Oxacilline gel 500mg QSP 10j
02gel x 02/j
- Flammazine pmd 01tube
01app x 03/j
- Biofen pmd 01tube
01app x 02/j (détersion + émulsion)
- Paracétamol cp 01g 01Bte
01cp x 03/j
- Mébo crème 01lotion
01app x 03/j

- Si < 05% :
- Oxacilline sirop 250mg
 - Doliprane 50mg/kg/j
 - Flammazine

-Si > 05% => Réa

- 2-4cc SSI/kg/S²C
- iono + urée + créa + FNS
- TRT parentéral : Oxacilline 01 x 04/j en IVD
 - Gentamycine 80mg x 02/j en IM
 - Flagyl 500mg x 03/j en IVL
- Réhydratation : 4cc SSI/kg/SC/j
 - *1/2 dans les 8 premiers heures *1/2 dose dans les 16 heures

Brulure 01^{ère} degré

- Oxacilline gel 500mg QSP 10j
 - 02gel x 02/j
- Flagyl cp 500mg QSP 10j
 - 01cp x 03/j
- Doliprane cp 500mg 01Bte
 - 01cp x 03/j
- Ou Nifluril supp 700mg 01Bte
 - 01supp/j le soir pdt 05j
- Mébo crème 01lotion
 - 01app x 03/j

Candidose cutanée*

-Ketoderm sachet QSP 01mois
02app /sem

-Mouiller la zone atteinte

-Application

-Moussez

-Laissez 05min

-Rincer

Candidose

- Fungizone cp 250mg/susp bvb 01Bte/01flc
02cp x 03/j / 01càc/10kg/j
- Mycostatine cp 500.000/susp 100.000 01Bte/01flc
02cp x 03/j / 01dose x 05/j
- Hextril sol 01flc
01app x 02/j
- Bicarbonate sol 01flc
01app x 02/j

Cellulite

- Fucidine cp 250mg / srp 100,250mg QSP 10j
02cp x 04/j / 50mg/kg/j
- Voltarene suppo 100mg/25mg 01Bte
01suppo le soir
- Bétadine sol 01flc
01app x 02/j

Chalazion

-Stedrex pmd ophtalmiqueQSP 07j

01app x 03/j

(dans le cul de sac conjonctival)

+

Massage de la paupière avec une compresse stérile et eau tiède

Si échec => TRT chirurgical

Cholécystite

- Clamoxyl cp 01gQSP 10j
01cp x 03/j
- Flagyl cp 500mgQSP 10j
01cp x 03/j
- Spasfon 10mg 01Bte
01lyoc x 02-03/j

Cocktail antalgique

01amp de Spasfon
+
01amp de Viscéralgine

Dans 150cc de SSI à flot

Colique néphrétique*

- 01amp Azantac en IM
01amp Spasfon en IM ou IV
01amp Voltarene en IM ou 01amp Profénid en IV
- Si persiste : 80mg Solumedrol + 01amp Spasfon
- HDJ : 500cc SGI + 03amp Spasfon + 1/2amp Tamgésic en s/c
CI: TA<11, Asthme, DR.
- Valium

Colique_néphrétique*

CU si (+) ECBU - ASP - Echo - Urée – Créa.

-Profénid supp 100mg 01Bte
01supp /j le soir pdt 15j

Ou cp 200mg 01Bte
01cp /j au cours des repas

-Spasfon lyoc 80mg 01Bte
02lyoc x 03/j

Ou Riabal cp 300mg 01Bte
02lyoc x 03/j

-Efferalgan 05mg 01Bte
01cp x 02/j

+/-Josir gel 0.4mg QSP 01mois (01gel /j)
(alpha bloquant)

- Lomac gel 20mg 01Bte
(01gel /j)

Colopathie*

- Duspatalin gel 01Bte (antispasmodique)
01gel x 03/j
- Spasfon 01Bte
01lyoc x 02/j
- Normacol Lavement
(Regulax) 01app /j

Colopathie fonctionnelle*

-Meteospasmyl gel 01Bte

01gel x 03/j avant repas

-Bedelix sachet 01Bte

01sacchet x 03/j avant repas

-Eucarbon cp 01mois

01cp x 03/j avant repas

-Cibetaine amp buv 02Bte

01AB x 03/j

Conjonctivite bactérienne*

-Cebemyxine collyre QSP 07j
01gtt x 04/j

-Cebemyxine pmd QSP 07j
01app le soir

Ou :

-Rifamycine collyre QSP 07j
01gtt x 04/j

-Rifamycine pmd QSP 07j
01app le soir

Conjonctivite bactérienne

(Sécrétions abondantes et purulente)

-Dacryoserium sol 01flc
01app x 03/j

-Tobrex collyre 01flc
01gtte x 03/j

Ou:

Fucithalmic gel 01tbe
01app x 02/j

Conjonctivite virale

(Sécrétions claires+notion d'épidémie)

-Indocollire collyre 01flc

01gtte x 03/j

-Vitabact collyre 01flc

01gtte x 03/j

Conjonctivite allergique (Sécrétions claires avec prurit)

-Naaxia collyre 01flc
01gtte x 03/j

Ou:

Levophta sol 0.05% 01flc
01gtte x 03/j

-Hismanal sol 01flc
01CM/10kg/j (monoprise)

Constipation*

-Débridat 01flc

01godet (01càc) de 15cc (01càc) x 03/j

Ou :

Débridat cp 100mg 01Bte

01cp x 03/j

-Duphalac 01Bte

01sac x 03/j

Ou :

Forlax 10g 01Bte

01sac x 02/j

Ou :

Microlax 01Bte

01microlavement (tube) /j

-Huile de paraffine 01flc

02càc 02/j

-Normacol tube lavement N°03

01tube /j

-Spasfon lyoc 80mg 01Bte

01cp x 03/j

Coqueluche

- Rovamycine ou Josacine cp 1.5 et 03MUI / srp250mg 01flc
03MUI x 02/j / 50mg/kg/j
- Toplexil (avant 30mois) srp 01flc
01càc x 03/j
- Trophires (après 30mois) srp 01flc
½ càc x 03/j

Cors

-Vericide-Coricide / Kerafilm / Vaseline salicylée Pde 01Tbe
01app x 02/j

Crise d'asthme modérée*

-En urgence :

AVS + semi-assise + oxygène à forte débit

100-200mg d'HHC lente SOIT 40-80mg de Solumedrol en IVL

Nébulisation (20min) de 01cc de Salbutamol dans 04cc de SSI

réévaluation 20min

03 séances de Salbutamol à 20min d'intervalle si pas de réponse
hospitalisation

-Ordonnance de sortie :

Salbutamol spray 01flc
01bouffée x 03/j

Solupred cp 20 QSP 05j
03cp /j le matin non à jeun

Amoxicilline cp 01g QSP 01-10j
01cp x 02/j (à titre préventif)

Loratadine cp 10 01Bte
01cp /j le soir

Crise hémorroïdaire*

-Veinotonique : QSP 10j

Diovenor cp 600mg 01-03cp /j

Ciclo 3 fort gel 02-03gel /j

Dalfon cp500mg 03cp x 02/j pdt 04j

CI : grss – allaitement

Veinosmil gel 01-02 x 03/j 02cp x02/j pdt 03j

01cp x 02/j pdt 03j

-Anti hémorroïdaire :

Sprogtolog pmd 03cp /j

Supp 01supp /j

Actamdreine crème 02app /j

Supp 02supp /j

Giakor fort gel/sac

-Antalgique :

Efferalgan codéine ou Voltarene ou Profénid

-Régulateur du transit :

Duphalac sac 01sac x 03/j

-Bain de siège :

Permanganate de k+ 01cp dilué dans 01-03l d'eau tiède

-Durant la crise : => CTC / Profénid inj ou en IM

-Hygiène de vie : => Sport – fruits – légumes

-Si thrombose : => incision locale – anesthésie

Crise ulcéro-hémorragique*

Après avoir éliminer une perforation : absence de croissant gazeux à l'hémicoupole diaphragmatique droite de l'ASP.

- Perfusion de 1000cc de SSI 9%.
 - + 02amp Spasfon
 - + 02amp Azantac en IVL
 - + 02amp de Procaïne
- Sonde gastrique d'aspiration.
- Si nécessaire : oxygénothérapie.

Crise_ulcéreuse_hypéralgique*

- Éliminer une perforation gastrique (croissant ASP)
- Perfusion de 1000cc de SSI 9%.
 - + 02amp Spasfon
 - + 02amp Azantac en IVL (Antiulcéreux anti-H2)
 - + 02amp de Procaine
- Sonde gastrique d'aspiration.

Cystite*

Femme <65ans - Lombalgie - Grossesse – Diabète

CU – ECBU – Echo – Boissons abondantes

-Nifluril supp 400mg 01Bte
01supp/j

-Efferalgan cp 500mg 01Bte
01cp x 03/j

-Nibiol cp 100mg 01Bte
Antiseptique > 300mg/j ---> ATB

Chez la femme :

Uroacid cp 400mg QSP 10j
01cp x 02/j

Ou Céfacet cp 200mg QSP 10j
01cp x 03/j

Ou Ciprolon 500mg QSP 07j
01cp x 02/j

Ou Bactrim cp 960mg QSP 07j
01cp x 03/j

Dermite de siège

-HPM Pde..... 01Tbe
01app x 03/j

-Econazole lait 01Tbe
01app x 02/j

-Mycotine => si manifestations digestives

-Erythromycine => si surinfection

Diarrhée aigue (Shigellose)*

- SRO sac N°05
01sac/01L/24h
- Ampicilline amp inj 01g N°07
01inj /j en IM
- Ampicilline gel 500mg QSP 07j
01gel x 02/j
- Paracétamol cp 500mg 01Bte
01cp x 03/j

Diarrhée aqueuse d'origine virale *

- Ercefuryl gel 20mg 01Bte
01gel x 03/j
- Smecta sac 01Bte
01sac x 03/j

Diarrhée glairo-sanglante d'origine bactérienne*

- Bactrim cp 960mg 01Bte
02cp x 02/j
- Flagyl cp 500mg QSP 07j
01cp x 03/j
- Débridat cp 400mg 01Bte
(Antispasmodique) 01cp x 03/j
- Smecta sac 01Bte
01sac x 03/j
- Duspatalin gel 200mg 01Bte
(antispasmodique) 01gel x 03/j
- Ou Nifuroxazide gel 01Bte
01cp x 03/j

Diarrhée parasitaire (Amibiase)*

- Flagyl cp 250mg 03Btes
02cp x 03/j
- Intetrix gel 03Btes
02gel x 03/j

Diarrhée sanglante*

- Bactrim cp 960mg 01Bte
02cp x 02/j
- Ercefuryl gel 20mg 01Bte
01gel x 03/j
- SRO sac N°05
01sac/01L/24h

Douleur abdominale*

-Spasfon cp 01-02cp x 3/j
Suppo 01suppo x 02/j
Inj 01inj/j en IM

Ou: Viscéralgine cp 50mg 01Bte
/inj

Ou: Duspatalin gel 200mg 01Bte
01gel x 03/j avant le repas

Ou: Riabal inj 01inj /j en IM

Ou: Citrate de bétaine UPSA 01cp x 03/j
/ 01 amp buv x 03/j

Contre indications :

Viscéralgine inj + Riabal inj : -adénome de la prostate
-glaucome

Viscéralgine : -colite spasmodique
-colique hépatique
-colique néphrétique
-règles douloureuses

Duspatalin : -anti spasmodique
-tube digestif
-voies biliaires

Citrate de bétaine UPSA : pour le TRT dyspeptique
(dlr - malaise / lithiase de V.biliaire)

Douleur cancéreuse*

-Tamgésic cp 20mg 01Bte
01cp x 03/j en sublinguale

Douleur lombosciatique (Lombosciatalgie)*

-Voltarene cp 500mg 01Bte
01cp x 03/j

-Lomac gel 20mg 01Bte
01gel x 02/j

Ou

Doliprane cp 01g 01Bte
01cp x 03/j

-Kefentech patch 01app/12h

-IPP

Douleur thoracique*

-Profénid supp 100mg 01Bte
01supp /j

-Lomac gel 20mg 01Bte
01gel /j

-Efferalgan codéine 01Bte
01cp x 03/j

Ou :

Nalgésic gel 20mg 01Bte
01gel x 03/j

Dysménorrhée chez une jeune fille*

01amp Voltarene en IM

+/-

01amp d'Azantac en IV
(à titre préventif)

Dystonie neurovégétative (DNV)*

En générale il y'a une amélioration spontanée :

01amp de Primperan en IVD (neuroleptique)

Ou : 01amp de Calcibronat en IVD (rupture) si pas d'amélioration

Valium en IM si le patient agité

Ou : Valium en IVD si le patient très agité

NB : Valium jamais en 1^{ère} intention

Eczéma atopique

- Betasone Pde..... 01Tbe
01app x 02/j
- Hexamidine sol 01flc
01app x 02/j
- Clarityne cp 10mg / sol 01Bte/01flc
01cp /j / 01CM /j

Embolie pulmonaire

(ATCD, Dls thoraciques, Dyspnée, Toux, Tachycardie)

-Repos

-Oxygénothérapie

-Anticoagulant (Lovenox) inj 20mg01mg/kg x 02/j

-Relais les AVK le 3^{ème} jour

Entorse

- Diclofenac suppo 100mg/25mg 01Bte
01suppo le soir
- Diantalvic gel / Xalgésic gel 10mg 01Bte
01gel x 03/j

Enurésie

-Tofranil cp 10mg QSP 03mois
01cp /j (01h avant le coucher)

-Psychothérapie

Epistaxis*

- Dicynone cp 250mg 01Bte
02cp x 03/j
- HEC pmd 01Bte
01app nasale x 04/j
- Doliprane cp 01g 02Bte
01cp x 03/j

Eruption

- Flucidine Pde 01Bte
01app x 02/j
- Erythromycine cp 500mg / srp 250/125mg 01Bte/01flc
02cp x 02/j / 50mg/kg/j
- Hexamidine sol 01flc
01app x 02/j

Erysipèle

-Erythromycine cp 500mg / srp 250/125mg 01Bte/01flc
02cp x 02/j / 50mg/kg/j

-Eosine aqueuse sol 01flc
01app x 02/j

Si érysipèle de la jambe :

-Lovenox inj 20, 40, 60, 80mg N°05
01mg/kg en 02 prise

Erythème fessier, Engelure, Gerçure, Crevasse des seins

-HFM Pde	01Tbe
01app x 02/j	
-Lactacyd pH=5.2 Pde	01Tbe
01app x 02/j	

Furoncle

- Bristopen amp inj 01g N°10
01inj /j en IM
- Bristopen gel 500mg QSP 10j
01gel x 02/j
- Hexomedine sol 01flc
01app x 02/j

Folliculite

Superficielle :

-Hexomedine sol 01flc
01app x 02/j

Profonde :

-Flucidine Pde 01Tbe
01app x 02/j

-Hexomedine sol 01flc
01app x 02/j

Gale

-Ascabiol sol 01flc

J1 : après un bain chaud et savonneux de 20min,
application, laisser sécher pdt 10min puis 2^{ème} rebadigeonnage

J2 : 3^{ème} rebadigeonnage sans se laver

J3 : prendre un douche

-Aphtiria Poudre 01Bte

Poudrer la lingerie, la literie, les vêtements

GNA

(Oligurie, HTA, œdème ; Hématurie, Protéinurie)

-FNS, Urée, Créa, Protéinurie des 24h, ECBU

-Repos

-Extencilline amp inj 1.2MUI/0.6MUI N°01
01inj /21j en IM

-Lasilix cp 20mg 01Bte
01cp x 02/j / 01mg/kg/j

-Adalate cp 10mg 01Bte
01cp x 02/j

Grippe

-Paracétamol cp 500mg/srp/supp 01Bte / 01flc
01cp x 03/j / 30mg/kg/j

-UPSA Vit-C cp* 01Bte
01cp* x 03/j

-Rhinathiol srp 01flc
01càs x 03/j

-Soufrane sol 01flc
02 pulv/Narine x 03/j

Ou:

Souframycine sol 01flc
01 pulv/Narine x 03/j

Hématurie*

ECBU – FNS – TP – Echo

- Profénid supp 100mg 01Bte
01supp /j le soir pdt 05j
- Tramadol gel 500mg 01Bte
01gel x 02/j

Hémorroïdes*

- Dalfon cp 500 QSP 10j
02cp x 03/j (04j)
02cp x 02/j (03j)
02cp x 01/j (03j)
- Titanoreine crème 01tube
01app x 03/j
- Diantalvic gel 300mg 01Bte
01gel x 02/j
- KMnO4 cp 500mg 01Bte
01cp dilué dans 05l d'eau tiède

Hémorroïdes externes*

- Dalfon cp 500 QSP 07j
02cp x 03/j (04j)
01cp x 03/j (03j)
- Rapidus cp 50 QSP 07j
01cp x 03/j
- Titanoreine suppo 01Bte
01suppo x 02/j
- Duphalac sachet 01Bte
01sachet x 03/j
- Tronothane pmd 01Bte
01app x 02/j

Hémorroïdes + Constipation*

-Duphalac sac 01Bte

01sac x 03/j

-Débridat cp 100mg 01Bte

01cp x 03/j

-Dalfon cp 500 QSP 10j

02cp x 03/j (04j)

02cp x 02/j (03j)

02cp x 01/j (03j)

-Titanoreine crème 01tube

01app x 03/j

-KMnO4 cp 500mg 01Bte

01cp dilué dans 05l d'eau tiède

Herpes

Carciné :

- Ketoderm Pde 01Tbe
01app x 02/j
- Hexomedine sol 01flc
01app x 02/j
- Paracétamol cp 500mg/srp/supp 01Bte / 01flc
01cp x 03/j / 30mg/kg/j
- Erythromycine => si surinfection

Oculaire :

- Iduviran collyre 01flc
01Gtte/h le 1^{ère} j puis 01Gtte/2h les jrs suivants

Virale :

- Aciclovir Pde / cp 200mg / sol 200mg QSP 07j
01app ou 01cp ou 01CM x 05/j / 01app ou ½ CM x 05/j

Hypercholestérolémie

-Tahor cp 10mg QSP 01mois
01-02cp /j

Ou :

-Zostine cp 20mg QSP 01mois
01cp /j le soir

Hyperglycémie avec acétonurie

Insulinothérapie :

5UI d'insuline ordinaire en IVD pour chaque croix d'acétone en laissant une croix de sécurité toutes les heures jusqu'à négativation de l'acétonurie puis procéder à la voie sous cut :

Glycémie >2.5 $\Rightarrow$ 18UI en S/C

Glycémie 1.8-2.5 $\Rightarrow$ 16UI en S/C

Glycémie 1.6-1.8 $\Rightarrow$ 14UI en S/C

Glycémie 1.4-1.6 $\Rightarrow$ 12UI en S/C

Glycémie 1.2-1.4 $\Rightarrow$ 10UI en S/C

Glycémie <1.2 $\Rightarrow$ Abstention

Réhydratation :

02L de Nacl 09% en 02h

Puis relais par SG à faible débit 03L/m² de surface corporelle

Hyper Tension Artérielle (HTA)

-Lasilix cp 500mg QSP 01mois
01cp x 02/j

-Lopril cp 25mg QSP 01mois
 $\frac{1}{4}$ cp /j

-Exploration

Hypertrophie Bénigne de la Prostate (HBP)*

Taux de PSA (marqueur tmr)

-Alpha-bloquant :

Josir gel 0.4mg QSP 01mois

01gel /j

Ou Xatral cp 01g QSP 01mois

01cp /j

Ou Permixon gel 160mg QSP 01mois

01gel x 02/j

Ou Tadenan cp 50mg QSP 01mois

01cp x 02/j

-Inhibiteur de 5 alpha-réductase :

Avodart cp 0.5mg QSP 01mois

01cp /j

Hypotension orthostatique*

- Seglor goutte 01Bte
30gtes x 03/j
- Sargenor + Vit-C amp buv QSP 15j
01AB x 02/j
- Neuro Vit-B1B6 cp 02Bte
01cp x 03/j

Impétigo

(Bulles, Adénopathie, Prurit, Apyrexie)

-Augmentin cp 500mg/srp 125/250mg QSP 10j
01cp x 02/j / 50mg/kg/j

-Flucidine Pde 01Bte
01app x 02/j

-Hexamidine sol 01flc
01app x 02/j

-Eau oxygénée sol 01flc
01app x 02/j

Ingestion d'un caustique

-Alimentation parentérale

-Phosphalugel / Topaal /Gaviscon st 01Bte
01st x 03/j / ½ st x 03/j

-Azantac cp 300, 150mg 01Bte
01cp (300mg) /j ou 01cp (150mg) x 02/j / 05mg/kg/j

-Primperan sol 01flc
01CM x 03/j / 01Gtte/kg x 03/j ¼ d'heure avant les repas

-Amoxil cp 500mg / susp bvb 250/125mg QSP 10j
02cp x 02/j / 50mg/kg/j

Infection broncho-pulmonaire

-Bactrim cp 480mg, 90mg / sp 200 QSP 10j
02cp (480mg) x 02/j ou 01cp(960mg) x 02/j
/ 01CM/05kg/02prises

-Bisolvan srp 01flc
01càs x 03/j / 01càc x 03/j

OU:

Flumicil st 01Bte
01st x 03/j

Infection génitale chez la femme

Vaginite à *Candida Albicans* :

(Ecoulement blanchâtre, Prurit, Dyspareunie, Mqs rouge)

- Gyno-Pevaryl ovule 01Bte
01ovule /j
- Tergynan cp 01Bte
01cp /j
- Eurax Pde 01Tbe
01app /j
- Saforelle sol 01flc
01Toilette VV/j

Vaginite à *Chlamydia* :

(Ecoulement verdâtre nauséabond, Mqs bulleuse framboise)

- Flagyl ovule 01Bte
01ovule /j
- Polygynax capsule 01Bte
01capsule vaginale /j
- Saforelle sol 01flc
01Toilette VV/j

Vaginite à Gonocoque :

(Ecoulement jaunâtre, Brulures mictionnelles)

- Amoxil gel 500mg QSP 10j
04gel x 02/j
- Polygynax capsule 01Bte
01capsule vaginale /j
- Saforelle sol 01flc
01Toilette VV/j

Vaginite banale:

(Ecoulement blanchâtre abondant)

- Colposeptine cp 01Bte
01cp /j
- Polygynax capsule 01Bte
01capsule vaginale /j
- Saforelle sol 01flc
01Toilette VV/j

Infection urinaire*

-SF urinaires : pollakiuries - brulures urinaires - impériosité.

-BU : suffit.

-ECBU : douleur, fièvre, HU

Grossesse, diabète, femme diabétique

>65ans, récidivante >4/ans et dernière <3mois

Anomalie urologique

-TRT fonctionnel :

Ciprolon cp 250mg QSP 07j (IU basse non cpc)

01cp x 02/j

Si sévère : cp 500mg x 02/j

-Sauf si urétrite (-) : Clamoxyl

-Femme enceinte : Augmentin 03g /j pdt 7-10j + ECBU

Insomnie

-Sulpiride / Dogmatil gel/sol 01Bte/01flc
01gel x 02/j / 01CM /j / 01càc /j

Insomnie occasionnelle

-Phenergan cp 25mg 01Bte
½ cp 15-30min avant le coucher

En 2^{ème} intention :

-Atarax cp 100mg 01Bte
01cp le soir avant le coucher

Sévère :

-Stilnox cp 10mg QSP 02-05j
01cp le soir avant le coucher

Intertrigo inter-orteil

-Pevaryl crème 01flc
01app x 02/j

Intertrigo à Candida Albicans

- Permanganate de potassium sol 01flc
01app x 02/j 01-10^{ème} j)
- Bleu de méthylène sol 01flc
01app x 02/j (01-10^{ème} j)
- Pevaryl crème 01flc
01app x 02/j (11-21^{ème} j)

Intoxication alimentaire*

-Bactrim cp 960mg 01Bte

01cp x 02/j

-Flagyl cp 500mg 01Bte

01cp x 03/j

-*Si diarrhée* : Smecta sac 01Bte

01sac x 03/j

-Doliprane cp 500mg 01Bte

01cp x 03/j

-Dimépra gel 02mg 01Bte

(ralentisseur du transit)

01gel/selle

à répéter si besoin à chaque selle diarrhéique

Kératodermie

(Dermatose sèche, Parakeratose, Eczéma squameuse)

-Anaxeryl Pde 01Tbe
01app /j

Laryngite

(Dyspnée, Cyanose, Voix rauque, Tirage)

-Oxygénothérapie

-HHC

-Bande alcoolisée

-Solupred cp 05, 20mg / Celestene sol 01Bte/01flc
01mg/kg/j / 10Gttes/kg/j pdt 05j

-Amoxil cp 500mg / Susp bvb 250, 125mg QSP 10j
02cp x 02/j / 50mg/kg/j

Leishmaniose

-Glucantime amp inj 05ml=1500mg cure de 20j
20mg/kg/j

$\frac{1}{4}$ dose le 1^{er} j
 $\frac{1}{2}$ dose le 2^{ème} j
La dose complète jsq 20^{ème} j

Leucorrhée blanchâtre = Mycosique*

- Econazole ovule 150 QSP 03j
01ovule/j le soir
- Savon alcalin 01Bte
01toilette x 03/j

Leucorrhée jaunâtre + écoulement urinaire (Gonocoque / Chlamydia / Germes banaux)*

-Augmentin cp 01g QSP 10j
01cp x 02/j

-Polygynax ovule QSP 12j
01ovule /j le soir

-Saforelle solution 01Bte
01toilette x 03/j

Leucorrhée verdâtre nauséabonde = Trichomonas Vaginalis*

- Metronidazole ovule QSP 10j
01ovule/j
- Metronidazole cp 500 QSP 10j
01cp x 02/j
- Savon acide 01Bte
01toilette x 03/j

Lombago aigue*

- Feldene inj N°03
01inj /j en IM
- Divido cp 75 01Bte
01cp x 02/j en milieu des repas
- Codoliprane cp 02Bte
02cp x 03/j
- Ketoprofène patch 01Bte
01patch /j
- Lomac gel 20 01Bte
01gel /j le matin

Maladies thromboemboliques des MI

- Praxilene cp 200mg 01Bte
01cp x 03/j
- Lovenox amp inj 20, 40, 60, 80mg N°05
01mg/kg x 02/j
- Sintrom cp 04mg 01Bte
01cp /j à 08h

Migraine*

-Relpax cp 40 01Bte
01cp /j

-Seglor goutte 01Bte
30gtes x 03/j

-Codoliprane cp 02Bte
02cp x 03/j

-Ibuprofène cp 400 01Bte
01cp x 03/j

Migraine

-Dihydroergotamine cp 01Bte
01cp x 02/j

-Sapofen cp 400mg 01Bte
01cp x 03/j

-Paracétamol cp 500mg 01Bte
01cp x 03/j

Migraine*

-Relpax cp 40 01Bte

01cp /j

-Sanmigran cp 0.5 01Bte

01cp /j (01-03j)

01cp x 02/j (01-06j)

01cp x 03/j (à partir du 07j)

-Panadol-Extra cp 02Bte

02cp x 03/j

-Prof cp 600 01Bte

01cp x 02/j après repas

Migraine ou douleur dentaire atroce*

01g de Prodafalgan en IVD

+/-

Voltarene en IM

MIU (Mort In Utéro)

-Amoxil gel 500mg QSP 10j
02gel x 02/j

-Lovenox amp inj 40 N°05
01inj /j en S/C

-Dakin sol 01flc
01toilette VV/j

-Parlodel cp QSP 15j
1/2 cp /j le 1^{er} j
1/2 cp x 02/j le 2^{ème} j
01cp x 02/j du 3-15^{ème} j

Morsure

En urgence :

-Dexametazone 100mg/j / 0.4mg/kg/j en IVD

A la sortie :

-Solupred cp 20, 05mg 01Bte
01mg/kg/j pdt 05j

-Clarityne cp 10mg / sol 01Bte/01flc
01cp /j ou 01CM x 02/j / 01CM /j

Muguet

-Fungizone cp 250mg / sol 500mg 01Bte/01flc
02cp x 02/j / 50mg/kg/j

Si échec :

-Duflucan gel 50mg 01Bte
03gel /j (monoprise)

Névralgie

- Neurovit cp 250mg 01Bte
01cp x 03/j
- Voltarene sol 01Tbe
01app x 02/j
- Kefentech patch 01app/12h

OAP (Œdème Aigue du Poumon)

- Lasilix amp inj 20mg .. 01amp en IVD .. Renouvelable si besoin
- Oxygénothérapie
- Position demi-assise

Orchiépididymite*

F° – sueurs – frissons – dlr – ↗V – rougeur – chaleur +/- hydro

-Vibramycine LP cp 100mg QSP 21j
01cp x 02/j

-Ciprolon cp 500mg QSP 04j
01cp x 02/j

+/- Gentamycine amp QSP 04j
03mg/kg/j en IM

Ou Bactrim

-Profénid cp 200mg 01Bte
01cp /j le soir pdt 05j

-Efferalgan 05mg 01Bte
01cp x 02/j

ECBU 05j après TRT

Oreillon

-Pénicilline V cp 01MUI / srp 250mg QSP 10j
01cp x 03/j / 50mg/kg/j

-Maxilase srp 01flc
01CM x 03/j

Ou:

Diclofenac suppo 100mg/25mg 01Bte
01suppo le soir

-Paracétamol cp 500mg/srp/supp 01Bte / 01flc
01cp x 03/j / 30mg/kg/j

Ou:

Aspégic st 500/250/100mg 01Bte
01st x 03/j / 50mg/kg/j

Orgelet

- Dacryoserium sol 01flc
01app x 03/j
- Néomycine Pde 01Tbe
01app x 03/j

Orgelet

- Desomedine collyre QSP 07j
02Gttes x 04-06/j
- Fucithalmic 01% gel opht QSP 08j
01Gte dans le sac conjonctival inf matin et soir
- Tobrex collyre QSP 15j
04app /j

Otites

Congestive (simple) :

- Augmentin cp 500mg/srp 125/250mg QSP 10j
02cp x 02/j / 50mg/kg/j
- Maxilase srp 01flc
01càc x 03/j
- Paracétamol cp 500mg/srp/supp 01Bte / 01flc
01cp x 03/j / 30mg/kg/j
- Solupred cp 05, 20mg 01Bte
01mg/kg/j pdt 05j
- Ou: Celestene sol 01flc
10Gttes/kg/j pdt 05j
- Otipax sol (si otalgie)..... 01flc
04Gttes x 03/j

Purulente (suppurée) :

- Ospamox/Augmentin cp 500mg/susp bvb 125/250mg...QSP 10j
02cp x 02/j / 50mg/kg/j
- Otofa sol 01flc
03gttes x 03/j
- Osmotol lotion 01flc
01app x 03/j
- Otipax sol (si otalgie) 01flc
04Gttes x 03/j

Otite Moyenne Aigue (OMI)*

- Augmentin sac 01g QSP 07j
01sac x 02/j
- Codoliprane cp 02Bte
02cp x 03/j
- Otipax goutte auriculaire QSP 07j
(CI: otorrhée) 04gtes x 03/j

Paralysie faciale périphérique*

- Solupred cp 20 QSP 15j
03cp /j le matin pdt 05j
02cp /j le matin pdt 05j
01cp /j le matin pdt 05j
- Acyclovir cp 200..... QSP 07j
01cp x 05/j
- Neuro Vit-B1B6 cp 02Bte
01cp x 03/j
- Calcifediol gouttes 01Bte
03gtes /j
- Diffu-K gel 02bte
01gel x 02/j

Péri onyxis à Candida Albicans :

-Pevaryl crème 01tbe
01app x 02/j

Si échec :

-Duflucan gel 50mg 01Bte
03gel/j (monoprise) pdt 03sem

Perlèche

-Fungizone cp 250mg / sol 500mg 01Bte/01flc
02cp x 02/j / 50mg/kg/j

Si échec :

-Duflucan gel 50mg 01Bte
03gel/j (monoprise)

Pédiculose ou Phtiriasis

-Aphtiria

=> Poudrer le cuir chevelu et le couvrir puis repoudrer le 8^{ème} j

-Shampooing : Hegor, Item, Itax ...

Pédiculose de cuir chevelu

« poux de tête »*

-Malathion lotion 01flc
01app sur cuir chevelu laissez 08h
et après lavage par Shamp doux

Ou :

-Para-Plus lotion 01flc
01app sur cuir chevelu laissez 40min
et après lavage par Shamp doux

Phlébite

-Repos

-Lever interdit

-Lovenox amp inj 20, 40, 0, 80mg N°05
01mg/kg x 02/j

-Relais par les AVK le 3^{ème} j

Piqure d'insecte

En urgence :

200mg d'HHC en IVD

+/-

01amp de Phenergan

A la sortie :

-Clarityne cp 10mg 01Bte
01cp /j le matin

Ou

Telfast cp 180, 120mg 01Bte
01cp /j le matin

+/- Celestene cp 02mg QSP 05j
02cp /j le matin

+/-Amoxicilline cp 01g QSP 07j
01cp x 02/j

Plaie par arme blanche*

Superficielle : ASP – soins locaux

-Oxacilline cp 500mg 01Bte
01cp x 03/j

-Nifluril supp 400mg 01Bte
01supp/j

-Lomac gel 200mg01Bte
02gel x 02/j

-Codoliprane 500mg 01Bte
01cp x 04/j

Plaie infecté*

-Oxacilline inj 01g QSP 10j
01inj /j en IM (après test)

-Oxacilline gel 500mg QSP 10j
01gel x 02/j

-Diclofenac gel 75mg LP
Ou Nifluril supp 700mg 01Bte
01supp/j le soir

-Lomac gel 20mg01Bte
01gel x 02/j

-Paracétamol / Efferalgan / Nalgésic cp 500mg 01Bte
01cp x 03/j

Plaie surinfectée

-Bristopen amp inj 01g N°10
01inj /j en IM

-Bristopen gel 500mg QSP 10j
01gel x 02/j

-Voltarene suppo 100mg/25mg 01Bte
01suppo le soir

Ou:

Nifluril supp700mg/gel 250mg / supp400mg/gel250mg.... 01Bte
01supp x 02/j / 01gel x 03/j / 01suppo x 02/j / 01gel x 02/j

-Changement des pansements 01j/02j

-Ablation du fil le 10^{ème} j

Prostatite*

ECBU – FNS – VS – Echo

TR : ↗ ↗ V de la prostate

Si : rétention, vomissement => signes de gravité

Ciprolon cp 500mg QSP 21j
01cp x 02/j

Ou Céfacet cp 200mg QSP 21j
01cp x 02/j

+Gentamycine QSP 04j
03mg/kg/j en IM

Bactrim fortQSP 6sem
01cp x 02/j

Prurit

-HHC 05mg/kg/j

-Polaramine cp 02mg / sol 01Bte/01flc
01cp x 02/j / 01càc x 02/j

PNA*

T° : 39° - CU(+) - Frissons – Dlr lombaire

TRT ambulatoire :

si femme jeune – ECG normal – absence de signes de septicémie – vomissement – grossesse – diabète - absence d'une pathologie obstructive.

-Ciprofon cp 500mg QSP 15j
01cp x 02/j

-Rocéphine sol inj QSP 05j
01inj /j en IM

-Oroken cp 200mg QSP 04j
01cp x 02/j

Hospitalisation : Cefacidal 01g x 03/j
Genta N° 03

PNA (IDEM Prostatite)

- Oflocet cp 200mg / Oroken srp 40, 100mg QSP 10j
01cp x 02/j / 01dose/kg x 02/j
- Paracétamol cp 500mg/srp/supp 01Bte / 01flc
01cp x 03/j / 30mg/kg/j

NB: Srp 40mg si 06 - 30mois
Srp 100mg si 30mois - 10ans

RGO*

-Alginate (Gaviscon) sac 01Bte
01sac x 03/j après repas

Et/ou

-Antiacide : Hydroxyde d'Aluminium – Hydroxyde de Mg
Maalox bvb 1flc
01càc x 03/j après repas en dehors des autres mdct

Ou

-Azantac cp 300mg 01Bte
(Anti-H2) 01cp /j le soir

Ou

-IPP : (Meilleur)

*Demi-dose Mopral 10mg /j gel 10g pdt 04sem

*Pleine dose Mopral 20mg /j gel 20g pdt 05sem

RGO*

-Alginate (Gaviscon) sac 01Bte
01sac x 02/j

-Topaol cp 01Bte
01sac x 02/j

-Charbon de Bellac cp 01Bte
01cp x 02/j

-TRT des SF OGD et colique + diarrhée A+C :

Bedelix – Smecta – Pepsane (sac pansement digestif)

-Antiémétique :

Motilium cp 10mg 01Bte

Primperan cp/sirop 01Bte

01cp x 02/j 15mn avant les repas

-Gastro-entérite :

Bactrim fort – Ercefuryl - Ciprolon

Rhinite aiguë

-Pivalone-Néomycine sol 01flc
01pulv x 03/j

-Physiol sol01flc
01gtte/Narine x 03/j

-Amoxil => si surinfection

Rhinite allergique saisonnière

-Clarityne cp 10mg / sol 01Bte/01flc
01cp /j ou 01CM x 02/j / 01CM /j

-Rhinaaxia sol 01flc
01pulv/Narine x 04/j

Rhume

- Aspégic cp Effervescent / st 100mg 01Bte
01cp* x 03/j / 50mg/kg/j
- UPSA Vit-C cp Effervescent 01Bte
01cp* x 03/j / ½ cp x 03/j

Rougeole

- Toplexil (avant 30mois) srp 01flc
01càc x 03/j
- Trophires (après 30mois) srp 01flc
 $\frac{1}{2}$ càc x 03/j
- Paralgan cp 500mg / srp 01Bte/01flc
01cp x 03/j / 30mg/kg/j
- Soufrane sol nasale 01flc
02gttes x 03/j
- Si otite associée* => Augmentin
- Si bronchite associée* => Clamoxyl

Scarlatine

-Oracilline cp 01MUI / srp 250mg QSP 10j
01cp x 03/j / 50mg/kg/j

Sciastique*

- Diclofenac inj 75 N°03
01inj /j en IM
- Naproxene cp 550 QSP 07j
01cp x 02/j après repas
- Codoliprane cp 02Bte
01cp x 03/j
- Ketoprofène patch 01Bte
01patch /j
- Esoprotion gel 30 01Bte
01gel /j le matin

Sinusite maxillaire aigue*

- Amoxil gel 500mg – sirop 250, 125mg QSP 10j
02gel x 02/j ou 50mg/kg/j
- Paralgan cp 500mg / sirop 01Bte
01cp x 03/j ou 50mg/kg/j
- Rhumafed cp - sirop 01bte / 01flc
01cp x 03/j ou 01càc x 03/j

Suite de couche*

-Céfacet cp 01g QSP 10j
01cp x 03/j

-Cerazette cp 75mg QSP 03mois
01cp/j à partir du 21^{ème} j du PP

-Tardyferon 01Bte
01cp /j
Ou Fumafer 02cp /j

-Lovenox 0.4cc inj N°06
01inj /j en s/c

-Saforelle sol 01 flc
Ou Hydralin apaisa..... 01 flc
01app x 03/j

Surinfection bactérienne d'une bronchite aiguë virale

- Amoxil gel 500mg – sirop 250, 125mg QSP 10j
02gel x 02/j ou 50mg/kg/j
- Paralgan cp 500mg / sirop 01Bte
01cp x 03/j ou 30mg/kg/j
- Muxol sol 01flc
01càààs x 3/j / 01càc x 03/j

Teigne du cuir chevelu*

-Griséofulvine cp 500 QSP 02mois
01cp x 02/j

-Ketoconazole crème QSP 01mois
01app x 02/j

-Ketoconazole Shampo QSP 01mois
02x /sem

Torticolis spasmodiques

-Mydocalm cp 150mg 01Bte
01cp /j le soir (jsq x 03/j)

Toux

Sèche :

-Toplexil gel / srp 01Bte/01flc
02gel/02càc x 03/j / 01càc x 03/j

Productive :

-Rhinathiol adulte / Rhinathiol enfant srp 01flc
01càc x 03/j / 01càs

-Ketotifene / Allerfene srp 01flc
01CM x 02/j / ½ CM x 02/j

Trachome

(Larmoiement, Photophobie, Sensation de brûlure et de corps étranger, Hypersécrétion)

- Chloramphénicol sol 01flc
01-08 Gttes /j
- Néomycine Pde 01Tbe
01app x 02/j

Traumatisme thoracique*

-Palpation – Auscultation – Radio-thorax.

-Si fracture d'une cote :

Elastoplaste 01app/05j
Efferalgan codéine 01cp x 03/j
Voltarene supp 100mg 01supp/j
/cp Lp 75 mg 01cp/j

-Si fracture de 2 cotes :

Volet costal risque de PNO, surtout emphysème sous cutanée.

Ulcère*

-Clamoxyl cp 01gQSP 07j

01cp x 03/j

-Flagyl cp 500mgQSP 07j

01cp x 03/j

-Proton gel 20mg 07sem

01gel x 02/j pdt 01sem puis 01gel /j

Ulcère Gastroduodénal (UGD)*

-Lomac gel 20mg QSP 01mois

01gel x 02/j (07j)

01gel /j (23j)

-Flagyl cp 500mg QSP 07j

01cp x 03/j

-Amoxicilline cp 01g QSP 07j

01cp x 02/j

-Pepsane sachet 02Bte

02sachets x 03/j avant les repas

-Nobac sirop 01Bte

01càc x 03/j après repas

Ulcère Gastroduodénal (UGD)*

*Antiulcéreux :

- IPP double dose : Oméprazole 02mg (matin et soir)
- Proton / Mopral gel 200mg 01bte
02gel /j
- Anti histaminique H2 = Anti sécrétoire
Ramitidine : Azantac cp 300mg 01Bte
01cp /j le soir

*bi ATB : QSP 07j

- Clarythromycine
Macrolide : Zeclar cp 500mg 01cp x 02/j
- Amoxicilline
Clamoxyl cp 01g 01cp x 02/j

Si allergie :

- Metronidazole
Flagyl cp 500mg 01cp x 03/j

*Anti ulcéreux : poursuite à simple dose.

UD => 07j / à 03sem si cpc + AINS

UG => 04-06sem dans tous les cas + endoscopie de contrôle

Urétrite*

-Oroken cp 200mg 01Bte
01cp prise unique pdt 07j

-Vibramycine cp 100mg QSP 07j
01cp x 02/j

Ou Zithromax cp 200mg QSP 07j
01cp prise unique

-ECBU : 48h . 20j après TRT

Urticaire

-Zyrtec cp / sol 01Bte/01flc
01cp /j / 01Gttes /j

Varicocèle*

-Dalfon cp 500mg QSP 02mois
01cp x 02/j

Varicelle*

-Keforal cp 500 QSP 10j
02cp x 02/j

-Hexomedine solution 03flc
01app x 03/j

-Loratadine cp 10 01Bte
01cp /j le soir

-Doliprane cp 01g 02Bte
01cp x 03/j

Verrues

Vericide-Coricide / Duofilm / Verrufilm / Verrulyse-Methionine

Pde 01Tbe

01app x 02/j

Vers dans les selles

-Fluvermal cp, srp 100mg 01Bte/01flc

Oxyurose => 01CM prise unique le 1^{er} j, 02^{ème} prise le 15^{ème} j

Ascaridiase => 01cp/01CM x 02/j pdt 03jrs (CI: 15mois)

Vertige

En urgence :

-01amp Tanganil inj 500mg/ml

A la sortie :

-Tanakan sol bvb 40mg/ml 01flc
01dose x 03/j

Ou :

-Tanganil cp 500mg 01Bte
01cp x 03/j

Ou :

-Serc cp 08mg 01Bte
01cp x 03/j

Si vomissement :

-Primperan cp 10mg 01Bte
01cp x 03/j ¼ h avant les repas

=> *Demander l'avis de l'ORL*

Vomissement

-Primperan cp 10mg/srp 01Bte/01flc
01cp x 03/j / 01càc x 03/j

Ou :

-Motilium srp 01flc
01càc x 03/j 15-30min avant ls repas

CONTACTEZ-NOUS !



BOUTELIS BILAL

C'est juste une collection des ordonnances types correspondant à des situations cliniques les plus courantes, rédigées de façon précise, avec les posologies ..

Elles constituent un aide-mémoire précieux pour les internes, les jeunes médecins et tous ceux qui sont amenés à prescrire, pour leur offrir une aide pratique immédiate ..

