

Angine Erythémateuse - palatine

Augmentin

80mg/kg/j

SSP 10g

→ Enfant < 30kg
- Augmentin sup NRSE
01 sup 3x/j

SSP 10g

→ Enfant > 30kg
Augmentin sachet
01 sachet 3x/j

SSP 10g

25 - 35kg = sachet 500mg

> 35kg = sachet 01g

→ si allergie: { Josacelne }
ou
réelative

05 g
02 x 1 g

ou drop
ou ddp

02 x 1 g

0 - 5 kg = 125 mg
5 - 20 kg = 250 mg
> 20 kg = 500 mg

Doliprane.

↳ Enfant:

Doliprane supp

05 g

ou suppo / 6h si fièvre

< 8 kg = 100 mg
8 - 12 kg = 150 mg
13 - 20 kg = 200 mg
> 20 kg = 300 mg

↳ grand Enfant,

Doliprone up 500mg

or up 16h if fièvre

(21/6)

Angine Érythémateuse

① Clamoxyl

50mg/kg/j

esp 10g

max=2g/j

Enfant

Sirap

Acām

0 - 5 kg

125 mg

02 x 1j

5 - 10 kg

250 mg

02 x 1j

10 - 15 kg

250 mg

03 x 1j

15 - 20 kg

500 mg

02 x 1j

> 20 kg

500 mg

03 x 1j

0kg

5kg

10kg

15kg

20kg

125mg

250mg

250mg

500mg

500mg

3

→ pour le grand Enfant =

↳ Chamoxyl cp 01g ——— (15P 10g)
01 cp 02 x 1g

2 Doliprane

(15P 10g)

15 mg / Kg / j

↳ Enfant

01 suppo 16h si fièvre

< 8 Kg = 100 mg

8 - 12 Kg = 150 mg

13 - 20 Kg = 200 mg

≥ 20 Kg = 300 mg

↳ grand Enfant

↳ Doliprane cp 500mg
01 cp 16h si fièvre

(15P 10g)

2) Si allergie à l'amoxicilline


Tosacine. sirop _____ ⁰⁵⁰
~~050~~ 70

0.22p 0.2 x 1g

0 - 5 kg = 125 mg

5 - 20 kg = 250 mg

> 20 kg = 500 mg



Fiebre

↳ Enfant:

Doliprone: suppo ————— as bte
as suppo 16 h 50° figure

2 kg . moving

$$8 - 12 \text{ kg} = 150 \text{ mg}$$
$$13 - 20 \text{ kg} = 200 \text{ mg}$$
$$> 20 \text{ kg} = 300 \text{ mg}$$

A hand-drawn number line on lined paper. The line has arrows at both ends. Tick marks are placed along the line, with labels written above and below them. Above the line, the labels are 'B', 'P', 'P', 'P', 'P'. Below the line, the labels are 'B', 'P', 'P', 'P', 'P'. The labels are written in a cursive, handwritten style.

↳ Si j présente une diarrhée.

Efferalgan sirup (E) ————— (330g)

or dep 16 h en fièvre

② D. liprane sirop 16 h so fièvre (ante)

drop
add p 16 h 50° fievre

↳ le grand Enfant.

Doleprane ^{ou sachet} (cp) 500mg ——— (os lste)
os cp 16h si fièvre

fièvre + Détresse Respiratoire

⇒ TTX (maternité)

{ Si fièvre $> 40^{\circ}\text{C}$ ajouter une supp }

Algifen sirop ——— (os flc)
os ddp 16h

CI < 6 mois

Toux

Prosperan	sirap	03 flc
01 càc	02 x 15	NRS
01 càc	03 x 15	enfant
02 càc	03 x 15	grand (E)

ou

Toux Rid	sirap	03 flc
01 càc	02 x 15	NRS
01 càc	03 x 15	(E)
02 càc	03 x 15	grand (E)

Maxilase sirop (Idem)

une Toux < 6 mois

il faut le respect c'est un
moyen de défense

Allergie Cutanée (Urticaire)

surdiés de la peau
en plaie.

PDF

injection

AHC

en IM

5 mg / kg

(max = 100 mg)

* si pas de réponse
renouveler

* si pas de réponse
adrénaline.

surveillance 1 h
si ↓ rougeur et recherches
Effets II aires

TRT de Sortie

Anti-histaminique:

- < 1 an Primalon sirop asplc
- 1 - 4 ans Histagan "
- > 4 ans Polorexamine "
- ou Loratidine "

01 cāc 02 x 1/2

↳ pr le grand Enfant =

(02 cāc x 2 1/2)

(ou) pour grand Enfant =

Telfast = cp 180 mg ————— (05 x 1)
01 cp 1/2 le soir

+
Solupred cp 20mg ————— (05 x 1)
02 cp 1/2 le matin à jeun

Crise d'asthme

02 séances d'aérosol

0,03 cc/kg de Salbutamol

dilué dans 0,1 cc de SSI 9%

0,03 dose
min

0,1 cc dose max
> 30 kg

Si pas d'amélioration

+1 - injecté de Solumédrol
0,2 mg/kg

en IM + 02 séances aérosol

Max = 06 séances d'aérosol

TRT de Sortie

① Ventoline Spray ——— QSP 75
(salbutamol)

02 bouffées 03 x 15

② Celestone gouttes ——— QSP 05

10 gouttes / kg

le matin après
repas

(du)

ou 5mg

Solu pred cp 20mg ——— QSP 5

(1mg/kg) calcule le nbre de CP
le matin après repas

+/- clamoxyl ——— QSP 08

Aphthae buccales

① Fungizone solut ————— (os ph)
os app 03 x 15

H. ② Daktarin gel ————— (os ph)
os App 02 x 15

Chalazia

شقرة

① Rifampicine collyre ————— (os ble)
os gouttes / oeil 02 x 15

② Fucithalmique collyre ————— (os ble)
os gtttes / oeil 05 x 15

③ Lavage = SSI

Conjonctivite

↳ Si écoulement jaunâtre =

① Rifamycine Collyre ————— (01103)
ou gouttes 1 oeil ou x 1 g

② Rifamycine Pommade ————— (01106)
ou App le soir

↳ Si écoulement clair = (Véral)

Vitabocet collyre ————— (01106)
ou gouttes 1 oeil ou x 1 g

Douleurs Abdominales

① Spasfon: _____ (01 boîte)

↳ le petit enfant:

Spasfon: lyoc _____ (01 boîte)
01 lyoc 03 x 15

↳ le grand enfant:

Spasfon: cp 80mg _____ (01 boîte)
01 cp 03 x 15

② Dêbriolat: _____ (01 boîte)

↳ le petit enfant:

• Dêbriolat sirop (E) _____ (01 flac)
01 cām 03 x 15

le grand enfant

Débridat cp 500mg

(onkte)

01 cp 03 x 15

1-3 Bedillex : Sachet

(onkte)

01 sachet

03 x 15

Douleur de la FID

avis CCI

Infection Urinaire

- Fièvre inexpliquée
- Polyurie
- Brûlures mictionnelles
- DLR lombaire ou FID

Lobstix

si infect urinaire = Nitre (+)
Leucocyturie (+)

Si (-)

TRT sympto

IU

Orphen 500mg
ou 1000mg
0-2 ans 10mg
2 ans 40mg

Si (+)

Faire ECBU
+
Antibiogramme
Prise

+ Soigner lombalgie
avec spafon + Doliprane

Labstix

Prot (+)

et sang + + +



Colique Néphrétique

Si Patient diabétique avec IU

ne pas attendre l'antibiogramme

TRT d'emblée avec

Ciproflox cp 0.5 cp / j

Colique néphrétique

En urgence :

01 injection de Voltarène en IM

+ 1- spasfon en IV

(AINS) à la sortie

① Voltrea cp 50mg ————
01 cp 12 le soir

(88/57)

② Omeprazole cp 20mg ————
01 cp 12 le matin à jeun

(coste)

Ne jamais associer
ATB avec AINS $\Rightarrow$
risque de cellulite

→ On peut donner Pour celique
Néphrotique

Naflole suppo _____ 0.105g
01 suppo 02 x 1/2

NRS = suppo 200mg
(E) = suppo 400mg

Vomissements

↳ Enfant: (Nne - NRS)

Vomitelb sirop ————— (osfle)

01 ddp 03x1g

↳ > 2 ans:

Dompéridone sirop ————— (osfle)

01 ddp 03x1g

+ RHD

+ adulte = boire bep d'eau + +

+ Enfant = - SRO sachet (saïdal)

—————> 01 bte

01 sachet (saïdal) dans 01 l

d'eau de robinet (le reste des marque
selon la notice) = eau bouillie

refroidie (la Boutelle + Pent 24h

→ 50 cc
de cas après chaque
Vomissement

Diarrhée

① Tlorfan : sachet 10mg ————— (01h)
01 sachet 03 x 1g (> 3 ans)
1/2 sachet 03 x 1g (< 3 ans)

② Smecta : sachet ————— (01h)
1/2 sachet 03 x 1g (E)
01 sachet 03 x 1g (A) < 12 ans

③ Floryl sirop ————— (08h)
(ATC) 30mg/5ml
03 à 04 02 x 1g
(si présence de glaires et fièvre)

④ SRO : sachet ————— (01h)
01 sachet (oral) dans 01 L
d'eau bouillie et refroidie
50 cc après chaque selle < 2 ans

100 ca

ca > 2 ans

Primeron ? qd est ce que 'ge
le donne ?

Bactrim ?

Laryngite

abaisse
langue CI

- dyspnée inspiratoire
- râles sibilants
- roncote de Voix

légère à
modérée = roncote de la voix

C'est estime

gouttes

SS105

10 gouttes 1kg le matin
(à jeun ou après repas)

Sévére

- roncote de la Voix
- stridor laryngé
- détresse respiratoire

01 séance de Cochetail laryngée

01 cc d'Adrénaline

02 cc de dexaméthasone

03 cc de SSI

} sur
20
min

Injection de + dexaméthasone

$0.5 \times \text{poids en IM}$

confirmés



évalué après 1h $\longrightarrow$ à répéter
si nécessaire

$\hookrightarrow$ On peut donner au lieu du Cocktail =

Solumedrol injection en IM

(1 mg / kg)



TRT Sortie

Solupred. cp 5mg $\longrightarrow$ 88p05j

(1 mg / kg) = une seul prise le

calcul cp matin

Eruption Cutanée = Virose

= rougeole, rubéole, varicelle

① Histagan : sirop _____ (01 flc)

01 cà m

02 x 1

ou le

soir

② Hexamédine solut _____ (01 bte)

01 App

03 x 1

③ Paracétamol :

Si surinfection à

Strepto

Keforal sirop (E) _____ (01 flc)

01 ddp

03 x 1

Hexamédine solut _____ (01 flc)

01 App

05 x 1

Zeta crème _____ (01 tube)

01 App

02 x 1

Constipation:

① Diluted syrup _____ (only for)

0.5 dd p

0.3 x 1/2

→ If (E) > 12 ans =

Trimethoprim cp _____ (only for)

0.1 cp

0.2 x 1/2

For low budget

② Diphthalac syrup _____ 4g (only for)

< 10 ans

1 cc

0.1 x 1/2

1 - 6 ans

1 cc

0.2 x 1/2

> 6 ans

1 cc

0.3 x 1/2

③ Glycerine suppo _____ (only for)

0.1 - 0.2 suppo 1/2

Les Oreillons

d'O = virale Pas de TRT
juste un TRT sympto

→ Uxeril suppo 400mg ——— (note)
ou suppo le soir

Poussée dentaire

- 6 mois — 02 incisives inf.
- 9 mois — 02 " sup
- 14 mois — les molaires
- 18 mois — les canines

① Dodo gel

01 App
gel buccal

02 x 1 j

(01 bte)

② Dolodent

solu gingivale
01 App

03 x 1 j

(01 bte)

Confirmer

Ingestion Caustique

- TLT

- FOGD dans les 24h
- arrêt d'alimentation oral

Appétit (Anorexie)

Appétito sirop _____ as p/c

0.1 c à c	0.3 x 1 $\frac{1}{2}$	< 3 ans
0.2 c à c	0.3 x 1 $\frac{1}{2}$	3 - 6 ans
0.3 c à c	0.3 x 1 $\frac{1}{2}$	> 6 ans.

Anémie ferriprive

slu avant
repas

Ferrum gouttes _____ 1^{er} 03 mois

04 gouttes / kg → le 01 mois

02 goutte / kg → 2^e, 3^e, mois

Convulsion

↳ (Nme < 1 mois) =

Gardinal en Perfusion
(phénobarbital)

200 mg/kg dilué ds 60 cc
de SSI en IVL pdt 20 min

↳ (NRS) (E) (A)

> 1 mois

Valium (Diazepam) = en IV
poids / 2 = dilué ds un
33 cc de SSI

(sans dépasser 30 mg max)

à répéter 2 à 3 fois / j pas plus +++

Convulsion fébrile < 3 mois $\Rightarrow$ PL

on a pas besoin de faire fond d'œil comme
pour adulte.