


***Définition de l'officine :**

Est un local où les médicaments sont conservés, préparés et servis par le pharmacien (assistant de pharmacien) .

***prescription de l'officine :**

Plaques lumineuses 
L'enseigne
Le caducée

***Signification des couleurs :**

- vert —→ tous qui est bio
- blanc —→ propreté
- rouge —→ le sang

***subdivision de l'officine :**

Surface $\geq 50m^2$
Distance $\geq 200 m$

1 – salle de vente :

- comptoirs
- Etagères

2 – salle de stock :

- réfrigérateur : contient tous produit sensible à la chaleur (insuline – vaccin – collyre ...)
- Armoire fermante : contient des produits à l'abri des gens (psychotropes , neurologique)
- paillasse : sert à la préparation des produits

3 – sanitaire :

***Le rôle de l'assistant de pharmacien :**

Il participe à :

- l'accueil des malades et assure le bon comportement.
- identification de la prescription médicale (ordonnance).
- délivrance des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
- implantation des produits dans les linéaires.
- conseil et orientation des malades.

***La prescription médicale (ordonnance) :**

- Est un document permettant au malade de connaître son traitement et au pharmacien de lui servir.

- elle est écrite par le médecin (généraliste – spécialiste – dentiste – sage-femme) après l'examen de malade.

- elle doit comporter :

1 – la date de soin (ne dépasse pas 48 h).

- 2 – renseignement de médecin (nom, prénom, qualité, adresse, N° tel).
- 3 – renseignement de malade (nom, prénom, Age et poids).
- 4 – Dénomination de médicament, forme, dosage, quantité (QSP) et posologie.
- 5 – cachet et signature de médecin.

*** Dénomination de médicament :**

- 1 – DCI : c'est le nom admis pour tous les pays

Détermination **C**himique **I**nternational

Dénomination **C**ommune **I**nternational

- 2 – NC : c'est le nom sous lequel une firme pharmaceutique vend ces médicaments

Nom **C**ommercial

*** Abréviation des formes médicamenteuses :**

- Comprimé	→	cp – comp	boîte	→	bt - bte
à avaler – à croquer – à sucer – dispersible – effervescente – lyoc (sublinguale)					
- gélule	→	gel			
- sirop	→	sp – srp	flacon	→	fl – flc
* cuillère à mesure	→		c à m / cm		(5ml)
* cuillère à café	→		c à c		(5ml)
* cuillère à soupe	→		c à s		(10 - 15ml)
* pipette	→		1 dose de poids	→	1 ddp
* Dosette	→		2.5ml – 5ml – 7.5ml – 10ml – 15ml		
- Sachet	→	st – sac – scht – s			
- Suppositoire	→	suppo (voie rectale)			
- Ovule	→	ov (voie vaginale)			
- Goutte	→	gtt			
- Ampoule buvable	→	Amp – Ab			
- Pommade	→	pmd – pd – pde	} tube → tube Application locale → App		
- Gel	→	gel			
- Crème	→	crème			
- Patch	→	patch			
- Collyre	→	collyre			
- Lotion	→	lotion			
- Spray	Nasal	→	pulverisation	→	pul
	Buccal	→	bouffet	→	bouffet

- Injectable → inj N° 06
- * intra musculaire → 1 inj en IM
- * intra veineuse → 1 inj en IV
- * Sous cutané → 1 inj en S/C

Les Anti biotiques

1/betalactamine :(famille)

DCI	Indication	Forme / dosage / posologie	
1 – Amoxicilline :	- infection respiratoire (sphère ORL otite - sinusite - pharyngite - angine - toux grasse) - Absès dentaire - poste opératoire - infection digestif (ulcère d'estomac)	500mg	Enf + 12
NC		- cp < 1g	Ad
-clamoxyl -amoxal		1 cp 2 — 3x/j	
- penamox -biopamox		125mg	NRS (0-2 ans)
- amoxypen		- sp < 250mg	Enf (2-6 ans)
- saifoxyl		500mg	Enf (6-12 ans)
- amodex.Gé		1 cm 2 — 3x/j	
- lamoxyl		500mg	Enf + 12
- amoximex		- inj < 1g	Ad
		1 inj en IM/J	
2 – Ampicilline	- infection respiratoire	- gel 500 mg	Enf + 12
NC	- poste opératoire - infection urogénital	1 gel 2 — 3x/j	
- Totapen		- sp 250mg	Enf (2-6 ans)
- Ampinax		1 cm — 3x/j	
- Ampal		- inj 1g	Ad
- Ampilline		1 inj en IM/J	
3 – Amoxicilline / Acide clavulanique	- infection respiratoire Aigue (bronchite - sphère ORL - Angine)	500mg	Enf + 12
NC	- Absès dentaire Aigue - infection urinaire - infection cutanée bénigne	- cp < 1g	Ad
- Augmentin		1 cp 2 — 3x/j	
- Klavox - clavodar		500 mg	Enf
- Bioclav - Amoclan 8:1		- st < 1 g	Ad
- Amoclan Bid		1 sac 2 — 3x/j	
- Amoclan fort		NRS	
- clavodex		- sp < Enf	
		1 ddp 2 — 3x/j	
4 – Oxacilline	- infection cutané (plaie - abcès cutané)	Enf + 12	1 gel 2 — 3x/j
NC		- gel 500	Ad 2 gel 2 — 3x/j
		500mg	Enf 1 inj IM/j
		- inj < 1g	Ad 1 inj IM/J

5 – Phenoxy methyl pénicilline	- Angine	- cp $\left\{ \begin{array}{l} 1000000 \text{ ui Enf + 12} \\ 1500000 \text{ ui ad} \end{array} \right\}$ } 1 cp 2x/j - sp $\left\{ \begin{array}{l} 250000 \text{ ui enf} \\ 400000 \text{ ui enf} \end{array} \right\}$ } 1 cm 2x/j - inj $\left\{ \begin{array}{l} 500000 \text{ ui Enf} \\ 1000000 \text{ ui Ad} \end{array} \right\}$ } 1 inj en IM/j
NC		
- Ospen – Orapen – Penival - gectapen		
6 – Benzathine pénicilline	- Angine (effet retard)	- inj $\left\{ \begin{array}{l} 600000 \text{ ui enf} \\ 1200000 \text{ ui Ad} \end{array} \right\}$
NC		
- Extencilline – Retarcilline - retarpen - retarmex		1 inj en IM / 21 jrs

(ui --- unité internationale)

2 / Céphalosporine (famille)

DCI	Indication	Forme / dosage / posologie
1 – Céfalexine	- infection respiratoire (sphère ORL – Bronchite – Angine) - poste opératoire - infection urogénital - infection dermatologique	- cp $\left\{ \begin{array}{l} 500 \text{ mg Enf + 12} \\ 1 \text{ g Ad} \end{array} \right\}$ } 1 cp 2-3/j - sp $\left\{ \begin{array}{l} 125 \text{ mg NRS} \\ 250 \text{ mg enf} \end{array} \right\}$ } 1 cm 2-3x/j
NC		
- Keforel – Lexin – unlexin - lexinal – Ospexin – Cephalax - Cefacet – Cephrad – effixante		
2 – Cefazoline	- infection respiratoire (sphère ORL – Bronchite – Angine) - poste opératoire - infection urogénital - infection dermatologique	- inj 1 g — Ad 1 inj en IM/j
NC		
- intrazoline - cefazal - zepelin		
3 – Cefaclor	- infection respiratoire (Angine – Bronchite) - infection urinaire	- cp 500mg — Ad 1 cp 2 – 3x/j - sp $\left\{ \begin{array}{l} 125 \text{ mg NRS} \\ 250 \text{ mg enf} \end{array} \right\}$ } 1 cm 2x/j
NC		
- Tabiclor – Dicel - Cloracef		
4 – Cefuroxime	- infection respiratoire (Angine – Bronchite) - infection urinaire	- cp $\left\{ \begin{array}{l} 250 \text{ mg} \\ \text{Ad} \end{array} \right\}$ } 1 cp 2x/j - Sp 125mg NRS 1ddp 2x/j
NC		
Zinnat – zinoximor - daroxim		
5 – Cefixime	- infection respiratoire (Angine – Bronchite) - infection urinaire	- cp $\left\{ \begin{array}{l} 200 \text{ mg} \\ 400 \text{ mg} \end{array} \right\}$ } Ad 1cp 2x/j - sp $\left\{ \begin{array}{l} 40 \text{ mg NRS} \\ 100 \text{ mg enf} \end{array} \right\}$ } 1 ddp 2x/j
NC		
- Oroken - orokal - Winex - Betexime		

3 / Macrolide : (famille)

DCI	Indication	Forme / dosage / posologie
1 – Spiramycine	- Abscès dentaire - Angine	$\left. \begin{array}{l} 1500000 \text{ ui Enf + 12} \\ - \text{cp} \left\{ \begin{array}{l} 3000000 \text{ ui Ad} \end{array} \right\} \end{array} \right\} 1 \text{ cp } 2 \times / \text{j}$ - sp 0.375 mlui enf 1 cm 2x/j
NC		
- Rovamycine – Spiracare - Spiramynal – Spira - Rovadal		
2 – Spiramycine / Metronidazole	- infection de la cavité buccale (Abscès dentaire – Gencive – stomatite)	$\left. \begin{array}{l} 750000 \text{ ui Enf + 12} \\ - \text{cp} \left\{ \begin{array}{l} 1500000 \text{ ui Ad} \end{array} \right\} \end{array} \right\} 1 \text{ cp } 2 \times / \text{j}$
NC		
- Orogyl – Bi.orogyl - spiradent – Bi.spiradent - rodogyl – Bi.rodogyl		
3 – Azithromycine	- infection respiratoire (Angine – Bronchite)	$\left. \begin{array}{l} 250 \text{ mg bt} = 06 \text{ cp enf} \\ - \text{cp} \left\{ \begin{array}{l} 500 \text{ mg bt} = 03 \text{ cp Ad} \end{array} \right\} \end{array} \right\}$ 1 cp/j pdt 03 jrs A distance des repas - sp 200mg $\left\{ \begin{array}{l} \text{Nrs } 2.5 \text{ ml/j} \\ \text{Enf } 5 \text{ ml/j} \end{array} \right\} \text{ pdt } 03 \text{ jrs}$
NC		
- Zomax – Zithromax - Azithral – Zotrix - Azimycine – binozyl		
4 – Roxithromycine	- infection respiratoire (pneumopathie)	- cp 150 mg AD 1 cp 2x/j Avant les repas
NC		
- Roxid – Roxamed		
5 – Josamycine	- infection respiratoire	- cp 500 mg – Ad 1 cp 2x/j - sp $\left\{ \begin{array}{l} 125 \text{ mg NRS} \\ 250 \text{ mg enf} \\ 500 \text{ mg enf} \end{array} \right\} 1 \text{ ddp } 2 \times / \text{j}$
NC		
- Josneine		
6 – Clarithromycine	- infection respiratoire (sphère ORL – Bronchite – Angine – pneumopathie) - Abscès dentaire - infection dermatologique - infection digestif (ulcère d'estomac)	$\left. \begin{array}{l} 250 \text{ mg} \\ - \text{cp} \left\{ \begin{array}{l} 500 \text{ mg} \end{array} \right\} \end{array} \right\} \text{ Ad } 1 \text{ cp } 2 \times / \text{j}$ $\left. \begin{array}{l} 125 \text{ mg NRS} \\ - \text{sp} \left\{ \begin{array}{l} 250 \text{ mg enf} \end{array} \right\} \end{array} \right\} 1 \text{ ddp } 2 \times / \text{j}$
NC		
- Clarit – Zeclar - Claridar		

4 / Aminocide : (famille)

1 – Gentamycine (DCI) :

- infection urogénital
- Abscès dentaire
- poste opératoire
- infection rénal

forme / dosage / posologie

inj $\left\{ \begin{array}{l} 40 \text{ mg enf} \\ 80 \text{ mg Ad} \end{array} \right\} \rightarrow 1 \text{ inj en IM/j}$

NC

- Gentel
- Epigent
- Gentaxyn
- Gentaline

5 / Quinolone : (famille)

1 – ciprofloxacine(DCI) :

- infection urogénital
- poste opératoire
- pied diabétique

forme / dosage / posologie

cp $\left\{ \begin{array}{l} 250 \text{ mg} \\ 500 \text{ mg} \\ 750 \text{ mg} \end{array} \right\} \rightarrow \text{Selon le cas}$

NC

- Ciprolon - ciprotek
- Cipro- ciprofloxacil
- Cipromax
- Ciproval – Quinox

6 / Tetracycline (famille) : ➡ infection légère de la peau

1 – Doxycycline (DCI) :

forme / dosage / posologie

cp 100 mg - Ad

NC

- Dotur -Doxyline
- Vibramycine N

2 – Oxvtetracycline (DCI) :

forme / dosage / posologie

cp 250 mg - Ad

NC

- Oxymed

3 – Emycycline (DCI) :

forme / dosage / posologie

cp 150 mg - Ad

NC

- Tetralysal

7 / Autre :

1 – Acide fusidique (DCI) :

- infection cutané compliqué
(plais – abcès –pied diabétique)

forme / dosage / posologie

- cp 250 mg - Ad 2cp 2 – 3x/j
- sp 250 mg - enf 1cm 2 – 3x/j
- pd 1 app le soir

NC

- Fucidine - Zeta
- Fucidane
- Acifudal

2 – Nitroxoline (DCI) :

- infection urinaire

forme / dosage / posologie

Cp $\left\{ \begin{array}{l} 50 \text{ mg} \\ 100 \text{ mg} \end{array} \right\} \rightarrow \text{Ad } 2\text{cp } 2 – 3\text{x/j}$

NC

- Nibiol
- Nabyol forte
- Naxolin

Les Antalgiques

Sont des médicaments destinés à réduire la douleur d'un patient.

-Antalgique :

Réduire la douleur




Paracétamol et ses dérivés

-Analgésique :

supprimé la sensibilité à la douleur



morphine et ses dérivés



1 – Paracétamol (DCI) :

Douleurs et fièvre (maux de tête – douleur dentaire – état grippal – courbature)

forme / dosage / posologie :

- cp	500 mg enf + 8 ans 1 g Ad	} 1 cp / 6 h ou / 8 h	{ + 4x/j → Toxicité hépatique }		
- suppo	100 mg 3 - 8 kg 150 mg 8 - 12 kg 200 mg 12 - 16 kg 300 mg 15 - 24 kg		NC		
- st	100mg 6 - 8kg 150 mg 8 - 12kg 200 mg 12 - 16 kg 300 mg 15 - 24 kg 500 mg +27 kg (+8ans)				
- sp	Nrs Enf			} 1 ddp / 6h ou 8h	

2 – paracetamol + acide ascorbique (DCI) :

Douleurs et fièvre

forme / dosage / posologie :

cp enf + 8 ans et ad 1 cp / 6h ou / 8h

NC

effergalgen vit c

3 – Tramadol (DCI) :

Douleur en traumatologie et rhumatologie

forme / dosage / posologie :

- gel $\left\{ \begin{array}{l} 50 \text{ mg} \\ 100 \text{ mg} \end{array} \right\}$ ad 1 cp 2 – 3x/j

- inj Ad à la demande

NC

- Dolex – Supramadol

- Duofem

4 – Paracétamol / Tramadol (DCI) :

Douleur en traumatologie et rhumatologie

forme / dosage / posologie :

- cp — ad 1 cp 2 – 3x/j

NC

- Xamadol - Di dolex

- Dolokil – extramadol

- Dolmatol – Trapal – planadix advance.

5 – paracétamol / caféine (DCI) :

- douleur dentaire

- Douleur en traumatologie et rhumatologie

- Migraine

forme / dosage / posologie :

- cp — Ad 1 cp 2 – 3x/j

NC

- Panadol extra - pacet extra

- planadix extra

6 – paracétamol / codéine (DCI) :

- douleur dentaire

- Douleur en traumatologie et rhumatologie

- Migraine

forme / dosage / posologie :

- cp — Ad 1 cp 2 – 3x/j

NC

- Codoliprane – Coparamol – Coparalgan

- Dafalgan codeine

Contre-indication :

Asthme – Cardiopathie – Femme enceinte



Les Anti Pyrétiques

Sont des médicaments dont le but est de lutter contre le symptôme de la fièvre (38.5°)

Effets secondaires :

- 1- Trouble digestif (ulcère d'estomac)
- 2- Risque hémorragique
- 3- Toxicité rénale

1 - Acide Acétyl Salicyllique (Dci) :



- inj 500 mg → Ad 1 inj en IM au moment de la fièvre

N.C :

Aspégic – Catalgine - Aspirine Cardio – Aspirine biotique – Aspegal.....

Les anti inflammatoires:

1- Ains :

DCI	Indication	Forme- dosage-posologie
1/ Diclofenac de sodium :	- douleur dentaire	25mg enf 50 mg 75 mg 100 mg - Cp AD 12.5mg nrs 25 mg enf 100 mgAd - Suppo 75 mg Ad - Inj 1cp 2x/j 1cp/6h - /8h 1cp 1 a 2x/j 1cp/j 1supp le soi 1 inj en IM/J lapp le soir
(N.C)	- douleur en traumatologie et Rhumatologie	
- Clofenal – biofenac – xinaac – voltamex – votrex- flovenac- fenaquene- déclofar- diclamid- clogel- voltarene emulgel- tabiflex cool	- douleur de cycle menstruel	
2/ Naproxène sodique :	- douleur dentaire	275 mg 550 mg DS CP Ad 1cp 2x/j
(N.C)	- douleur en traumatologie et Rhumatologie	
Nopain- Nopain DS proxidol- proxidol DS Nhupain- Nhupain DS	- douleur de cycle menstruel	
3/ Diclofenac de potassium :	-douleur dentaire	- cp 50 mg AD - 1cp 2x/j
N.C	- douleur en traumatologie et Rhumatologie	
Rapidus- cataflam- votrex rapide	- migraine	
4/ Ibuprofene : (DCI)	Douleur et fièvre	200 mg enf+8/AD 400 mg 600 mg - CP AD 1cp/6h - /8h NRS Enf - sp 1ddp /6h - /8h
NC		
Xydol- Ibuprofal- prof- Antaflen - Sapofen- Algifen- remofen- bufen...		
5 / Morniflumate (DCI)	- douleur en traumato et Rhumato	250mg Ad 200 mg NRS 400 mg enf 700 mg Ad -suppo 2gel 2 - 3x/j 1 suppo le soir lapp le soir ad pd - gel
NC	- mal au gorge	
Niflumene – inflammine – usenil- Niflumate - Niflurie – flucidal- Niflugel	- Otite – circoncision	
NC		
Celebrex – Celoxib – Celvex- Rumabrex- Inicox		
7- piroxicam (DCI)		
Prixam- feldene – felcam – piroxeu- paimoxam Geldene- orthocam – fenoxam		

8/ ketoprofene : (Dci) (il est utilisé comme Ains puissant)	- douleur en traumatisme et Rhumato - douleur rénal	- cp $\left\{ \begin{array}{l} 100mg \\ 200 mgLP \end{array} \right\}$ Ad (1cp 2x/j) - suppo 100mg Ad (1 suppo le soir) - inj 100 mg - Ad (1inj en IM/J) - gel Ad (1App le soir) - sp $\left\{ \begin{array}{l} nrs \\ enf \end{array} \right\}$ 1 ddP / 6h ou /8h - patch 1 patch /48h
NC		
Profenid- profen- ketum- geprofen- Alprofen – Ketonal- Ketoneed- Kefentech patch- Saifen.....		

2/ Ais (corticoïde)

DCI	Indication	Forme- dosage- posologie
1 - Prédnisolone (N.C) - solupred -oropred - solugé -deprisol - swor - prédnal - physiolone	- Système respiratoire (Bronchite- Asthme- ORL- Tuberculose...) - Transplantation des organes	- cp $\left\{ \begin{array}{l} 5mg \text{ enf } +2ans \\ 20mg \text{ Ad} \end{array} \right\}$ - Selon le cas- matin Après les repas pdt : 05 jrs - sp
2 - Methyl prédnisolone N.C - Medrol - Lemod - Prednol -MP4 - MP16 -Solu medrol - Meprenal	- Système respiratoire - Allergie Saisonnière - En traumatisme et Rhumato	- cp $\left\{ \begin{array}{l} 4mg \\ 16mg \end{array} \right\}$ Ad Selon le cas - inj $\left\{ \begin{array}{l} 20 mg \text{ enf} \\ 40MG \text{ Ad} \\ 120MG \end{array} \right\}$ 1 inj en IM/J
3 - Betaméthasone : (Dci) N.C Celestene - Celestasone - Betabio- Betacrovis - Tabeta - Heet – Diprostene – diprosone -Betasone- Betsol - dermasol	- système respiratoire - Allergie Saisonnière - En traumatisme et Rhumato	- cp - 2mg Ad (selon le cas) - gtt $\left\{ \begin{array}{l} NRS \\ Enf \end{array} \right\}$ 10gtt/ 1kg - inj Ad 1 inj en IM/ 7 a 21 jrs - pdt } 1app/j - lotion }

- Traitement de Reflux Gastro oesophagien : (RGO)

1/ anti-acide

2/ anti-émétique

- Traitement de gastrite : (inflammation)

1/ Traitement de RGO

2/ anti spasmodique

3/ pensement gastrique (IPP)

- Traitement de l'ulcère d'estomac : (infection)

1/ Traitement de Gastrite

2/ Antibiotique

3/ Régime Alimentaire

Les Anti-Acides

- Brûlure d'estomac et Remonte des acides

ST	SP	CP
- Gaviscon - Phosphalugel - Phosphalumine - Estogel - Pepsane	-Gaviscon -Nobac -Gastrium -Peptidac -Maalox	-Rennie -Renibon -Rennie deflatine
1 sac 3x/j	1 cas 3x/j	1 cp 3x/j

Les Anti – émétiques

-Traitement de vomissement et Nausée

DCI	Forme- dosage- posologie
1/Metoclopramide : (Dci)	- cp 10 mg Ad 1 cp 3x/j
NC	- sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{NRS} \\ \text{ENF} \\ \text{AD} \end{array} \right\}$ Ad 1 cas 3x/j
Clopramide- Metoclam- primpéran- mepramide	- Suppo Ad 1 suppo à la demande - inj Ad 1 inj en IV ou en IM à la demande
2/ Dompéridone : (DCI)	
NC	- cp 10mg AD 1cp 3x/j
Dompérone- Motilium- Emiduim- Motidone Dompéride- Nauséduim- Peridys...	- sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{NRS} \\ \text{Enf} \end{array} \right\}$ 1 ddp 3x/j
3/ Vomiteb : (N.C)	- cp Ad 1cp 3x/j
	- sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{enf} \\ \text{Ad} \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1\text{càc} \\ 1\text{càs} \end{array} \right\} 3\text{x/j}$

Les antispasmodiques

1)Phloroglucinol:(DCI)

- Gastro-entérologie.
- Gynécologie (Femme enceinte – Douleur de cycle menstruel).
- Colique néphrétique (Rein)

* Forme-Dosage-Posologie:

- Enf +8ans 1Cp $\longrightarrow$ 3x/J
- Cp Lyoc 80 mg $\left\{ \begin{array}{l} \text{Enf +8ans 1Cp} \\ \text{Ad} \end{array} \right. \begin{array}{l} \longrightarrow 3\text{x/J} \\ 2\text{Cp} \longrightarrow 3\text{x/J} \end{array}$
- Suppo 150 mg $\longrightarrow$ Ad 1Suppo à la demande.
- Inj $\longrightarrow$ 1 Inj en IM ou en IV à la demande.


Ex : (N.C)

Spasfon – Spasmodyl – Spacyl – Levospasme –Spasmol – Spasmine - Spasmex.

2) Trimébutine : (DCI)

- Douleur, Ballonnement et Gaz de colon

* **Forme-Dosage-Posologie:**



Ex : (N.C)

- Debridat.
- Digestat.
- Transacalm.
- Trimedat.
- Colostop.

3) Meteospasmyl: (N.C)

- Douleur et gaz de colon

* **Forme-Dosage-Posologie :**

- Cp $\longrightarrow$ Ad 1Cp 3x/J

4) Meteoxane: (N.C)

- Douleur , Ballonnement et Gaz de colon

* **Forme-Dosage-Posologie :**

- Gel $\longrightarrow$ Ad 2gel 2 $\longrightarrow$ 3x/J

5) Bedelix: (N.C)

- traitement de dérèglement de l'intestin


* **Forme-Dosage-Posologie :**

- St $\longrightarrow$ Ad 1 sac 3x/J

6) Pinavérium : (DCI)

- traitement des douleurs et des troubles du transit (relâche les muscles)

* **Forme-Dosage-Posologie :**




Ex : (N.C)

- Dicetel - Pinatel.

7) Mebévérine : (DCI)

- traitement des douleurs ou de l'inconfort liés au dérèglement de l'intestin



Ex : (N.C)

Duspatalin - Spascol - Despavine

Pensement Gastrique (IPP)

Inhiteur de la pompe à proton

- Maux d'estomac
- En association avec les Anti – inflammatoires

1 / Oméprazole : (DCI)

Gel $\left\{ \begin{array}{l} 10 \text{ mg enf} \\ 20 \text{ mg Ad} \end{array} \right\} \quad 1 \text{ gel } 1 \text{ à } 2 \text{ x/j}$

Ex: (N.C)

Lomac – Proton – Zimor – Antag – Omed – Neogastric – Omépramex - omind .

2 / Lansoprazole : (DCI)

Gel 30 mg → Ad 1 gel 1 à 2 x/j

Ex: (N.C)

Esoproton

3 / ésoméprazole : (DCI)

Gel $\left\{ \begin{array}{l} 20 \text{ mg} \\ 40 \text{ mg} \end{array} \right\} \quad \text{Ad } 1 \text{ gel } 1 \text{ à } 2 \text{ x/j}$

Ex: (N.C)

Inexium – Esoral – Kenzoprazole – Lesinox

4 / pantoprazole : (DCI)

Gel 40 mg → Ad 1 gel 1 à 2 x/j

Ex: (N.C)

Protonex – Pantodar

5 / Ranitidine : (DCI)

CP $\left\{ \begin{array}{l} 150 \text{ mg} \\ 300 \text{ mg} \end{array} \right\} \quad \text{Ad } 1 \text{ cp } 2 \text{ x/j}$

Inj Ad 1 inj en IM à la demande

Ex: (N.C)

Ranitex – Ranitidal – Ratidex – Ranimex

Les Laxatifs : (Traitement de la constipation)

Sont des médicaments accélérant le transit intestinal (facilitant l'évacuation des selles).

1) Lactulose : (DCI)

Traitement symptomatique de la constipation.

** Forme-Dosage-Posologie :*

-St $\longrightarrow$ Ad 1 sac 2 $\longrightarrow$ 3x/J

NRS 2,5ml 2 $\longrightarrow$ 3x/J

-SP $\leftarrow$ Enf 5ml-7,5ml 2 $\longrightarrow$ 3x/J

Ad 10ml-15ml 2 $\longrightarrow$ 3x/J

Ex : (N.C)

Duphalac - lactulose Mylan - Lactunad - Ezilax - Isolact - Inphalac.

2) Macrogol : (DCI)

Traitement symptomatique de la constipation.

** Forme-Dosage-Posologie :*

-st $\left\{ \begin{array}{l} 4g \text{ NRS } 6 \text{ mois} \longrightarrow \text{Enf } 8 \text{ ans} \\ 10g \text{ Enf Sans} \longrightarrow \text{Ad} \end{array} \right\} 1 \longrightarrow 2 \text{ sac le matin}$

Ex : (N.C)

-Forlax.

3) Glycérine : (N.C)

Lorsque les selles s'accumulent dans le rectum (bouchon)

** Forme-Dosage-Posologie :*

-SUPPO $\left\{ \begin{array}{l} \text{NRS} \\ \text{Enf} \\ \text{Ad} \end{array} \right\} 1 \text{ Suppo à la demande}$

4) Charbon active : (DCI)

Traitement symptomatique des troubles de transit intestinal (absorbant)

** Forme-Dosage-Posologie :*

-Cp $\longrightarrow$ Ad 1 Cp 2 $\longrightarrow$ 3x/j

Ex : (N.C)

Eucarbon - Charbonnel - Carbophos.

5) Micro lavements :

5)1-Norgalax (regulax) }
5)2-Normacol lavement } Tube (voie rectal) pour assurer le vidange
(Préparation des examens)

5)3-Fortrans $\longrightarrow$ St

6) Laxatifs à base des plantes :

6)1- Laxena Cp $\begin{cases} 15 \text{ mg} & \text{Enf} \\ 25 \text{ mg} & \text{Ad} \end{cases}$

6)2- Huile de paraffine SP $\longrightarrow$ Ad EX : isofine

Les Anti diarrhéiques :(Traitement de la diarrhée)

Diarrhée $\begin{cases} \text{Mal Nutrition.} \\ \text{Médicament.} \\ \text{Physiologique (poussé dentaire-Trac-Stress).} \end{cases}$

1) Nifuroxazide : (DCI)

Diarrhée d'origine bactérienne.

** Forme-Dosage-Posologie :*

Gel 200 mg $\longrightarrow$ Ad 2 gel 2 $\longrightarrow$ 3x/J.

SP $\begin{cases} \text{Nrs } 2,5\text{ml} \\ \text{Enf } 5\text{ml} \end{cases} \Bigg\} 2 \longrightarrow 3\text{x/J.}$

Ex : (N.C)

Ercefuryl – Xéfuryl – Dysentyl – Nifazide - Penfurax.

2) Lopéramide : (DCI)

Ralentisseur de transit intestinal (réduit les sécrétions).

** Forme-Dosage-Posologie :*

Gel 2 mg $\longrightarrow$ Ad 1 gel 2 $\longrightarrow$ 3x/J

SP $\begin{cases} \text{Nrs} \\ \text{Enf} \end{cases} \Bigg\} 1 \text{ ddp } 2 \longrightarrow 3\text{x/J.}$

Ex : (N.C)

Lopéridal – Imodium – Diaryl – Dimépra - Inphadium.

3) Racécadotril : (DCI)

Traitement symptomatique de la diarrhée aigue.

** Forme-Dosage-Posologie :*

Gel 100mg $\longrightarrow$ Ad 1 gel 2 $\longrightarrow$ 3x/J

St $\begin{cases} 10\text{mg} & \text{Nrs} \\ 30\text{mg} & \text{Enf} \end{cases} \Bigg\} 1 \text{ sac } 2 \longrightarrow 3\text{x/J.}$

Ex : (N.C)

Tiorfan

4) Diosmectite : (DCI)

Régulateur de la fonction intestinal.

* **Forme-Dosage-Posologie :**

St	Nrs	1/2 sac	1	→	2x/J.
	Enf	1/2 sac	2	→	3x/J.
	Ad	1 sac	2	→	3x/J.

Ex : (N.C)

Smecta - Smedyl.

Traitement de la bactérie(cas intoxication)

1) Metronidazole : (DCI)

Cp	250mg	}	1 Cp	2	→	3x/J.
	500 mg					

Sp	125mg	Nrs	}	1 CM	2	→	3x/J.
	200mg	Enf					

Ex : (N.C)

Flagyl - Nidazol - Imuzol - Flazol.

2) Cotrimoxazole : (DCI)

Cp	480mg		Ad	1 Cp	2	→	3x/J.
	960 mg						

Sp 200mg 1 CM 2 → 3x/j.

Ex : (N.C)

- Bactrim - Bactrim forte
- Cotrimoxal- Cotrimoxal forte
- Trimédar - Trimédar forte
- Primazol
- Cotrim
- Sulprim

En cas de déshydratation on utilise :

Sels de réhydratation S.R.O — St

-Rehydrax — 1 L eau

-Celia — 200ml eau

-Rehydramin

A renouveler chaque
24h

Les Antihistaminiques (traitement de l'allergie)


1 – Loratadine (DCI) : Allergie respiratoire (rhinite) Forme-Dosage-Posologie : - cp 10 mg Ad 1 cp - sp — ENF 5 ml } le soir Ex (NC) : Clarityne – Tirlor – Alaryd – Ncoladine – Allertine – Restamine	2 – Kétotifène (DCI) : - Allergie respiratoire (Toux) - Prévention bronchite/asthme Forme-Dosage-Posologie : - cp 1 mg Ad 1 cp - sp — NRS+ 3 mois 2.5ml - sp — enf 5ml } le soir Ex (NC) : Totinal – Tifen – Zaditen	3 – Cétérizine (DCI) : Les deux types d'allergie Forme-Dosage-Posologie : - cp 10 mg Ad 1 cp - sp — Enf 5 - 10 gtl - sp — Ad 15 - 20 gtl } le soir Ex (NC) : Histazine – Artiz – Zyrtec – Zetirec – Rhiten	4 – Fexofenadine (DCI) : Les deux types d'allergie Forme-Dosage-Posologie : - cp — 120mg respiratoire - cp — 180mg cutanée Enf + 12 et Ad Ex (NC) : Telfast – Rifex – Fexodine Fexonidal
5 – Dexchlorphéniramine (DCI) Allergie cutanée Forme-Dosage-Posologie : - cp 2 mg - Ad 1 cp - sp — Nrs 2.5 ml - sp — Enf 5 ml } le soir Ex (NC) : Polaramine – Histagan – Histone	6 – Mequitazine (DCI) : Les deux types d'allergie Forme-Dosage-Posologie : - cp — 5 mg - cp — 10mg - sp — Nrs 2.5 ml - sp — Enf 5 ml } le soir Ex (NC) : Primalan	7 – Cyproheptadine (DCI) : Pour la prise de poids Forme-Dosage-Posologie : - cp 4 mg - Ad 1 cp - sp enf 1 cm } le soir Ex (NC) : Periactine – Heptagyl – Cryactine Heptal – Lapeti – Isoctine – super Appetit – Ceptadine – Modestamine	Autre : - deslor — Cp - deslor — Sp - Rupafin cp 10 mg - Bilaxten cp 20 mg

Les Antitussifs

Toux sèche



Toux grasse



* Expectorants :

1) Carbocesteine : (DCI)

- Sp $\left\{ \begin{array}{l} 2 \% \text{ enf} \\ 5 \% \text{ Ad} \end{array} \right\} \text{ 1 CM 3x/J.}$

St 200mg $\longrightarrow$ Ad 1 sac 3x/J

Ex : (N.C)

Rhinathiol-mucolyse-Broncholactol-Pectosan-carbulam-fluimicil-solmucol

2) Ambroxol : (DCI) $\longrightarrow$ Sans sucre

Sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{Enf+8ans 1c à c} \\ \text{Ad 1c à s} \end{array} \right\} \text{ 3x/J.}$

Ex : (N.C)

Muxol-Ixol-Soluxol.

3) Bromhexine : (DCI)

Bronchite

Sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{Enf 2,5 ml 1 — 2x/J} \\ \text{Ad 5ml 2 — 3x/J} \end{array} \right\}$

Ex : (N.C)

Bisolvon – Isolvon

4) Mucotec : (DCI)

Pour lavage des poumons

Cp $\left\{ \begin{array}{l} 150\text{mg} \\ 300\text{mg} \end{array} \right\}$ Ad selon le cas

<u>Toux sèche</u>	
<u>1 - Neocodion : (N.C)</u> Cp $\rightarrow$ Ad 1cp 3x/J Sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{Nrs + (3mois)} \\ \text{Enf} \\ \text{Ad} \end{array} \right\}$ 1 CM 3x/j	<u>2 - Denoral : (N.C)</u> Sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{Enf} \\ \text{Ad} \end{array} \right\}$ 1CM 3x/J
<u>3 - Comphobiotic : (N.C)</u> Suppo $\left\{ \begin{array}{l} \text{Nrs} \\ \text{Enf} \\ \text{Ad} \end{array} \right\}$ 1 suppo le soir	
<u>Toux sèche et irritative</u>	
<u>5 - Toplexil : (N.C)</u> Sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{Enf + 2 ans 1 cac} \\ \text{Ad 1cas} \end{array} \right\}$ 3x/J	<u>6 - Encofluid : (N.C)</u> Sp - Ad 1 cas 3x/j
<u>7 - Sinécod : (N.C)</u> Sp - Ad 1 cas 3x/j	<u>4 - Bronchocalm : (N.C)</u> Sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{Enf} \\ \text{Ad} \end{array} \right\}$ 1 CM 3x/J
<u>À base des plantes</u>	
<u>8 - Zecuf : (N.C)</u> - Sp $\left\{ \begin{array}{l} \text{Sucre} \\ \text{Sans Sucre} \end{array} \right\}$ Ad 1 cas 3x/J - pastille Ad 1 cp 3x/j	<u>9 - Mentex : (N.C)</u> Sp - Ad 1 cas 3x/j

<u>10-biocalyptol : (NC)</u> -SP - Ad 1 cas 3x/j	<u>11-bronchonet (NC)</u> - Sp $\begin{cases} \text{Sucré} \\ \text{Sans Sucré} \end{cases}$ - pastille Ad 1 cp 3x/j
--	---

Mal au gorge

<u>1 – Hexalyse : (N.C)</u> Cp à sucer Ad 1 cp 3 - 4x/j	<u>2 – Hexaspray : (N.C)</u> Spray (collutoire) 1 bouffet 3 - 4x/j
<u>3 – Thymoseptine (NC) :</u> Sp - Ad 1 cas 3x/j	<u>4 – α amylase (DCI) :</u> - Cp Ad 1 cp 3x/j ——— megamylase - sp enf 1 cac 3x/j ——— maxilase / Ximalex

Les Bronchodilatateurs

Sont des médicaments destinés à traiter ou à prévenir de certaines maladies telles que : Asthme et Bronchite

<u>1 – Salbutamol (DCI) :</u> - cp 2 mg selon le cas - sp $\begin{cases} \text{Nrs} \\ \text{enf} \\ \text{Ad} \end{cases} \left. \begin{array}{l} \frac{1}{2} \text{ cac } 1 - 2x/j \\ \frac{1}{2} \text{ cac } 2 - 3x/j \\ 1 \text{ cas } 2 - 3x/j \end{array} \right\}$ - spray - solution à inhaler Ex : (N.C) Ventoline – Salbulam – Rabwalyse - koxma – Asthalin	<u>2 – Terbutaline (DCI) :</u> A un effet retard - cp 5 mg lp selon le cas - sp $\begin{cases} \text{Nrs} \\ \text{enf} \\ \text{Ad} \end{cases} \left. \begin{array}{l} \frac{1}{2} \text{ cac } 1 - 2x/j \\ \frac{1}{2} \text{ cac } 2 - 3x/j \\ 1 \text{ cas } 2 - 3x/j \end{array} \right\}$ - inj (à usage hospitalier) Ex : (N.C) Bricanyl – Talin – Isobutaline
---	--

Autre : (Aéro)

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1 – Clenil 250 | 7- Foradil 12 |
| 2 – Budecort (100 – 200) | 8- Spiriva 18 |
| 3 – Flixotide (50 – 125 – 250) | |
| 4 – Séretide (100 – 250 – 500) | |
| 5 – Pulmicort (200 – 400) | |
| 6 – Symbicort (100 – 200 – 400) | |