

Angine Erythémateuse - palatoire

Augmentin

80mg/kg/j

SSP 10g

→ Enfant < 30kg
- Augmentin sup NRSE
01 sup 3x/j

SSP 10g

→ Enfant > 30kg
Augmentin sachet
01 sachet 3x/j

SSP 10g

25 - 35kg = sachet 500mg

> 35kg = sachet 01g

→ si allergie: { Josacine }
ou
réactive

05 g
02 x 1 g

ou drop
ou ddp

02 x 1 g

0 - 5 kg = 125 mg
5 - 20 kg = 250 mg
> 20 kg = 500 mg

2 Doliprane.

↳ Enfant:

Doliprane supp

05 g

ou suppo / 6h si fièvre

< 8 kg = 100 mg
8 - 12 kg = 150 mg
13 - 20 kg = 200 mg
> 20 kg = 300 mg

↳ grand Enfant,

Doliprone up 500mg

or up 16h si fièvre

Angine Érythémateuse

① Clamoxyl

50mg/kg/j

esp 10g

max=2g/j

Enfant

Sirap

Acām

0 - 5 kg

125 mg

02 x 1j

5 - 10 kg

250 mg

02 x 1j

10 - 15 kg

250 mg

03 x 1j

15 - 20 kg


500 mg

02 x 1j

> 20 kg

500 mg

03 x 1j



→ pour le grand Enfant :

↳ Chamoxyl cp 01g ————— (cp 10g)
01 cp 02 x 1g

2 Doliprane ————— (01 bte)
15 mg / Kg / j

↳ Enfant (01 suppo 16h si fièvre)

< 8 Kg = 100 mg
8 - 12 Kg = 150 mg
13 - 20 Kg = 200 mg
≥ 20 Kg = 300 mg

↳ grand Enfant

↳ Doliprane cp 500mg ————— (01 bte)
01 cp 16h si fièvre

2) Si allergie à l'amoxicilline


Josacine. ~~sirop~~ ⁰⁵⁰ ~~050~~ ⁰⁷⁰ ~~070~~

0.25g 0.2 x 1g

0 - 5 kg = 125 mg

5 - 20 kg = 250 mg

> 20 kg = 500 mg



Fiebre

↳ Enfant:

Doliprone: suppo ————— as bte
as supp 16 h 5th figure

2 kg . moving

$$8 - 12 \text{ kg} = 150 \text{ mg}$$
$$13 - 20 \text{ kg} = 200 \text{ mg}$$
$$> 20 \text{ kg} = 300 \text{ mg}$$

Diagram illustrating the relationship between P_{max} and P_{min} for different values of α :

The diagram shows a horizontal line with arrows at both ends. Points are marked with vertical ticks and labeled as follows:

- On the left side, from left to right: P_{max} , P_{min} , P_{max} .
- On the right side, from left to right: P_{min} , P_{max} , P_{min} .

→ Si présente une diarrhée.

Efferalgan sirap (E) ————— (536)

or dop 16 h si fièvre

② Orbte
 D. lipiane cārop
 add p 16 h sō fievre 16

↳ le grand Enfant.

Doleprane ^{ou sachet} (cp) 500mg ——— (os lste)
os cp 16h si fièvre

fièvre + Détresse Respiratoire

⇒ TTX (maternité)

{ Si fièvre $> 40^{\circ}\text{C}$ ajouter une supp }

Algifen sirop ——— (os flc)
os ddp 16h

CI < 6 mois

Toux

Prosperan	sirap	asflc
01 cãc	02 x 15	NRS
01 cãc	03 x 15	enfant
02 cãc	03 x 15	grand (E)

ou

Toux Rid	sirap	asflc
01 cãc	02 x 15	NRS
01 cãc	03 x 15	(E)
02 cãc	03 x 15	grand (E)

Maxilase sirop (Idem)

une Toux < 6 mois

il faut le respect c'est un
moyen de défense

Allergie Cutanée (Urticaire)

surdiés de la peau
en plaie.

PDF

injection

AHC

en IM

5 mg / kg

(max = 100 mg)

* si pas de réponse
renewel

* si pas de réponse
adrénaline.

surveillance 1 h
si ↓ rougeur et recherches
Effets II aires

TRT de Sortie

Anti-histaminique:

- < 1 an Primalon sirop asplc
- 1 - 4 ans Histagan "
- > 4 ans Polorexamine "
- ou Loratidine "

01 cāc 02 x 1/2

↳ pr le grand Enfant =

(02 cāc x 2 1/2)

(ou) pour grand Enfant =

Telfast = cp 180 mg ————— (05 x 1)
01 cp 1/2 le soir

+
Solupred cp 20mg ————— 02 x 5
02 cp 1/2 le matin à jeun

Crise d'asthme

02 séances d'aérosol

0,03 cc/kg de Salbutamol

dilué dans 0,1 cc de SST 9%

0,03 dose
min

0,1 cc dose max
> 30 kg

si pas d'amélioration

+1 - injecté de Solumédrol
0,2 mg/kg

en IM + 02 séances aérosol

Max = 06 séances d'aérosol

TRT de Sortie

① Ventoline Spray ——— QSP 75
(salbutamol)

02 bouffées 03 x 15

② Celestone gouttes ——— QSP 05

10 gouttes / kg

le matin après
repas

(du)

ou 5mg

Solu pred cp 20mg ——— QSP 5

(1mg/kg) calcule le nbre de CP
le matin après repas

+/- clamoxyl ——— QSP 08

Aphthae buccales

① Fungizone solut ————— (os ph)
os app 03 x 15

H. ② Daktarin gel ————— (os ph)
os App 02 x 15

Chalazia شقيرة

① Rifampicine collyre ————— (os ble)
os gouttes / oeil 02 x 15

② Fucithal mique collyre ————— (os ble)
os gtttes / oeil 05 x 15

③ Lavage = SSI

Conjonctivite

↳ Si écoulement jaunâtre =

① Rifamycine Collyre ————— (01103)
ou gouttes 1 oeil ou x 1 g

② Rifamycine Pommade ————— (01106)
ou App le soir

↳ Si écoulement clair = (Véral)

Vitabocet collyre ————— (01106)
ou gouttes 1 oeil ou x 1 g

Douleurs Abdominales

① Spasfon: _____ (01 boîte)

↳ le petit enfant:

Spasfon: lyoc _____ (01 boîte)
01 lyoc 03 x 15

↳ le grand enfant:

Spasfon: cp 80mg _____ (01 boîte)
01 cp 03 x 15

② Dêbriolat: _____ (01 boîte)

↳ le petit enfant:

• Dêbriolat sirop (E) _____ (01 flac)
01 cām 03 x 15

le grand enfant

Débridat cp 500mg

(onkte)

01 cp 03 x 1g

1-3 Bedillex : Sachet

(onkte)

01 sachet

03 x 1g

Douleur de la FID

avis CCI

Infection Urinaire

- Fièvre inexpliquée
- Polyurie
- Brûlures mictionnelles
- DLR lombaire ou FID

lobstix

si infect urinaire = Nitre (+)
Leucocyturie (+)

Si (-)

TRT sympto

IU

Orphen 500mg
ou 1000mg
0-2 ans 10mg
2 ans 40mg

Si (+)

Faire ECBU
+
Antibiogramme
Prise

+ Soigner lombalgie
avec spaston + Doliprane

Labstix

Prot (+)

et sang + + +



Colique Néphrétique

Si Patient diabétique avec IU

ne pas attendre l'antibiogramme

TRT d'emblée avec

Ciprodon cp 0.5g / j

Colique néphrétique

En urgence :

01 injection de Voltarène en IM

+ 1- spasfon en IV

(AINS) à la sortie

① Voltrea cp 50mg —————
01 cp 12 le soir

(88/57)

② Omeprazole cp 20mg —————
01 cp 12 le matin à jeun

(coste)

Ne jamais associer
ATB avec AINS $\Rightarrow$
risque de cellulite

→ On peut donner Pour celique
Néphrotique

Naflole suppo _____ 0.105g
01 suppo 02 x 1/2

NRS = suppo 200mg
(E) = suppo 400mg

Vomissements

↳ Enfant: (Nne - NRS)

Vomitels sirop ——— (osfle)

01 ddp 03x1g

↳ > 2 ans:

Domperidone sirop ——— (osfle)

01 ddp 03x1g

+ RHD

+ adulte = boire bep d'eau + +

+ Enfant = SRO sachet (saïdal)

————→ 01 bte

01 sachet (saïdal) dans 01 l

d'eau de robinet (le reste des marque
selon la notice) = eau bouillie

refroidie (la Boutelle + Pent 24h

→ 50 cc
de cas après chaque
Vomissement

Diarrhée

① Tlorfan: sachet 10mg ————— (01h)
01 sachet 03 x 1g (> 3 ans)
1/2 sachet 03 x 1g (< 3 ans)

② Smecta: sachet ————— (01h)
1/2 sachet 03 x 1g (E)
01 sachet 03 x 1g (A) < 12 ans

③ Floryl sirop ————— (08h)
(ATC) 30mg/5ml
03 à 04 02 x 1g
(si présence de glaires et fièvre)

④ SRO: sachet ————— (01h)
01 sachet (oral) dans 01 L
d'eau bouillie et refroidie
50 cc après chaque selle < 2 ans

100 ca

ca > 2 ans

Primeron ? qd est ce que 'ge
le donne ?

Bactrim ?

Laryngite

abaisse
langue CI

- dyspnée inspiratoire
- râles sibilants
- roncote de Voix

légère à
modérée = roncote de la voix

C'est estime

gouttes

SS105

10 gouttes 1kg le matin
(à jeun ou après repas)

Sévére

- roncote de la Voix
- stridor laryngé
- détresse respiratoire

01 séance de Code tail laryngée

- 01 cc d'Adrénaline
- 02 cc de dexaméthasone
- 03 cc de SSI

} sur
20
min

Injection de ⁺ dexaméthasone

0.5 x poids en IM

confirmés



évalué après 1h → à répéter
si nécessaire

↳ On peut donner au lieu du Cocktail =

Solumedrol injection en IM

(1 mg / kg)



TRT Sortie

Solupred. cp 5mg ——— 88p05j

(1 mg / kg) = une seul prise le

calcul cp matin

Eruption Cutanée = Virus

= rougeole, rubéole, varicelle

① Histagan : sirop _____ (01 flc)

01 cà m

02 x 1

ou le

soir

② Hexamédine solut _____ (01 bte)

01 App

03 x 1

③ Paracétamol :

Si surinfection à
Strepto

Keforal sirop (E) _____ (01 flc)

01 ddp

03 x 1

Hexamédine solut _____ (01 flc)

01 App

05 x 1

Zeta crème _____ (01 tube)

01 App

02 x 1

Constipation:

① Diluted syrup _____ (only for)

0.5 dd p

0.3 x 1/2

→ If (E) > 12 ans =

Trimethoprim cp _____ (only for)

0.1 cp

0.2 x 1/2

For low budget

② Diphthalac syrup _____ 4g (only for)

< 10 ans

1 cc

0.1 x 1/2

1 - 6 ans

1 cc

0.2 x 1/2

> 6 ans

1 cc

0.3 x 1/2

③ Glycerine suppo _____ (only for)

0.1 - 0.2 suppo 1/2

Les Oreillons

d'O = virale Pas de TRT
juste un TRT sympto

→ Uxeril suppo 400mg ——— (note)
ou suppo le soir

Poussée dentaire

- 6 mois — 02 incisives inf.
- 9 mois — 02 " sup.
- 14 mois — les molaires
- 18 mois — les canines

① Dodo gel

01 App
gel buccal

02 x 1 j

(01 bte)

② Dolodent

solu gingivale
01 App

03 x 1 j

(01 bte)

Confirmer

Ingestion Caustique

- TLT

- FOGD dans les 24h
- arrêt d'alimentation oral

Appétit (Anorexie)

Appétito sirop _____ as p/c

0.1 c à c	0.3 x 1 $\frac{1}{2}$	< 3 ans
0.2 c à c	0.3 x 1 $\frac{1}{2}$	3 - 6 ans
0.3 c à c	0.3 x 1 $\frac{1}{2}$	> 6 ans.

Anémie ferriprive

slu avant
repas

Ferrum gouttes _____ 1^{er} 03 mois

04 gouttes / kg → le 01 mois

02 goutte / kg → 2^e, 3^e, mois

Convulsion

↳ (Nme < 1 mois) =

Gardinal en Perfusion
(phénobarbital)

200 mg/kg dilué ds 60 cc
de SSI en IVL pdt 20 min

↳ (NRS) (E) (A)

> 1 mois

Valium (Diazepam) = en IV
poids / 2 = dilué ds un
33 cc de SSI

(sans dépasser 30 mg max)

à répéter 2 à 3 fois / j pas plus +++

Convulsion fébrile < 3 mois $\Rightarrow$ PL

on a pas besoin de faire fond d'œil comme
pour adulte.