

A) Beta lactamines ou Antibiotiques betalactames(Famille) :

1)Amoxicilline(DCI) :

Ind :

- infection respiratoire(sphere ORL: ~~Otite-Sinusite-pharyngite~~ ; Angine ; Toux grasse)
- Abcès dentaire
- Cas postopératoire(comme prevention)
- infection digestif(Ulcère gastrique)

FDP :

-CP, gel { 500mg : (Enf+12ans)
1g : Ad } → 1cp → 2 → 3*/jour

-SP { 125mg : NRS
250mg : Enf(2 → 6ans)
500mg : Enf(6 → 12ans) } → 1C a M → 2 → 3*/jour

-INJ { 500mg : (Enf+12ans)
1g : Ad } → 1inj en IM/jour(N7 → N10)

NC : Clamoxyl ; amoxypen ; Amodexgé ; Biopamox ; Amoximex ; lamoxyl ; Saiffoxyl ; Penamax

2)Ampicilline(DCI) :

Ind :

- Infection urogénital(++++)
- infection respiratoire
- cas post-opératoire

FDP :

- gel 500mg { Enf+12ans:1gel---2 → 3*/jour
- Ad :2gel---2 → 3*/jour

-SP 250mg :Enf(2-6ans) :1C a M---2 → 3*/jour

-INj 1g :Ad---1inj en IM/jour

NC :Totapen ;Ampal ;Ampilline ;Ampinax

3) « Amoxicilline+Acide clavulanique »(DCI) :

Ind :

-Infection respiratoire aigue(Bronchite,sphere ORL,Angine)

-Abcet dentaire

-Infection urinaire

FDP { 500mg :(Enf+12ans)

-CP { 1g : Ad } 1cp---2 → 3*/jour

-ST { 500mg :Enf

1g : Ad } 1sac---2 → 3*/jour

-SP { NRS

Enf } 1ddp---2 → 3*/jour

NB :concernent les SP(NRS,Enf),il ya aucune différence entre eux, sauf dans la quantité(30ml vs 60ml ou 35ml vs 70ml);donc ,on peut donner le SP de NRS a l'Enf et vice versa, en considération du poids du malade

NC : Augmentin ; Augmentimex ; Klavox ; Amoclan BID ; Amoclan 8 : 1 ; Bioclav ; clavodar

4) Oxacilline (DCI) :

Ind :

- Infection cutanée (plaies, abcès cutanée)

FDP :
-gel { Enf+12ans : 1gel }
 { Ad : 2gel } } 2 → 3* / jour

-INJ { 500mg }
 { 1g } } Ad : 1inj en IM / jour

NC : Bristopen ; Oxacil ; Oxaline ; Oxal ; Oxcare

5) Phenoxy-Methyl-Penicilline « PMP » (DCI) :

Ind :

- Angine (traitement pde 10 jours)

FDP :
-CP { 1MUI : (Enf+12ans) }
 { 1,5MUI : Ad } } 1cp → 2 → 3* / jour

-SP { 250 000UI : (Enf+3ans) : 1C a M → 2 → 3* / jour }
 { 400 000UI (très rare) }

-INJ { 500 000UI : Enf } 1inj en IM / jour
 { 1MUI : Ad }

NC : Ospan ; Orapen ; Penival ; gectapen

6) Benzathine penicilline (DCI) :

Ind :

- Angine (effet retard : traitement peut atteindre 5 mois)

FDP : $\left\{ \begin{array}{l} 600\,000\text{UI} : \text{Enf} \\ 1,2\text{MUI} : \text{Ad} \end{array} \right\} \rightarrow 1\text{inj}/21\text{jours} (\text{on a dit : effet retard,,, N°07 « presque 4 mois »})$

NC : Extencine ; Extencilline ; Retarcilline ; Retarmex ; Retarpen

B) Les céphalosporines (Famille) :

1) Cefalexine (DCI) :

Ind :

- infection respiratoire (sphere ORL ; Angine ; Bronchite)

- cas post-opératoire (++++)

- infection urogénital

- infection dermatologique (varicelle « بوشوكة »)

FDP : $\left\{ \begin{array}{l} 500\text{mg} : (\text{Enf} + 12\text{ans}) \\ 1\text{g} : \text{Ad} \end{array} \right\} \rightarrow 1\text{cp} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

-SP : $\left\{ \begin{array}{l} 125\text{mg} : \text{NRS} \\ 250\text{mg} : \text{Enf} \end{array} \right\} \rightarrow 1\text{C a M} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

NC : Keforel ; lexinal ; lexin ; cephalax ; Cephadar ; Cefadat ; Ospexin ; ulexin

2)Céfazoline(DCI) :

Ind :

- infection respiratoire(sphere ORL ;Angine ;Bronchite)
- cas post-opératoire
- infection urogénital
- infection dermatologique (varicelle « بوشوكة »)

FDP :

-**INJ** 1g :Ad—1inj en IM/jour ;;;**NB** :(le seul céphalosporine qui est sous forme injectable)

NC :Cefazoline ;Intrazoline ;Zopelin ;Cefazoline sandoz ;Hikma Cefazoline

3)Cefaclore(DCI) :

Ind :

- infection respiratoire(Bronchite aigue seulement++++)
- infection urinaire

FDP :

-**CP** 500mg :Ad :2CP—2 →3*/jour

-**SP** $\left\{ \begin{array}{l} 125\text{mg :NRS} \\ 250\text{mg :Enf} \end{array} \right\} \rightarrow 1\text{C a M} \rightarrow 2 \rightarrow 3*/\text{jour}$

NC :Tabiclor ;Dicef ;Cloracef

4)Cefuroxime(DCI) :

-Ind :

- infection respiratoire(Bronchite aigue seulement++++)
- infection urinaire

FDP : 250mg
-CP } 500mg } **Ad : 1cp---2→3*/jour**

-SP 125mg :NRS :1ddp---2→3*/jour

NC : Zinnat ;Zinoximor ;Daroxine

5)Cefexime(DCI) :

Ind :

-Infection urinaire(++++)

-Infection respiratoire (Angine,Bronchite)

FDP : 200mg
-CP } 400mg } **Ad :posologie selon le cas**

-SP } 40mg : NRS
 } 100mg :Enf } **posologie selon le cas**

NC : Oroken ;Winex ;Belexin ;Orokal

C)Macrolides(Famille) :

1)Spiramycine(DCI) :

Ind :

-Abcet dentaire(++++)

FDP : 1,5MUI : (Enf+12ans)
-CP } 3MUI :Ad } **1cp---2*/jour**

-SP Enf :1C a M--2 3*/jour

NC :Rovamycine ;Spira ;Spiracare ;Spiramycil ;Rovadal

2) « Spiramycine+Metronidazole »(DCI) :

Ind :

-Infection de la cavité buccale(abcet dentaire,infection de la gencive ;Stomatite)

FDP : $\left[\begin{array}{l} 750\ 000\text{UI} : \text{Enf} \\ 1,5\text{MUI} : \text{Ad} \end{array} \right]$

-CP $\left. \begin{array}{l} \text{---} \end{array} \right\} 1\text{cp} \text{---} 2^*/\text{jour}$

NC :Orogyl ;Bi-orogyl

3)Azithromycine(DCI) :

Ind :

-Infection respiratoire(Angine;Bronchite++++)

FDP : $\left[\begin{array}{l} 250\text{mg} : \text{Enf}(\text{boite de 6cps}) \\ 500\text{mg} : \text{Ad}(\text{boite de 3cps}) \end{array} \right]$

-CP $\left. \begin{array}{l} \text{---} \end{array} \right\} 1\text{cp}/\text{jour} \text{---} \text{pendant 3 jours}$

-SP 200mg $\left\{ \begin{array}{l} \text{NRS : «(1/2) CaM=2,5ml»/jour---pendant 3 jours} \\ \text{Enf : «1CaM=5ml»/jour---pendant 3 jours} \end{array} \right.$

NC :Zomax ;Zithromax ;Azithral ;Binozyt ;Zotrix ;Azimycine

4)Roxithromycine(DCI) :

Ind :

-infection respiratoire(pneumopathie)

FDP :

-CP 150mg :Ad :1cp---2 → 3*/jour(pdte 10 jours)

NC :Roxid ;Roxamed

5)Clarithromycine(DCI) :

Ind :

-Infection respiratoire(toute les inection respiratoires)

-Abcet dentaire

-Infection dermatologique

-Infection digestif(ulcère gastrique)

FDP { 250mg }
-CP { 500mg } } Ad :posologie selon le cas

-SP { 125mg :NRS }
 { 250mg :Enf } } posologie selon le cas

NC :Clarit ;Zeclar ;Claridar ;Clarital


6)Josamycine(DCI) :

Ind :

-Infections respiratoires(toute les infections respiratoires)

FDP :

-CP 500mg :Ad :1cp---2*/jour



NC :il existe un seul nc qui est :**Josacine**

D)Aminoside(Famille) :gentamycine

Ind :

- Infection urogénital
- Abcet dentaire
- cas post-opératoire
- Infection rénale




NC :gental ;gentamycine ;gentaxyn ;epigent ;gentalline

E)Quinolone(Famille) :

Ind :

- Pied diabétique(++++)
- Infectionurogénital
- cas post-opératoire
- Otite chronique



NC :Ciprolan ;Cipro-quinox ;Ciproval ;Cipromax(le **DCI** est :Ciprofloxacin)

F)Tetracycline(Famille) :

Ind :

-Infection légère de la peau(surtout pour «l'**acné**=حب الشباب »)

F-1)Doxycycline(DCI) :

FDP :

-**CP** 100mg :1cp---1→2*/jour

NC :Vibramycine N ;Dotur

F-2)Oxytetracycline(DCI) :

FDP :

-**CP** 250mg :posologie selon le cas

NC :Oxymed

F-3)Lymécycline(DCI) :

FDP :

-**CP** 150mg :posologie selon le cas

NC :Tetra lysal

G)Fucidamine(Famille) :

-Acide fucidique(DCI) :

Ind :

-Infection cutané compliquée(Plaies ;Abcès cutané ;cas post-opératoire ;Pied diabétique++)

FDP :

-**CP** 250mg :Ad :2cp---2→3*/jour---**NC** :Fucidine

-**SP** 250mg :Enf :1C à M---2 → 3*/jour---**NC** :Fucidine

-**Pde** pour tout :1app le soir---**NC** :Fucidine ;Zeta ;Fucidame ;Acifudal

Autres antibiotiques :

-**Nitroxoline(DCI)** :n'a pas une famille=un DCI à seul :

Ind :

-Infection urinaire(seulement)

FDP : { 50mg(ne plus existe pour l'instant)

-**CP** {
100mg :Ad :2cp---2→3*/jour

NC :Naxolin ;Nibiol ;Nibyol forte

-**Cedroxyl** :**CP** 1g :posologie selon le cas

-**Pyostacine** :**CP** 500mg : posologie selon le cas

-**Omnicef « céfdénir(DCI)** : {
CP 300mg
SP 125mg } posologie selon le cas

-**Aciclovir(DCI)** : {
CP 200mg
Pde(5pour 100) } posologie selon le cas

Ind : (الحب لي يدير على الشوارب والنيف أحيانا) مدوها للي تبوسو الحمة:

NC :Clovirax(crème dermique) ;Viravir(crème dermique) ;clovir(CP)