

Paracétamol (si Fièvre >38°C)	
15mg/kg/6H...	
Suppo/sachet (100, 150, 200, 300) sachet/CP 500 , sirop	
<8kg	100mg
8-12 kg	150mg
12-16 kg	200mg
16-25 kg	300mg
>25kg	500mg (sachet/cp)
Efferalgan sirop	ddp / 6h

Amoxicilline (>3 mois)		
Dose ORL :50-80mg/kg/j		
sirop (125, 250, 500), cp/gel (500,1g)		
0-5 kg	125mg	02 xj
5-10 kg	250mg	02 xj
10-15 kg	250mg	03 xj
15-20 kg	500mg	02 xj
20-30 kg	500mg	03 xj
30-40 kg	1g cp/gel	02 xj
		> 40kg : dose adulte 1g x3/j
Dose pulmonaire: 100-150mg/kg/j		
Dose méningé/septicémique : 200-300mg/kg/j		

Augmentin (80 mg /kg/jour)	
Sirop/ddp (NRS, E) , sachet/cp 500-1g	
NRS, E	01 ddp x3/j
>12ans (>35kg)	sachet/cp 1g x3/j

Josacine sirop (50 mg/kg/j)		
0-5 kg	125mg	01 ddp 02 xj (matin et soir)
5-20 kg	250mg	
>20 kg	500mg (sirop/cp)	
Azythromycine (Zomax)		
01 ddp /j		QSP 3-5j

Cefalexine (Keforal)	
Sirop (125, 250) , gel (250, 500) , cp (500, 1g)	
50mg/kg/j en 2 ou 3 prises , sans dépasser 2mg/j	

Anti- Histaminiques		
Histagan sirop	NRS	½ càc 2-3 x/j
	30mois-10ans	01 càc 2-3xj
	>10ans	02 càc 2-3xj
Telfast cp	Grand E	01cp/j le soir
Zyrtec gouttes	2-6 ans	05 gouttes x2/j
	6-12ans	10 gouttes x2/j
	>12ans	20 gouttes x2 /j
Autres	Primalan srp (>2ans) : ½ càc/5kg en 1ou2 prises /j	
	Deslor srp , Loratadine srp	

Corticoïde		
Solupred cp 05mg, 20mg		1mg/kg/j QSP 05 jours une seule prise/j le matin à 8h
Celestene gouttes		QSP 05jrs 10 gttes /kg le matin
inj	HHC	5mg/kg en IVD ; max 100
	Solumedrol	1mg/kg ; max 40
	Dexa	0,5 mg/kg (Poids/2) en IM ; max 12

Dermite de siège	
Dermocuire pmd	01 flc 01 app 2xj
HFM pmd	01 flc..... 01 app /j
KMNO4 cp	01 cp dans 10L d'eau pour bain de siège 02 xj pendant 05 jrs
<u>Si persistance :</u>	
Ketoderme crème..... 01 app /j (2j)	

Conjonctivite		
Ecoulement jaunâtre (Bactérienne ++)		
Rifamycine collyre	QSP 07 jrs 01 gtte/œil 4x/j	
Rifamycine pmd	01 bte	01 app /j le soir
Ecoulement clair (virale)		
Vitabact collyre	01 bte... 01 gtte /œil 4x/j	
+ Lavage par SSI		
Allergique		
Lavage par SSI + anti-histaminique		
+/- Anti-allergique collyre : Naabak/Naxiaa (1gtt x3/j)		

Aptose buccal	
1 càc de bicarbonate dans 1 verre d'eau tiède : à appliquer par une compresse stérile +/- Dologel après chaque app	
Fungizone solution	01 app 3xj
Daktarin gel	01 app 2xj

Laryngite	
Légère / Modérée	Ambulatoire : CTC pdt 5 jrs Celestene gouttes, ou Solupred cp
Sévère	Cocktail laryngé : 3cc SSI+ 1cc Adré + CTC (en inj ou 2cc Dexa dans le cocktail) Evaluation : si amélioration -> CTC 5jours

Viroses cutanées (Varicelle, sd main-pied-bouche, ...)	
Hexamedine sol	Application locale x 3/j
Si surinfection	Zeta crème 01 app x2/j , ou keforal
Paracétamol si fièvre	Anti histaminique si prurit

Constipation	
Duphalac sirop	
< 1 ans	½ càc 02 xj
1-6 ans	01 càc 02 xj
>6ans	01 càc 03 xj
OU Glycerine suppo	
Suppo : NRS, E	
NRS	Suppo NRS 01 xj (2j/3)
2-6 ans	Suppo E 01 xj
>6 ans	Suppo E 01 xj (à renouveler 1 fois dans l'heure qui suit si pas de réponse)
Autres : Forlax sachet (4,10g),	
+ anti spasmodique si douleurs (debridat)	

Diarrhée	
SRO sachet SAIDAL	
01 sachet dans 1L d'eau bouillie et refroidie à donner à la cuillère, à renouveler toute les 24h (plus dilué si NNE ou petit NRS)	
Tiorfan (> 4 mois) , ou celofan	
Sachet : 10mg (NRS), 30 mg (E)	
<9kg	01 sachet 10 x3j
9-13 kg	02 sachets 10 x3j
13-27 kg	01 sachet 30 x3j
>27 kg	02 sachets 30 x3j
Smecta > 2ans (½ sachet x3/j)	

Vomissements (15-20 min avant les repas)			
Vomiteb sirop	1-5 ans	01 càc 2 à 3 x/j	+ SRO si <2ans
	5-12 ans	01 càc 3 à 4 x/j	
	>12ans	02 càc 3 à 4 x/j	
Domperidon sirop	> 12 ans 01 ddp 03xj		
Vogalène suppo (5mg, 2,5mg)	< 6ans	01 suppo 2,5mg 3x/j Ou ½ suppo 5mg 3x/j	
	6-12ans	01 suppo 3xj	

Douleurs abdominales (antispasmodiques)		
Spasfon	lyoc	01 lyoc 3xj
	Cp 80mg	01cp x3j
Debridat	Sirop E	01càm 3xj
	Cp 100mg	01cp 3xj

càc = 05ml ; càs = 15ml

Maux de gorge : maxillase sirop

6mois-3ans : 1 càc x3/j

>3 ans : 2 càc x3/j

Poussée dentaire :

Dolodent sol gingivale 1app x3/j

Dologel 1app x 3/j

Flagyl :

Sirop 125mg

Cp 250/500

Adulte : 500 mg x3/j

Enfant : 30 à 40 mg/kg/j en 3 prises

Oroken :80mg/kg/j..... QSP 10j

< 12 ans : sol buv (NRS :40, E :100)

01 ddp x2/j

>12 ans : cp200

01cp x2/j

Bactrim : cotrimoxasole (sulfamethoxasol-triméthoprim)

sirop 200 /40 , cp400/80

30mg/kg/j de sulfamethoxasol, 6mg/kg/j de triméthoprim

=> 1 càc (240)/6-7kg ou 01 cp (480)/12-14kg

Oxyrose :

Fluvermal : sirop 100mg/càc , cp 100mg

1 à 2 càc (ou cp) en une seule prise à j1, j2, j3 ;

A renouveler à j15, j16, j17

+ trt de l'entourage + désinfection de la lingerie + couper et brosser les ongles régulièrement

Anorexie :

Appétit kid sirop

2-7ans : 2 càc /j

7-12 ans : 3 càc /j

>12ans : 4 càc /j

Solvityl sirop:

6 mois à 1 an : ½ càc /j

1 à 15 ans : ½ à 1 càc /j

Adolescent et adulte : 1 à 2 càc /j.

Alvityl sirop : 1 càc 2-3 x/j

Colique chez le NNE/NRS:

Stop colic sirop

<6mois : ½ càc x2/j

>6mois : 01 càc x3/j

Gaz bébé gouttes ... 10 gtt/j

Nifluril : suppo 400

6-30 mois : ½ suppo x2/j

30moi-12 ans : 01 suppo /kg

Infection genitale chez la fille :

Saforelle sol 01 app x3/j

Forlax : sachet 4g 10g

6 mois -1 an : 1 sachet (4 g)/ jour, le matin.

1 - 4 ans : 1 sachet (4 g) 2x/jour

4 - 8 ans : 2 sachets (4 g) 2x/jour

>8 ans : 1 sachet (10 g) 2x/jour

Elixotide : CTC inhalé (trt de fond de l'asthme)

Spray 50-125-250 µg..... 1bouf x2/j (matin et soir)

1-4ans : 50µg

4-11ans : 125µg

>11ans : 250µg

ADP:

Zeclar sirop QSP 8j

01 ddp x2/j

Impétigo:

1- ATB:

- Lesion unique : trt local

Fucidine pmd : 1 app x2/j

- Lésions étendu : + trt per os

Keforal 50mg/kg/j

(Ou augmentin)

2- Antiseptique locale: hexamedine

3- Anti-histaminique si prurit

Adrenaline : 0,5 mg /kg

Valium : 0,5 x poids

Gardénal:

NNE: 20 mg/kg

NRS : 15 mg/kg

Enf : 10 mg/kg