

Les Beta lactamines

1) Amoxicilline (DCI) :

- Indications :**
- Infection respiratoire (sphere ORL: **O**titite-**S**inusite-**p**haryngite- ; Angine)
 - Abcès dentaire
 - Cas postopératoire (comme prévention)
 - Infection digestif (Ulcère gastrique)

Forme. Dose. Posologie :

Comprimé Gélule $\left[\begin{array}{l} 500\text{mg} : (\text{Enf} + 12\text{ans}) \\ 1\text{g} : \text{Ad} \end{array} \right] - 1\text{cp} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

Sirop 125mg . 250mg . 500mg $\left(1\text{C a M} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour} \right)$ la dose 50mg/kg

Inj $\left[\begin{array}{l} 500\text{mg} : (\text{Enf} + 12\text{ans}) \\ 1\text{g} : \text{Ad} \end{array} \right] - 1\text{inj en IM/jour (N7} \rightarrow \text{N10)}$

Nom Commercial : Clamoxyl ; amoxypen ; Amodexgé ; Biopamox ; Saiffoxyl ; Amoximex ; lamoxyl



Les Beta lactamines

2)Ampicilline(DCI) :

Indications : -Infection urogénital(++++)
-infection respiratoire
-Cas postopératoire(comme prevention)

Forme. Dose. Posologie : Gélule 500mg { (Enf+12ans| 1gel--2→3*/jour
Ad 2gel--2→3*/jour
Sirop 250mg (1Ca M--2→3*/jour) la dose 50mg/kg/JOUR
Inj 1g :Ad--1Inj en IM/jour

Nom Commercial : Totapen ;Ampal ;Ampilline ;Ampinax



Les Beta lactamines

3) « Amoxicilline+Acide clavulanique »(DCI)

Indications :



- Infection respiratoire aigue(Bronchite,sphere ORL,Angine)
- Abcet dentaire
- Infection urinaire

Forme. Dose. Posologie :

	Comprimé	$\left[\begin{array}{l} 500\text{mg} : (\text{Enf}+12\text{ans}) \\ 1\text{g} : \text{Ad} \end{array} \right]$	$1\text{cp} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$
	Sirop	$\left[\begin{array}{l} \text{NRS} \\ \text{Enf} \end{array} \right]$	$1\text{ddp} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$ Dose (40-80mg /kg/jour)
	Sachet	$\left[\begin{array}{l} 500\text{mg} : \text{Enf} \\ 1\text{g} : \text{Ad} \end{array} \right]$	$1\text{sac} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

NB :concernent les SP(NRS,Enf),il ya aucune différence entre eux, sauf dans la quantité(30ml vs 60ml ou 35ml vs 70ml);donc ,on peut donner le SP de NRS a l'Enf et vice versa, en considération du poids du malade

Nom Commercial : Augmentin ;Augmentimex ;Klavox ;Amoclan BID ;Amoclan 8 :1
Bioclav ;clavodar



Les Beta lactamines

4) Oxacilline (DCI) :



Indications : -des infections dues à des staphylocoques sensibles
-Infection cutanée(plaie, Abscess cutanée)
-infections ORL, rénales, uro-génitales, neuro-méningées, ostéo-articulaires, endocardites,

Forme. Dose. Posologie : Gélule $\left[\begin{array}{l} \text{(Enf+12ans)} \quad 1\text{gel} \\ \text{Ad} \quad 2\text{gel} \end{array} \right] \quad 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

Inj $\left[\begin{array}{l} 500\text{mg} \\ 1\text{g} \end{array} \right] \quad \text{Ad : 1inj en IM/jour}$

Nom Commercial : Bristopen ; Oxacil ; Oxaline ; Oxal ; Oxcare



Les Beta lactamines

5)Phenoxyl-Methyl-Penicilline « PMP »(DCI) ou Pénicilline V

Indications : -Angine(traitement pde 10 jours)
- infections cutanées bénignes à germes sensible

Forme. Dose. Posologie :




Comprimé [(Enf+12ans) 1MUI
Ad 1,5MUI] - 1cp→2→3*/jour

Sirop 250 000UI :1C à M→2→3*/jour La dose 50 000 à 100 000
400 000UI UI/kg/jour

Inj [Enf 500 000UI
Ad 1MUI] - 1Inj en IM/jour

Nom Commercial :

Ospen ;Orapen ;Penival ;gectapen



Les Beta lactamines

6)Benzathine pénicilline(DCI) :

Indications : limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles et notamment :


- . prophylaxie des rechutes du rhumatisme articulaire aigu,
- . traitement de la syphilis et du pian.

Forme. Dose. Posologie :

Inj - $\left\{ \begin{array}{l} 600\,000\text{UI} : \text{Enf} \\ 1,2\text{MUI} : \text{Ad} \end{array} \right\} 1\text{Inj}/21\text{jours}$

1 injection IM tous les 8 jours de 2,4 MUI. —Cure des tréponématoses

Nom Commercial : EXTencine ;EXTencilline ;Retarcilline ;Retarmex ;Retarpen



B) Les céphalosporines (Famille) :

Les céphalosporines de 1^{re} génération

1) Cefalexine

Indication : -infection respiratoire(sphère ORL ;Angine ;Bronchite)
-cas post-opératoire(++++)
-infection urogénital

Forme. Dose. Posologie:

Comprimé	$\left\{ \begin{array}{l} 500\text{mg} : (\text{Enf} + 12\text{ans}) \\ 1\text{g} : \text{Ad} \end{array} \right\}$	$1\text{cp} - 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$
Sirop	$\left\{ \begin{array}{l} 125\text{mg} : \text{NRS} \\ 250\text{mg} : \text{Enf} \end{array} \right\}$	$1\text{C a M} - 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

Nom Commercial : Keforal;lexinal;lexin ;cephalex;Cephadar ; Ospexin





Les céphalosporines de 1ere génération

2)Céfazoline

Indication : -infection respiratoire(sphere ORL ;Angine ;Bronchite)
-cas post-opératoire(++++)
-infection urogénital

Forme. Dose. Posologie: Inj 1g :Ad---1Inj en IM/jour

Nom Commercial : Cefazoline ;Intrazoline ;Zopelin ;Cefazoline sandoz



Les céphalosporines de 1ere génération

3) Cefaclor

Indication :

- infection respiratoire(Bronchite aigue seulement++++)
- infections de os et des articulations
- infection urinaire
- otite mouyenne ; sinusite

Forme. Dose. Posologie:

Comprimé 500mg : Ad : 2CP—2 → 3°/jour

Sirop $\left[\begin{array}{l} 125\text{mg} : \text{NRS} \\ 250\text{mg} : \text{Enf} \end{array} \right] \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 1\text{C a M} \rightarrow 2 \rightarrow 3^{\circ}/\text{jour}$

la dose : 20-40 mg /kg/jr

Nom Commercial : Tabiclor ; Dicef ; Cloracef



Les céphalosporines de 2^{ème} génération

1. Cefuroxime

- Indication :**
- otites, sinusites aiguës
 - infection respiratoire (Bronchite aiguë, pneumopathies)
 - infection urinaire
 - infection cutanées, gonorrhées non compliquées
-

Forme. Dose. Posologie:

Comprimé	{ 250mg 500mg	Ad : 1cp → 2 → 3* / jour

Sirop 125mg : NRS : 1ddp → 2 → 3* / jour

Nom Commercial : Zinnat ; Zinoximor ; Daroxime



Les céphalosporines de 3^{ème} génération

1) Cefexime

Indication :

- infection sphere ORL
- otites, sinusites aiguës
- infection respiratoire (Bronchite aiguë, pneumopathies)
- infection urinaire



Forme. Dose. Posologie:

Comprimé	$\left[\begin{array}{l} 200\text{mg} \\ 400\text{mg} \end{array} \right.$	$\left. \right\} 1\text{cp} \rightarrow 2 \text{ * / jour}$
Sirop	$\left[\begin{array}{l} 40\text{mg : NRS} \\ 100\text{mg : Enf} \end{array} \right.$	$\left. \right\} 1\text{ddp } 2 \text{ * / jour}$

Nom Commercial : Oroken ; Winex ; Orokal




C) Les macrolides (Famille) :

Les macrolides

1. Spiramycine

Indications : . abcès dentaires, phlegmons, cellulites périmaxillaires, péricoronarites,
 . gingivites, stomatites,
 . parodontites,
 . parotidites, sous-maxillites





La bibliothèque médicale

Forme. Dose. Posologie :

-CP { 1,5MUI : (Enf + 12ans) } 1cp --- 2° / jour
 3MUI : Ad

-SP Enf : 1C a M --- 2 3° / jour

Nom Commercial : Rovamycine ; Spira ; Spiracare ; ; Rovadal



Les macrolides

2.« Spiramycine+Metronidazole »

Indications :


-Infection de la cavité buccale
(abcès dentaire, infection de la gencive ; Stomatite)

Forme. Dose. Posologie :

-CP { 750 000UI : Enf
1,5MUI : Ad } 1cp--2*/jour

Nom Commercial :


Orogyl ; Bi-orogyl



La bibliothèque médicale

Les macrolides

3. Azithromycine



La bibliothèque médicale

Indications : -Infection respiratoire(Angine;Bronchite++++)
- infections stomatologiques.


Forme. Dose. Posologie :



-CP { 250mg :Enf (boite de 6cps)
500mg :Ad(boite de 3cps) } 1cp/jour
pendant 3 jours


-SP 200mg { NRS : «(1/2) CaM=2,5ml»/jour—pendant 3 jours
Enf : «1CaM=5ml»/jour—pendant 3 jours

Nom Commercial : Zomax ;Zithromax ;Azithral ;Binozyt ;Zotrix ;Azimycine



Les macrolides

4. Roxithromycine



La bibliothèque médicale

Indications : Angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique
Sinusites aiguës
Surinfections des bronchites aiguës.
Exacerbations des bronchites chroniques.


Forme. Dose. Posologie : -CP 150mg :Ad :1cp---2 → 3*/jour(pdte 10 jours)

Nom Commercial : Roxid ;Roxamed



Les macrolides

5. Clarithromycine



La bibliothèque médicale

Indications : -Abcet dentaire

-Infection dermatologique

-Infection digestif(ulcère gastrique)

-Infection respiratoire(toute les inection respiratoires)

Forme. Dose. Posologie :

-CP $\left[\begin{array}{l} 250\text{mg} \\ 500\text{mg} \end{array} \right]$ Ad : posologie selon le cas


-SP $\left[\begin{array}{l} 125\text{mg} : \text{NRS} \\ 250\text{mg} : \text{Enf} \end{array} \right]$ posologie selon le cas

Nom Commercial : Clarit ;Zeclar ;Claridar ;Clarital



Les macrolides

6. Josamycine



La bibliothèque médicale

Indications : -Infections respiratoires(toute les infections respiratoires)
-angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique
-sinusites aiguës.

Forme. Dose. Posologie :

-CP 500mg :Ad :1cp--2*/jour


-SP

125mg :NRS	}	1ddp--2*/jour
250mg :Enf(2-6ans)		
500mg :Enf(6-12ans)		


Nom Commercial :



josacine



D) Aminoglycoside (Famille) : gentamycine




Indication :

- Infection urogénital
- Abscess dentaire
- cas post-opératoire
- Infection rénale

FDP :

Inj { 40mg
80mg } 1inj en IM/jour

NC : gentamicine : gentamycine : gentaxyn : epigent : gentalline



E)Quinolone(Famille) :




 Love biology

Indication :

- Pied diabétique(++++)
- Infection urogénital
- cas post-opératoire
- Otite chronique

E.D.P



NC : Ciprolan ; Cipro-quinox ; Ciproval ; Cipromax (le DCI est : Ciprofloxacine)



F) Tetracyclines (Famille) :



 Love biology

Indication :

-Infection légère de la peau(surtout pour l'acné)

F-1) Doxycycline(DCI) :

E.D.P

-CP 100mg : 1cp---1 2*/jour

NC

-Vibramycine N ; Dotur



F-2) Oxytetracycline(DCI) :

E.D.P

-CP 250mg : posologie selon le cas

NC

-Oxymed



F-3) Lymécycline(DCI) :

E.D.P

-CP 150mg : posologie selon le cas

NC


-Tetralysal



G) Fucidamine (Famille) :



- Acide fucidique (DCI) :



Indication :

- Infection cutanée compliquée (Plaie ; Abscess cutané ; cas post-opératoire ; Pied diabétique++)

EDP / NC

- CP 250mg : Ad : 2cp --- 2 3*/jour --- NC : Fucidine
- SP 250mg : Enf : 1C à M --- 2 3*/jour --- NC : Fucidine
- Pde pour tout : 1app le soir --- NC : Fucidine ; Zeta ; Fucidame ; Acifudal



Autres antibiotiques:





❖ Nitroxoline (DCI) : n'a pas une famille = un DCI :

Ind :

- Infection urinaire (seulement)

E.D.P



NC : Naxolin ; Nolib ; Nabyol forte

❖ Cefadroxyl (DCI) : **CP** 1g : posologie selon le cas

❖ Pyostacine (NC) : **CP** 500mg : posologie selon le cas

❖ Omnicef « céfdénir » (DCI)

: **SP** 125mg/5ml **CP** 300mg posologie selon le cas



Les corticoïdes

1. Prednisolone

Indication : .Angine pultacée.asthme.bronchite inflammation dans le
systeme respiratoire ou le sphere ORL

Forme. Dose. Posologie: Cp 5-20mg.
2cp en 1seul prise le matin pendant 5j

Nom Commercial :
Solupred, solugé, physiolone, swor, prednal, deprisole



Les corticoïdes

2.Methylprednisolone

Indication :

- Angine pultacée, asthme, bronchite, inflammation dans le système respiratoire ou le sphere ORL
- Allergie saisonnière
- douleurs traumatologie/Rhumatologie

Forme. Dose. Posologie:

Cp 4-16mg réservé à l'A ; le matin

Inj : 20-40-120mg

Nom Commercial : Solumedrol, meprenal, Medrol, lemod-solu



Les corticoïdes

3. Bétaméthasone

Indication : .Angine pultacée.asthme.bronchite.inflammation dans le
système respiratoire ou le sphere ORL

- Allergie saisonnière
- douleurs traumatologie/Rhumatologie
- Utilisations dermatologiques

Forme. Dose. Posologie: Cp 2mg
Inj en IM
Gouttes: N, E 10 GTT par 1KG de poids
pd

Nom Commercial : Céléstène, celetasone, betacrovis ,tabeta, betsol
diprostene,diprosalic,betasone,diprosone ,heet



2 /Anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Diclofenac de potassium

Indication :

Douleurs dentaires/traumatisme /rhumato / migraine

Forme. Dose. Posologie:

Cp 50mg 2-3x/j réservé
pour l'Adulte

Nom Commercial :

Rapidus •cataflam
vortex-rapide



2 /Anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Diclofenac de sodium

Indication :

Douleurs dentaires/traumatisme /rhumato / cycle menstruel

Forme. Dose. Posologie:

Cp:25mg pour l'E
(50-75) pour l'A 2x/j
100mg 1x/j

Suppo : 12,5mg ➡ Nourrisson
25mg ➡ Enfant
100 mg ➡ Adulte

inj : réservé à l'A 1inj en IM

Gel : 1application le soir

Nom Commercial :

Voltarene .Vortex . biofenac divido . flovenac . voltamex .volum
tabiflex .clogel. diclamid . xinac . clofenal



2 /Anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Naproxene de sodium

Indication :

Douleurs dentaires/traumatisme /rhumato / cycle menstruel


Forme. Dose. Posologie:

Cp : 275mg-550mg

2cp 2-3x/j

Nom Commercial :

Nopain - Proxidol - NHupain



2 /Anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Peroxicam

Indication :

Douleurs traumatto /rhumato

Forme. Dose. Posologie:

Cp 20mg

Suppo 20mg le soir

Inj 20 mg

Gel 1app le soir

Nom Commercial :

Felden peroxicam

prixam piroxen

felcan painoxam

fenoxan gelden



2 /Anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Morniflumate

Indication :

Maux de gorge/ traumatto /rhumato / Circoncisio
otite

Forme. Dose. Posologie:

Gélule : 250mg

Suppo :200mg > N

400mg > E


700mg > A

Pommade-gel : 1app le soir

Nom Commercial :

Niflumene nufliruc Inflamine usénil Niflumate Flucidal

niflugel



2 /Anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Ibuprofene

Indication :

Fievre · douleurs

Forme. Dose. Posologie:

Cp 200mg pour l'E +de 8ans.

Cp 400mg- 600mg

~~Sirap~~ Nourrisson Enfant 1ddp/6-8h

Nom Commercial :

Sapofen Xydol ibuprofal algifen antalfen



2 /Anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Ketpprofene

Indication :

Douleurs rénales (colique néphrétique)

Forme. Dose. Posologie:

Cp 100- 200mg

Suppo

Inj

Gel

Patch : 24-48h au max

Nom Commercial :

kefentech Profenid Profen saifen ketum Geprofen



2 /Anti-inflammatoires non stéroïdiens :

celoxib

Indication :


Douleurs traumatto /rhumato / Arthrose /tendinite

Forme. Dose. Posologie:

Gel : 100-200 mg 2-3x/j

Nom Commercial :

Celebrex Rumabrex Coxibex Inicox Celvex



1/ paracétamol :

Indication : douleurs, fièvre ; courbatures, syndrome grippal maux de tête, douleurs dentaires

Forme. Dose. Posologie: CP : 500mg - 1g. E+8ans, A chaque 6h/8h

Suppo : 100mg- 150-200-300

Sachet : 10mg 0-150-200-300-500

Sirop : N-E 1ddp/6h ou 8h

Nom Commercial : Doliprane, dolyc, paralgan, dolicrane, sapramol, dolipriv, paracétal, dofébril, panadol, efferalgan, dafalgan, telymol, suppfadol

2/ paracétamol + Acide ascorbique (vitamin C):

Indication : faiblesse+++ syndrome grippal

Forme. Dose. Posologie: Cp . 1Cp 2x/j

Nom Commercial : efferalgan vit C



3/ tramadol :

Indication : douleurs traumatologie/Rhumatologie

Forme. Dose. Posologie:

Gel : 50mg- 100mg réservé à l'adulte 1CP 2-3x/j

Nom Commercial : tramadol, supramadol, duofen



4/ paracétamol+Tramadol :

Indication : douleurs traumatologie/Rhumatologie

Forme. Dose. Posologie: Cp : 1cp 2-3x/j

Nom Commercial :

xamadol , Di-dolex, trapal, dolakil, extramadol, dolmatol.



5/paracétamol+caféine :

Indication : maux de tête+++ ; migraine ; douleurs dentaires,

Contre indication : femme enceinte, asthmatique, HTA

Nom Commercial : pandol extra, plnadix extra, pacet extra



6/ paracétamol+codéine :

Indication : maux de tête+++ ; migraine ; douleurs dentaires/
'traumato/rhumato

Contre indication : femme enceinte , asthmatique, HTA.

Nom Commercial : codoliprane, copramol, coparalgan,
dafalgan codéine, planadix confort,coexpandol



Pansements gastriques

1. Inhibiteur de la pompe à proton



omeprazole

Forme. Dose. Posologie

Gel 10mg pour l'E: 1 gel 2*jour
20mg pour l'A : 1 gel 2*jour

Nom Commercial :

Lomac, antag, gasec, omed, zimor
proton, neogastrix, lameole,



Pansements gastriques

1. Inhibiteur de la pompe à proton

Lansoprazole

Forme. Dose. Posologie **Gél 30mg**

Nom Commercial : **Esoprotion.**



Pansements gastriques

1. Inhibiteur de la pompe à proton

Esoméprazole

Forme. Dose. Posologie Cp 20-40mg

Nom Commercial : Esoral ; inéxium ; kenzoprazole



Pansements gastriques

1. Inhibiteur de la pompe à proton

pantaprazole

Forme. Dose. Posologie Cp 40mg

Nom Commercial : Pantadar, protonex



Pansements gastriques

2. Antihistaminiques ANTI H2

Ranitidine:

Forme. Dose. Posologie

Cp 150-300mg 1cp 2x/j
ou 2cp au coucher
Inj 25mg/ml

Nom Commercial : ranitidine Mabo ; ratidex ; ranimex
ranitex , ranitidal,





Antispasmodique 1/phloroglucinol



Indications: • Douleurs gastro-entérologique/gynécologiques
(chez la femme enceinte ou post-accouchée et de cycle m)
• colique néphrétique


Forme. Dose. Posologie: Cp Lyoc 80mg pour E : 1cp 2 x/j
A : 2cp 2-3/j
Suppo 150mg 1suppo à l demande
Inj : 1inj en IM OU IV

Nom Commercial : Spasfon, spacyl, spasmodyl , levospasme,
spasmol, spasmine, spasmex





Antispasmodique 2/trémibutine



Indications: * Douleurs gastro-entérologique,
* Météorisme, ballonnement abdominale

Forme. Dose. Posologie:

Cp: 100-200mg 1co2-3x/j

Sirop: N+E

Suppo

St



Nom Commercial : Debridat, trémidat, trimébutine biocare
digestat, colostop, transocalm



Antispasmodique

3/bedelix

Indications: *

- colopathies fonctionnelles
- Inconfort intestinal
- mal de ventre surtout chez les sujets âgés

Forme. Dose. Posologie: sachet 1st 2-3x/j entre les repas
ou un peu avant les repas

Nom Commercial :




Antispasmodique

4/meteospasmyl (alverine+siméticone)

Indications: * manifestations fonctionnelles intestinales
* Météorisme, ballonnement abdominale

Forme. Dose. Posologie: cp. 1cp 2-3x/j avant les repas
ou au moment des douleurs



Antispasmodique

5/météoxane(phloroglucinol+siméticone:)

Indications: * manifestations fonctionnelles intestinales
notamment avec meteorisme et diarrhée

Forme. Dose. Posologie: gélule. 2gél 2-3x/j avant les repas
ou au moment des douleurs



Antispasmodique 6/pinavérium

Indications: * Inconfort intestinal liés aux troubles fonctionnels intestinaux et des voies biliaires

Forme. Dose. Posologie:

cp 50-100mg 1cp2-3x/j
au milieu des repas




Antispasmodique

7/mébéverine

Indications: * Inconfort intestinal liés aux troubles fonctionnels intestinaux et des voies biliaires

Forme. Dose. Posologie: gélule 100mg 200mg LP. 1gél 2-3x/j

Nom Commercial : duspatalin , duspavine, spalverine



Les laxatifs

1.LACTULOSE

Indication : .traitement symptomatique de la constipation
.Encéphalopathie hépatique.

Forme. Dose. Posologie:

sachet : pour l'Ad———1sac (2 3/jour)

SP: { NRS:2,5ml(demi C a M)2 3*/jour
ENF:5 7,5ml———2 3*/jour
AD : 10 15ml———2 3*/jou

Nom Commercial : Duphalac ;lactulose Mylan ;lactunad ;Ezilax ;isolact ;inphalac



Les laxatifs

2.MACROGOL

Indication : .traitement symptomatique de la constipation

Forme. Dose. Posologie:

*sachet : $\left\{ \begin{array}{l} 4G: NRS \rightarrow EN 8ans \\ 10 G: EN 8ans \rightarrow Ad \end{array} \right. \quad 1 \rightarrow 2 \text{ sac le matin}$

Contre indication

L'inflammation de l'intestin

Perforation de l'intestin

Iléus ou suspicion d'obstruction de l'intestin

Douleurs abdominales de cause incertaine.

Allergie au macrogol

Nom Commercial :



Forlax



Les laxatifs

Glycérine



Indication : utilisé lorsque les selles s'accumulent dans le rectum (le bouchon) pour les désperser

Forme. Dose. Posologie:

Suppo : { NRS
ENf
AD } → 1 suppo a la demande

Contre indication

Allergique au glycérol.

Colopathie obstructive.

Syndrome douloureux abdominal de cause indéterminée et inflammatoire



Les laxatifs

4.CHARBON ACTIVE

Indication: .Paresse intestinale
.Toutes les formes de constipation
.Fermentation et putréfaction intestinales
.Météorisme

Forme,dose,posologie:

CP pour l'Ad:1CP-----2 $\Rightarrow$ 3*/jour

Nom Commercial :

Eucarbon ;Charbonel ;Carbophos



Les laxatifs

5.MICROLAVEMENT :

Indication : assurer un vidange rectale
préparer a un examen: rectoscopie par
exemple

1.Tube a administration par voie rectale:

1.NORGALAX(Régulax)

2.NORMACOL LAVEMENT

2.Sachet:

FORTTRANS



LAXATIFS

6. LAXATIFS A BASE DES PLANTES:

1) Laxena:

CP { 15 mg pour L'Enf
25mg pour L'Ad

2) Huile de parafine:

SP pour L'Ad : "Isoffine"



Antidiarrhéiques:

1.Nifuroxazide

Indications : Diarrhée aiguë présumée d'origine bactérienne

Forme,dose,posologie :


gel—200mg pour l'Ad: 2gel—2 3*/jour



SP { NRS:2,5ml
ENf:5ml

2 -- 3*/jour

Nom Commercial : Ercéfuryl,Xéfuryl,Dysentyl,Nifazid,pensurax,diafex



Antidiarrhéiques:

2.Lopéramide


Indications : Traitement symptomatique des diarrhées aiguës et chroniques.

Forme,dose,posologie :

gel—2mg pour l'Ad:1gel —2 3*/jour

SP { NRS:
1ddp- 2— -3*/jour
ENf:

Nom Commercial : imodium,diaryl,dimépra,inphadium loperidal



Antidiarrhéiques:

3.RACECADOTRIL

Indications : traitement symptomatique de la diarrhée aiguë

Forme,dose,posologie :



gel—100mg pour l'Ad: 1gel---2→3*/jour

sachet { 10mg pour NRS
30 mg pour l'Enf

1sac---2 → 3*/jour

Nom Commercial : Tiorfan

